

Doxazosin Retard Arrow 4 mg depottabletter

doxazosin



Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen

- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
- Lægen har ordineret Doxazosin Retard Arrow til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal De vide, før De begynder at tage Doxazosin Retard Arrow
3. Sådan skal De tage Doxazosin Retard Arrow
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Doxazosin Retard Arrow indeholder det aktive stof doxazosin (som doxazosinmesilat), som tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes alfa-blokkere.

Doxazosin Retard Arrow anvendes til behandling af:

- Forhøjet blodtryk
- Symptomer forårsaget af en forstørret blærehalskirtel hos mænd (f.eks. vanskelig og/eller hyppig vandladning)

Hos patienter, der tager Doxazosin Retard Arrow til behandling af forhøjet blodtryk (hypertension), fungerer doxazosin ved at afslappe blodkarrene, så blodet nemmere kan passere igennem dem. Dette medvirker til at sænke blodtrykket.

Hos patienter med forstørret blærehalskirtel anvendes Doxazosin Retard Arrow til behandling af vanskelig og/eller hyppig vandladning. Dette er almindeligt hos patienter med forstørret blærehalskirtel. Doxazosin virker ved at afslappe musklen omkring blæreudgangen og blærehalskirtlen, så det bliver lettere at lade vandet.

2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT TAGE DOXAZOSIN RETARD ARROW

Tag ikke Doxazosin Retard Arrow

- hvis De er overfølsom (allergisk) over for doxazosin eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- hvis De ved, at De er overfølsom over for quinazoliner (f.eks. prazosin, terazosin), som tilhører samme gruppe af lægemidler som doxazosin
- hvis De har eller tidligere har haft lavt blodtryk, som får/fik Dem til at føle Dem svag eller svimmel, når De rejser/rejste Dem fra siddende eller liggende stilling (postural eller ortostatisk hypotension)
- hvis De har en forstørret blærehalskirtel og har ophobning eller blokering i urinvejene, en kronisk infektion i urinvejene eller blæresten
- hvis De har en alvorlig nyresygdom (ophørt urinproduktion eller fremskreden nyresvigt)
- hvis De lider af manglende blærekontrol (overaktiv blære)
- hvis De har eller nogen sinde har haft forsnævring eller tillukning af spiserøret, maven eller tarmen
- hvis De får denne medicin mod forstørret blærehalskirtel og samtidig har lavt blodtryk
- hvis De ammer

Vær ekstra forsigtig med at tage Doxazosin Retard Arrow

Informér Deres læge, hvis noget af det følgende gælder Dem:

- De har hjerteproblemer eller tidligere har haft en hjertesygdom
- De har en leversygdom
- De har gennemgået en operation for at få fjernet en del af mave-tarmkanalen

Hvis De skal opereres for grå stær (grå og uklar øjenlinse), bør De inden operationen informere Deres øjenspecialist om, at De er i behandling eller tidligere har været i behandling med Doxazosin Retard Arrow. Doxazosin Retard Arrow kan forøge risikoen for komplikationer i

forbindelse med operationen. Disse komplikationer kan håndteres, hvis øjenspecialisten er forberedt.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Det er særlig vigtigt at fortælle det til lægen, hvis De tager eller for nylig har taget følgende:

- medicin til sænkning af blodtrykket, (f.eks. fosinopril og lisinopril), idet Doxazosin Retard Arrow kan forstærke deres virkning
- visse lægemidler, der bruges til at behandle rejsningsproblemer (f.eks. sildenafil, tadalafil og vardenafil)

Nogle patienter, som er i behandling med alfa-blokkere for forhøjet blodtryk eller forstørret blærehalskirtel kan opleve svimmelhed eller uklarhed, som skyldes lavt blodtryk, når man rejser sig hurtigt op fra siddende eller liggende stilling. Nogle patienter har oplevet dette, når de har taget medicin mod rejsningsproblemer (impotens) sammen med en alfa-blokker. For at forebygge disse symptomer bør De være i behandling med en regelmæssig daglig dosis af alfa-blokkeren, inden De begynder at tage medicin mod rejsningsproblemer.

Brug af Doxazosin Retard Arrow sammen med mad og drikke

Doxazosin Retard Arrow kan tages med eller uden mad. Tabletterne bør synkes hele med et glas vand.

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apotek til råds, før De tager nogen form for medicin.

Graviditet

De må ikke tage Doxazosin Retard Arrow, hvis De er gravid, medmindre lægen giver Dem besked om det. Hvis De bliver gravid, mens De tager denne medicin, bør De hurtigst muligt kontakte Deres læge.

Amning

De må ikke amme, mens De tager Doxazosin Retard Arrow

Trafik- og arbejdssikkerhed

Doxazosin Retard Arrow kan påvirke Deres dømmekraft og koncentrationsevne, især når De begynder at tage tabletterne. De skal sikre Dem, at medicinen ikke virker sådan på Dem, inden De kører bil eller betjener maskiner.

3. SÅDAN SKAL DE TAGE DOXAZOSIN RETARD ARROW

Tag altid Doxazosin Retard Arrow nøjagtigt efter lægens anvisning. Tag ikke mere end lægen har anvist. Læs og følg anvisningerne på doseringsetiketten. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Tabletterne skal synkes hele med et glas vand. Tabletterne må ikke tygges, knuses eller deles. Tabletterne kan tages når som helst på dagen og før, under eller efter et måltid. Vælg et tidspunkt på dagen, hvor det passer Dem bedst at tage tabletten og tag den på samme tid hver dag.

Den sædvanlige dosis er en Doxazosin Retard Arrow tablet (4 mg) taget som en enkelt dosis én gang dagligt.

Deres læge kan ønske at øge Deres dosis til 8 mg dagligt. Dette er den maksimale dosis af Doxazosin Retard Arrow.

Doxazosin Retard Arrow anbefales ikke til patienter under 18 år.

Det er vigtigt, at De fortsætter med at tage Doxazosin Retard Arrow, så længe lægen tilråder det. De må ikke ændre Deres dosis eller ophøre med at tage tabletterne, medmindre Deres læge har bedt Dem om det.

Hvis De har taget for mange Doxazosin Retard Arrow depottabletter

Kontakt Deres læge eller skadestuen, hvis De har taget mere af Doxazosin Retard Arrow, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet. Husk at tage pakningen og resterende tabletter med Dem.

Hvis De har glemt at tage Doxazosin Retard Arrow

Tag næste dosis til sædvanlig tid. De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis De holder op med at tage Doxazosin Retard Arrow

De skal fortsætte med at tage tabletterne, indtil Deres læge beder Dem stoppe.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Doxazosin Retard Arrow kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Fortæl det straks til lægen hvis:

- De får hævelser i ansigt, tunge eller svælg, voldsom kløe, hududslæt, besvær med at synke og/eller med at trække vejret. Dette kan være tegn på en alvorlig overfølsomhedsreaktion.
- De får smerter i bryst, skulder og/eller arme og trykken for brystet (angina pectoris) eller andre symptomer fra hjertet (herunder hurtig eller uregelmæssig hjertebanken).
- De udvikler alvorlig træthed, appetitløshed eller hvis Deres skin eller øjne ser gule ud (tegn på gulsot).

De kan føle Dem uklar eller svimmel, når De rejser Dem fra siddende eller liggende stilling, især i begyndelsen af behandlingen eller hvis behandlingen genoptages efter en pause. Hvis dette sker, skal De ikke blive nervøs, men De må ikke køre bil, betjene maskiner eller udføre andre aktiviteter som kan være farlige, hvis De skulle besvime. Hvis disse symptomer vedvarer eller bliver et problem, skal De kontakte Deres læge.

Der er set følgende bivirkninger. Fortæl det til lægen eller på apoteket, hvis De får generende symptomer, som kan være bivirkninger.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Brystsmerter, lavt blodtryk med eller uden svimmelhed, når De rejser Dem fra siddende eller liggende stilling, åndenød, hævelse eller irritation i næsen (rinitis), uklarhed, generel utilpashed og svaghed, svimmelhed, mavesmerter, hjertebanken (palpitationer), mundtørhed, rygsmerter, søvnighed, ufrivillig vandladning eller smerter ved vandladning (urinvejsinfektion eller blærebetændelse), bronkitis, muskelsmerter, hudkløe, hævede hænder og fødder, hovedpine, kvalme, hoste, fordøjelsesproblemer

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Hjerteanfald, angina pectoris (trykken og smerter i bryst og skulder), ændret hyppighed for vandladning, blod i urinen, impotens, gigt (med ledsmerter), manglende følsomhed ved berøring, smerter, varme eller kulde, depression, hududslæt, rysten (tremor), øget appetit, besvimelse, diare, luft i maven, slagtilfælde, allergisk reaktion (overfølsomhed), besvær ved vandladning, ændrede resultater af leverfunktionstests, spiseforstyrrelser (anoreksi), ledsmerter, smerter, angst, ringen for ørerne (tinnitus), søvnløshed, vægtstigning, næseblod, opkastning, forstoppelse

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

Øget eller nedsat hjerterytme, leverbetændelse (hepatitis), nedsat antal hvide blodlegemer (leukopeni), som øger modtageligheden for betændelsestilstande, trykken for brystet, forstyrrelser i galdefunktionen (som ses ved mørk urin, farveløs eller fedtet afføring, voldsom kløe eller gulsot), øget mængde urinstof og kreatinin i blodet (viser påvirkning af nyrefunktionen), smertefuld, vedvarende rejsning af penis, nedsat antal blodplader (trombocytopeni) som ses ved at man nemt får blå mærker eller blødninger, hyppig vandladning, forstørrede bryster hos mænd, nældefeber, muskelkrampe eller -svaghed, nervøsitet, snurrende eller prikkende fornemmelse i huden, rødmen, hævelse i ansigtet, hårtab, uro, sløret syn, træthed

Følgende bivirkninger er forekommet hos patienter, der tager doxazosin, men hyppigheden er ikke kendt:

- Øjenproblemer (især hos patienter med grå stær)
- Smagsforstyrrelser
- Problemer med sædafgang

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre. Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted www.laegemiddelstyrelsen.dk.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Doxazosin Retard Arrow efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Doxazosin Retard Arrow indeholder:

- Denne medicin indeholder det aktive stof doxazosin (som doxazosinmesilat).

- Øvrige indholdsstoffer i tabletkernen: Macrogol, mikrokrySTALLinsk cellulose, povidon K 29-32, butylhydroxytoluen (E 321), a-tocopherol, vandfri silica kolloid og natriumstearyl fumarat. Øvrige indholdsstoffer i tabletovertrækket: Metacrylsyre-ethylacrylat copolymer (1:1) dispersion 30%, vandfri silica kolloid, macrogol 1300-1600 og titandioxid (E 171).

Udseende og pakningsstørrelser

Doxazosin Retard Arrow 4 mg er depottabletter. Disse tabletter er hvide, runde og hvælvede og præget med 'DL'.

Doxazosin Retard Arrow 4 mg fås i blisterpakninger med 10, 28, 30, 56, 98 eller 100 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Arrow Generics Limited
Unit 2, Eastman Way, Stevenage
Hertfordshire, SG1 4SZ
England

Fremstillere

Qualiti (Burnley) Limited, Talbot Street, Briercliffe, Burnley, Lancashire, BB10 2JY, Storbritannien eller
Juta Pharma GmbH, Gutenbergstrasse 13, 24941 Flensburg, Tyskland
eller
Selamine Limited T/A Arrow Generics (Ireland), Clonshaugh Industrial Estate, Clonshaugh, Dublin 17, Irland
eller
Arrow Generics Limited, Unit 2, Eastman Way, Stevenage, Hertfordshire, SG1 4SZ, Storbritannien
eller
Arrow (Pharm) Malta Ltd., 62 Hal Far Industrial Estate, Birzebbugia, BBG 3000, Malta
eller
Akmon Pharmaceutical Industries LLC, Industrijska cesta 1J, 1290 Grosuplje, Slovenien

Repræsentant

Arrow Pharma ApS
Sankt Peders Stræde 2, 1.
4000 Roskilde

Denne indlægsseddel blev senest revideret november 2010.