

flammazine® 1 % creme

Sølvulfadiazin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret flammazine® til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge flammazine®
3. Sådan skal du bruge flammazine®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

flammazine® bruges til forebyggelse og behandling af betændelse i brandsår.
Lægen kan have givet dig flammazine® for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE FLAMMAZINE®

Brug ikke flammazine®:

- Hvis du er overfølsom (allergisk) overfor sølvsulfadiazin eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- Hvis du er tæt på fødselstermin.
- På for tidligt fødte børn, eller gennem barnets første levemåneder, da sulfonamider kan forårsage kernikterus (gulsot).

Vær ekstra forsigtig med at bruge flammazine®

- Hvis du er overfølsom overfor systemiske sulfonamider.
- Ved betydelig nedsat lever- eller nyrefunktion, da der er risiko for nedsat udskillelse af absorberet sulfadiazin.
- Hvis du har glukose-6- fosfat dehydrogenase mangel, da dette kan medføre hæmolytisk anæmi (blodmangel pga. nedbrydning af de røde blodlegemer).

Brugen af flammazine® kan forsinke debrideringen (nedbrydelsen) af brandsårskorperne og kan ændre brandsårenes udseende.

Systemisk absorption af sølv i store sår og/eller efter længerevarende påføring kan forekomme og medføre klinisk sølvforgiftning.

flammazine® indeholder cetylalkohol, som kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontaktdermatitis). Indeholder desuden propylenglycol som kan give irritation af huden.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Under behandling af store brandsår, kan flammazine® påvirke effekten af visse typer medicin. Det ses specielt i forbindelse med behandling af midler mod sukkersyge (tabletbehandling) samt ved brugen af phenytoin (middel mod epilepsi).

Da sølv kan inaktivere enzymatiske sårbehandlingsprodukter kan samtidig brug ikke anbefales.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke bruge flammazine®. Tal med lægen.

Amning

flammazine® øger risikoen for gulsot hos det ammede barn. Tal derfor med din læge, inden behandlingen påbegyndes.

Trafik- og arbejdssikkerhed

flammazine® påvirker ikke eller kun i ringe grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i flammazine®

flammazine® indeholder cetylalkohol, som kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontaktdermatitis). Indeholder desuden propylenglycol som kan give irritation af huden.

3. SÅDAN SKAL BRUGE FLAMMAZINE®

Tag altid flammazine® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er:

Brandsåret renses, og flammazine® creme påføres på hele det berørte område i et 3-5 mm tykt lag. Såret dækkes med en ikke-hæftende forbindelse. Denne påføring udføres bedst med en hånd iført en steril handske og/eller en steril spatel. Påfør om nødvendigt cremen igen på områder, hvor cremen er forsvundet grundet aktivitet. Påføring af cremen bør gentages mindst 1 gang i døgnet eller oftere, hvis såret væsker meget.

Håndforbrændinger

flammazine® applikeres som ovenfor beskrevet, herefter anbringes hånden i en plastik pose eller handske, som lukkes omkring håndledet. Hånden og fingrene bør bevæges så meget som muligt.

Tuben bør kasseres 7 dage efter åbning.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Der bør udvises forsigtighed ved betydelig nedsat lever- eller nyrefunktion, da der er risiko for nedsat udskillelse af absorberet sulfadiazin.

Hvis du har brugt for meget flammazine® creme

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere flammazine® creme, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.
Tag pakningen med.

Hvis du har glemt at bruge flammazine®

Brug aldrig dobbelt mængde, hvis du har glemt en dosis.

Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at bruge flammazine®

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

4. BIVIRKNINGER

flammazine® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (det forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Hæmolytisk anæmi (alvorlig blodmangel med gulsot).

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Forbigående leukopeni (Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
- Kløe, brændende fornemmelse og udslæt (herunder eksem og kontaktdermatitis) ved det behandlede område.

Sjældne bivirkninger (det forekommer hos mellem 1-10 ud af 10.000 patienter):

- Sølvsforgiftning.

Meget sjældne bivirkninger (det forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Utilstrækkelig nyrefunktion.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

- Du kan opbevare flammazine® ved almindelig temperatur.
- Brug ikke flammazine® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Tuben bør kasseres 7 dage efter åbning.
- Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

flammazine® 1 % creme indeholder:

Aktivt stof: Sølvsulfadiazin.

Øvrige indholdsstoffer: Polysorbat 60, polysorbat 80, glycerolmonostearat, cetylalkohol, paraffinolie, propylenglycol, sterilt vand.

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende

flammazine® er en hvid creme i en plast tube.

Pakningsstørrelse

flammazine® fås i en pakningsstørrelse á 50 g. (Plast tube).

Ompakket og frigivet af:

2care4

Tømrervej

6710 Esbjerg V.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

2care4

Tømrervej

6710 Esbjerg V.

flammazine® er et registreret varemærke, som tilhører T.J. Smith & Nephew Limited.

flammazine® svarer til Flamazine®.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret marts 2010.