

Indlægsseddel: Information til brugeren

Amoxicillin/Clavulansyre 2care4

500/125 mg filmoverttrukne tabletter

Amoxicillin/Clavulansyre

02-2015
P114853-6

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Amoxicillin/Clavulansyre 2care4
3. Sådan skal du tage Amoxicillin/Clavulansyre 2care4
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Amoxicillin/Clavulansyre 2care4 anvendes til behandling af infektioner med bakterier, som er modstandsdygtige over for almindelige penicilliner. Amoxicillin er et antibiotikum af penicillintypen, medens clavulansyre er tilsat for at forstærke virkningen af amoxicillin.

Amoxicillin/Clavulansyre 2care4 dræber bakterierne ved at forhindre disse i at formere sig. Dette sker ved at den normale opbygning af cellevægge hos nye bakterier forhindres.

Amoxicillin/Clavulansyre 2care4 anvendes især til behandling af følgende infektioner hos voksne og børn:

- Mellemørebetændelse og bihulebetændelse.
- Betændelse i luftvejene.
- Betændelse i urinvejene.
- Betændelse i hud og blødt væv herunder tandkødsbetændelse.
- Betændelse i knogler og led.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

2. Dette skal du vide, før du begynder at tage Amoxicillin/Clavulansyre 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Amoxicillin/Clavulansyre 2care4

- hvis du er allergisk over for amoxicillin eller andre lignende penicilliner, clavulansyre eller et af de øvrige indholdsstoffer i Amoxicillin/Clavulansyre 2care4 (angivet i afsnit 6).
- hvis der ved tidligere behandling med lignende præparater er opstået nedsat leverfunktion (evt. gulsot).
- hvis du har haft en alvorlig allergisk reaktion (overfølsomhedsreaktion) over for et andet antibiotikum. Dette kan omfatte hududslæt eller hævelse af ansigt og hals.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Amoxicillin/Clavulansyre 2care4

- hvis du har nedsat nyre- eller leverfunktion.
- hvis du under behandlingen får forstyrrelser i mave og tarm med opkastninger og diaré.
- hvis du har blærekateter, skal det kontrolleres, at det ikke stopper til under behandlingen på grund af udfældning.
- hvis du ikke lader vandet regelmæssigt.
- hvis du har kyssepsyge (mononukleose).
- hvis du under behandlingen får feber og rødme.
- hvis du behandles med blodfortyndende medicin.

Brug af anden medicin sammen med Amoxicillin/Clavulansyre 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Tal med din læge, hvis du tager

- medicin mod urinsyreigt (allopurinol, probenecid).
- blodfortyndende medicin (acenocoumarol, warfarin).
- medicin mod kræft eller immuninflammatoriske sygdomme (methotrexat).

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Amoxicillin/Clavulansyre 2care4. Det kan påvirke prøveresultaterne.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage Amoxicillin/Clavulansyre 2care4. Tal med lægen.

Amning

Amoxicillin/Clavulansyre 2care4 går over i modermælken. Hvis du ammer, må du kun tage Amoxicillin/Clavulansyre 2care4 efter aftale med lægen. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål.

Trafik – og arbejdssikkerhed

Amoxicillin/Clavulansyre 2care4 kan give bivirkninger (f.eks. allergiske reaktioner, svimmelhed, kramper), der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du tage Amoxicillin/Clavulansyre 2care4

Tag altid Amoxicillin/Clavulansyre 2care4 nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Voksne og unge, der vejer over 40 kg

1 tablet 3 gange daglig.

Brug til børn, der vejer mindre end 40 kg

Børn, der er 6 år eller yngre, skal fortrinsvis behandles med amoxicillin/clavulansyre oral suspension eller breve.

Spørg lægen eller apoteket til råds, før du giver tabletter til børn, der vejer mindre end 40 kg.

Nedsat leverfunktion

Må ikke anvendes, hvis du tidligere har haft gulsot eller hvis du ved tidligere behandling med Amoxicillin/Clavulansyre 2care4 har fået nedsat leverfunktion.

Nedsat nyrefunktion

Det kan være nødvendigt at ændre dosis, hvis du har nyreproblemer. Tal med lægen.

Sådan skal du tage Amoxicillin/Clavulansyre 2care4

- Synk tabletterne hele med et glas vand i begyndelsen af et måltid eller lige før et måltid.
- Fordel doserne jævnt ud over dagen med mindst 4 timers mellemrum. Du må ikke tage 2 doser inden for 1 time.
- Du må ikke tage Amoxicillin/Clavulansyre 2care4 i mere end 2 uger. Hvis du stadig føler dig dårlig, skal du kontakte din læge igen.

Hvis du har taget for mange Amoxicillin/Clavulansyre 2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Amoxicillin/Clavulansyre 2care4, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Symptomer på overdosering: Mave-tarm symptomer og forstyrrelser i væske- og elektrolytbalancen er mulige. Krystaldannelse i nyrer kan opstå og kan fremkalde nedsat nyrefunktion.

Hvis du har glemt at tage Amoxicillin/Clavulansyre 2care4

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Amoxicillin/Clavulansyre 2care4

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.

- Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

- Almen sløghed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt læge eller skadestue.
- Nyresvigt ledsaget af alvorlig blodmangel med gulsot og blødninger i huden. Kontakt læge eller skadestue.
- Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
- Leverbetændelse, gulsot med hudkløe. Kontakt læge eller skadestue.
- Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber (Steven-Johnsons syndrom). Kontakt læge eller skadestue.
- Kraftig afskallning og afstødning af hud (toksisk epidermal nekrolyse). Kontakt læge eller skadestue.
- Langsom aftagende nyrefunktion med anfald af smerter over lænden, plumret eller blodig urin pga. nyreskade. Kontakt læge eller skadestue. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):

- Diarré (hos voksne).

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.

- Svampeinfektion (Candida) på hud og slimhinder.
- Mavebesvær (symptomer kan være mavesmerter, kvalme, opkastninger, øget dannelse af tarmluft, diarré). Kan forbedres ved at indtage Amoxicillin/Clavulansyre 2care4 ved måltider.
- Moderat stigning i leverenzym-koncentrationerne.

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

- Svimmelhed.
- Hovedpine.
- Fordøjelsesbesvær.
- Hududslæt, kløe.
- Ophøjet, kløende hududslæt (nældefeber).
- Øgning af visse stoffer (enzym), der bliver produceret i leveren.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.

- Almen sløghed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
- Betændelse i huden med blærer.
- Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben (Erythema multiforme).

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

- Overvækst af ikke-følsomme mikroorganismer (resistens-udvikling).
- Forlænget blødningstid.
- Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
- Overfølsomhedsreaktion i form af utilpashed, feber, udslæt og smerter.
- Feber, træthed, sløghed pga. betændelse i blodkar (overfølsomhedsvaskulitis).
- Hyperaktivitet.
- Kramper (set ved behandling med høje doser og ved nedsat nyrefunktion).

- Tyktarmsbetændelse, der medfører vandig diarré, som regel med blod og slim, mavesmerter og/eller feber. Kontakt din læge så hurtigt som muligt for råd, hvis du får disse symptomer.
- Sort tunge, der ser behåret ud.
- Et udbredt rødt hududslæt med små blærer med pus (bulløs eksfoliativ dermatitis).
- Krystaller i urinen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

Sundhedsstyrelsen via

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: sst@sst.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Amoxicillin/Clavulansyre 2care4 utilgængeligt for børn.

Opbevar Amoxicillin/Clavulansyre 2care4 ved 25 °C eller under.

Tag ikke Amoxicillin/Clavulansyre 2care4 efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester.

Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Amoxicillin/Clavulansyre 2care4 indeholder:

- Aktive stoffer: Amoxicillin 500 mg svarende til 574 mg amoxicillintrihydrat og clavulansyre 125 mg svarende til 148,9 mg clavulansyre, kaliumsalt.
- Øvrige indholdsstoffer: Magnesiumstearat, talkum, povidon, mikrokrySTALLinsk cellulose, croscarmellosenatrium, triethylcitrat, hypromellose, ethylcellulose, natriumlaurylsulfat, cetylalkohol samt titandioxid (E171).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Amoxicillin/Clavulansyre 2care4 er en hvid aflang, bikonveks filmovertrukken tablet med delekærv på begge sider.

Pakningsstørrelser

Amoxicillin/Clavulansyre 2care4 findes i en pakningsstørrelse á 32 stk.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

Ompakket og frigivet af

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

Amoxicillin/Clavulansyre 2care4 svarer til Bioclavid®.

Denne indlægsseddel blev senest revideret februar 2015