

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

QUINAPRIL ORIFARM5 mg, 10 mg og 20 mg, filmoverttrukne tabletter
Quinapril

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du får måske brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

 Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse.
2. Vigtig information, som du skal læse, før du tager Quinapril Orifarm.
3. Sådan skal du tage Quinapril Orifarm.
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring.
6. Yderligere information.

1. Virkning og anvendelse.

Quinapril Orifarm er medicin af typen ACE-hæmmere, som nedsætter blodtrykket.

Du kan tage Quinapril Orifarm mod for højt blodtryk og hjertesvigt.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Vigtig information, som du skal læse, før du tager Quinapril Orifarm.**Tag ikke Quinapril Orifarm, hvis du**

- er overfølsom over for det aktive indholdsstof quinapril eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer.
- er overfølsom over for anden medicin, der også tilhører gruppen af ACE-hæmmere.
- ved tidligere behandling med ACE-hæmmere har haft overfølsomhedsreaktioner med hævelser i ansigt, af læber, tunge og/eller svælg.
- lider af allergiske hævelser i hud og slimhinder.
- er gravid eller planlægger at blive det.

Særlige forholdsregler

Fortæl lægen, hvis du:

- har dårlige nyrer.
- har dårlig lever.
- har forsnævrede blodårer i nyrerne.
- har lavt blodtryk.
- har hjertesvigt.
- for nylig har haft hjertesvigt efter blodprop i hjertet.
- har sygdom i hjerteklapperne eller hovedpulsåren.
- er i dialyse.
- lider af allergiske hævelser i hud og slimhinder
- får vanddrivende medicin eller er på streng saltfattig kost.
- for nylig har fået nyretransplantation.
- er gravid
- får behandling mod overfølsomhed over for insektstik (desensibilisering).
- får rensat blodet for kolesterol.
- har diabetes.
- har forhøjet blodtryk på grund af en sygdom i binyrerne (primær hyperaldosteronisme, Conn's sygdom).

Hvis du skal bedøves, skal du fortælle lægen/tandlægen, at du tager Quinapril Orifarm, da blodtrykket kan falde kraftigt.

Hvis du har diabetes, skal du følge din blodglukose nøje, især i starten af behandlingen.

Du bør ikke tage Quinapril Orifarm, hvis du er i behandling med medicin mod mani og depression (lithium).

Quinapril Orifarm kan give tør hoste, som forsvinder ved ophør med medicinen.

Quinapril Orifarm virker mindre godt hos sorte.

Behandling af hjertesvigt er en specialstopgave. Du vil derfor normalt være indlagt, når du starter din behandling.

Brug af Quinapril Orifarm sammen med mad og drikkevarer

Du kan tage Quinapril Orifarm sammen med mad og drikke. Hvis du drikker alkohol, kan det øge virkningen af Quinapril Orifarm.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du tager nogen form for medicin.

Graviditet: Du må ikke tage Quinapril Orifarm, hvis du er gravid. Ved graviditet eller ønske herom bør du ændre eller afbryde behandlingen efter aftale med lægen.**Amning:** Hvis du ammer, må du ikke tage Quinapril Orifarm, da quinapril bliver udskilt i modermælken.**Trafik- og arbejdssikkerhed**

Quinapril Orifarm kan, særlig i starten af behandlingen, hos enkelte give bivirkninger, der kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin som er købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Fortæl lægen, hvis du tager:

- medicin mod betændelse (tetracyclin)
- vanddrivende medicin (f.eks. furosemid)
- kaliumtilskud eller kaliumholdig salttilskud
- kaliumbesparende, vanddrivende medicin
- medicin mod mani og depression (lithium)
- smertestillende medicin af typen NSAID
- medicin mod urinsyreigt (allupurinol)
- kræftmedicin
- binyrebarkhormon (kortikosteroider)
- epilepsimedicin (fenemal, primidon)
- medicin mod sindssygdom (psykoser)
- medicin mod depression (tricykliske antidepressiva)
- stærk smertestillende medicin (morfin og lignende)
- anden medicin mod for højt blodtryk (f.eks. beta-blokkere, methyldopa)
- medicin mod voldsomme allergiske reaktioner (Epi-pen med adrenalin)
- medicin mod urinvejsinfektion (trimethoprim)
- insulin eller tabletter mod diabetes
- medicin mod for meget mavesyre
- medicin mod hjerte-rytmeforstyrrelse (procainamid)
- medicin der hæmmer immunforsvaret.

3. Sådan skal du tage Quinapril Orifarm.

Tabletter 10 og 20 mg: Du skal kun dele tabletten i 2 halve, hvis du har svært ved at sluge en hel tablet. Hvis du deler tabletten, skal du altid tage de 2 halve tabletter lige efter hinanden.

Voksne:**For højt blodtryk:**

Du skal normalt begynde med 1 tablet på 10 mg 1 gang daglig. Efter 4 uger vil lægen måske ændre din dosis. Din dosis kan stige til 1-2 tabletter på 20 mg 1 gang daglig eller 1 tablet på 20 mg 2 gange daglig. Du skal følge lægens anvisning.

Hvis du får vanddrivende medicin, skal du begynde med en halv tablet på 5 mg (=2,5 mg) 1 gang daglig. Du skal følge lægens anvisning.

Hjertesvigt:

Du skal normalt begynde med en halv tablet på 5 mg (=2,5 mg) 1 gang daglig. Din dosis kan stige til højst 1 tablet på 20 mg 2 gange daglig eller 2 tabletter på 20 mg (i alt 40 mg) 1 gang daglig. Du skal følge lægens anvisning.

Ældre:

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Du skal følge lægens anvisning.

Børn:

Du må kun bruge Quinapril Orifarm til børn efter lægens anvisning.

Nedsat nyrefunktion:

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Du skal følge lægens anvisning.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændringer eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Har du taget for mange Quinapril Orifarm

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Quinapril Orifarm, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Symptomer på overdosering er for lavt blodtryk, chok, sløvhedstilstand, langsom puls, nyrsvigt. Forstyrrelser i elektrolytbalancen (f.eks. tørst, svækkelse, ligegyldighed, muskelsmerter- eller krampes, opkastning).

Har du glemt at tage Quinapril Orifarm

Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du tage denne straks, du kommer i tanke om den, hvis ikke det er tid for næste dosis. Du må ikke tage dobbelt dosis.

4. Bivirkninger.

Quinapril Orifarm kan som al anden medicin give bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Forandringer i blodet der kan vise sig ved træthed samt infektioner og feber. Kontakt straks lægen.
- Hjertekrampe, brystmerter (angina pectoris). Kontakt lægen.
- Hurtig, uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Hjertestop. Ring 112.
- Betændelse i bugspytkirtlen (voldsomme mavesmerter og feber). Kontakt straks læge eller skadestue.
- Alvorligt udslett med betændelse og afstødning af hudens øverste lag. Kontakt straks læge eller skadestue.
- Voldsom allergisk reaktion med hævelse af ansigt, svælg, tunge og slimhinder. Kan tillukke luftvejene. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Skummende urin på grund af æggehvidestof i urinen. Kontakt lægen.

Sjældne bivirkninger (det sker hos 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Forandringer i blodet, der kan vise sig ved feber, bleghed, blødnin-ger i huden og slimhinder, blå mærker, infektioner og udtalt træthed. Søg straks læge.
- Overfølsomhedsreaktioner f.eks. vejrtrækningsbesvær, åndenød, pludseligt hududslæt og besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Depression. Kontakt lægen.
- Blodprop i hjertet (stærke brystmerter). Ring 112.
- Anfald af svigtende blodtilførsel til hjernen (forbigående lammelser og talebesvær) Kontakt straks læge eller skadestue.
- Lungesygdom med hoste og feber. Kontakt lægen.
- Hjerneblødning, halvsidig lammelse, tale- og føleforstyrrelser. Ring. 112.
- Åndedrætsbesvær, astmalignende anfald. Søg straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Forværring af astma. Kontakt lægen.
- Tarmslyng med voldsomme, turevise mavesmerter. Kontakt straks læge eller skadestue.
- Betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.
- Kraftig hudafskalning. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter)

- Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
- Nyrsvigt. Kontakt læge eller skadestue.
- Allergiske hævelser i og omkring tarmene der viser sig ved mavesmerter, evt. kvalme og opkastning. Søg straks læge.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Muskelsvaghed, forvirring, talebesvær pga. for højt kalium i blodet. For højet kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjer-testop). Tal med lægen.
- Svimmelhed, hovedpine, prikkende og stikkende fornemmelse i huden.
- Lavt blodtryk.
- Hoste.
- Mavesmerter, diarré, fordøjelsesbesvær, kvalme, opkastning.

- Rygsmerter, muskelsmerter.
- Træthed.
- Ændret serum kreatinin (udtryk for nyrernes funktion).

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Søvnforstyrrelser, nervøsitet, søvnighed.
- Hjertebanken.
- Svimmelhed, når du rejser dig op.
- Halsbetændelse, bihulebetændelse.
- Tørhed i mund eller hals.
- Luftafgang fra tarmen.
- Kløe, hududslæt, øget sved, eksem, nældefeber.
- Ledsmerter.
- Urinvejsinfektioner.
- Impotens.
- Væskeophobning i arme og ben.

Sjældne bivirkninger (det sker hos 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Smarter og føleforstyrrelser pga. nervebetændelse
- Konfusion.
- Uklart syn, "sløvt øje" (amblyopia) lysfølsomhed.
- Tinnitus.
- Besvimelse.
- Åndenød, bronchitis, forkølelse.
- Ændret smagsoplevelse, forstoppelse, betændelse i tungen.
- Forringelse af nyre eller leverfunktion.
- Opblomstring af psoriasis, hårtab.

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter)

- Allergisk lungebetændelse (alveolitis).

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her, så bi-virkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl læge eller apotek, hvis de får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: <http://www.meldenbivirkning.dk>.

5. Opbevaring.

- Opbevar Quinapril Orifarm utilgængeligt for børn.
- Opbevar ikke Quinapril Orifarm over 25 °C.
- Anvend ikke Quinapril Orifarm efter den udløbsdato, der står på pakningen.

6. Yderligere information.

Aflever altid medicinrester på apoteket.

Quinapril Orifarm indeholder

Det virksomme indholdsstof i Quinapril Orifarm er: Quinaprilhydrochlorid svarende til quinapril 5 mg, 10 mg eller 20 mg.

De øvrige indholdsstoffer er:

Tungt magnesiumcarbonat, vandfri calciumhydrogenphosphat, gelatine, crospovidon, magnesiumstearat, hypromellose, titandioxid (E 171), macrogol 6000 og macrogol 400.

Udseende

Tablet på 5 mg: Hvid, oval fillovertrukket tablet mærket "5" på den ene side og med delekærv på begge sider.

Tablet på 10 mg: Hvid, oval fillovertrukket tablet mærket "10" på den ene side og med delekærv på begge sider.

Tablet på 20 mg: Hvid, oval fillovertrukket tablet mærket "20" på den ene side og med delekærv på begge sider.

Pakningsstørrelser

28, 30, 49, 50, 56, 98, 100

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Markedsføring i Danmark

Orifarm Generics A/S, Energivej 15, DK-5260 Odense S
Mail: info@Orifarm.com

For yderligere oplysninger om dette lægemiddel og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm Generics A/S.



(01) 3086101

Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 Odense S
Tlf.: +45 6395 2700