

INDLÆGGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

XYZAL®

5 mg filmovertrukne tabletter
Levocetirizindihydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apoteket, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Xyzal® til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkningen af Xyzal® og hvad du skal bruge det til.
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Xyzal®.
3. Sådan skal du tage Xyzal®.
4. Bivirkninger.
5. Sådan opbevarer du Xyzal®.
6. Yderligere oplysninger.

1. Virkningen af Xyzal® og hvad du skal bruge det til

Xyzal® er et antihistamin til brug mod allergiske reaktioner.

Xyzal® virker ved at hæmme virkningen af histamin, som medvirker ved udviklingen af den allergiske reaktion.

Du kan tage Xyzal® til behandling af høfeber og helårssnue (allergisk rhinit inklusiv persisterende allergisk rhinit) og kronisk nældefeber.

Lægen kan have givet dig Xyzal® til anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Xyzal®

Tag ikke Xyzal®

- hvis du er overfølsom over for levocetirizindihydrochlorid, andre antihistaminer eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- hvis du har alvorligt nedsat nyrefunktion.

Vær ekstra forsigtig med at tage Xyzal®

Anvendelse af Xyzal® anbefales ikke til børn under 6 år da det med filmovertrukne tabletter ikke er muligt at justere dosis.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Brug af Xyzal® sammen med mad og drikke

- Du kan tage Xyzal® i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.
- Vær forsigtig med at tage Xyzal® samtidig med alkohol da det kan påvirke centralnervesystemet.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet:

- Hvis du er gravid, må du kun tage Xyzal® efter aftale med lægen.

Amning:

- Hvis du ammer, må du kun tage Xyzal® efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Xyzal® kan hos enkelte give bivirkninger (døsighed, træthed, kraftsløshed), som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Xyzal®

Denne medicin indeholder lactose. Hvis din læge har fortalt dig at du ikke tåler visse sukkerarter, så kontakt lægen inden du tager Xyzal®.

3. Sådan skal du tage Xyzal®

Tabletterne bør indtages hele sammen med rigelig mængde vand (1½ dl).

Den sædvanlige dosis er

Voksne og unge fra 12 år:
1 tablet dagligt.

Ældre:

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Børn:

Børn i alderen 6-12 år: 1 tablet dagligt.

Du kan normalt ikke bruge Xyzal®, 5 mg filmovertrukne tabletter til børn mellem 2 og 6 år.

Nedsat nyrefunktion:

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Nedsat leverfunktion:

Det er normalt ikke nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Tag altid Xyzal® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteket.

Hvis du har taget for mange Xyzal®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Xyzal®, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer:

Symptomer hos voksne kan være døsighed og hos børn uro og ophidselse efterfulgt af træthed.

Hvis du har glemt at tage Xyzal®

Tag aldrig dobbeltdosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at tage Xyzal®

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om eller følger dig usikker på.

4. Bivirkninger

Xyzal® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Døsighed, træthed.
- Hovedpine.
- Mundtørhed.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Mavesmerter, kraftsløshed.

Hypigheden er ikke kendt (sandsynligvis sjælden):

- Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.
- Truende, evt. voldelig adfærd. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.
- Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
- Åndenød / åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.
- Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
- Rastløs uro.

- Synsforstyrrelser.
- Hjertebanken.
- Kvalme.
- Kløe, udslæt, nældefeber.
- Muskelsmerter.
- Vægtøgning.

Xyzal® kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. leverfunktionsværdier, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Nye bivirkninger bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: <http://www.laegemiddelstyrelsen.dk>

5. Sådan opbevarer du Xyzal®

- Opbevar Xyzal® utilgængeligt for børn.
- Ingen særlige opbevaringsbetingelser.
- Tag ikke Xyzal® efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Xyzal®, 5 mg, fillovertrukne tabletter indeholder:

Aktivt stof:

Levocetirizindihydrochlorid 5 mg.

Øvrige indholdsstoffer:

Mikrokrystallinsk cellulose, lactosemonohydrat, kolloid vandfri silica, magnesiumstearat, hypromellose, titandioxid (E 171), macrogol 400.

Pakningsstørrelser:

Xyzal® 5 mg i pakninger med 10, 14, 28, 30, 90 og 98 fillovertrukne tabletter.

Alle pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S.

