

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Ciprofloxacin BMM Pharma, 250 mg filmoovertrukne tabletter
Ciprofloxacin BMM Pharma, 500 mg filmoovertrukne tabletter
Ciprofloxacin BMM Pharma, 750 mg filmoovertrukne tabletter

Ciprofloxacinhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Ciprofloxacin BMM Pharma til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ciprofloxacin BMM Pharma
3. Sådan skal du tage bruge Ciprofloxacin BMM Pharma
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Den nyeste indlægsseddel kan altid findes på www.indlaegsseddel.dk.

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Navnet på din medicin er Ciprofloxacin BMM Pharma filmoovertrukne tabletter men vil i resten af denne indlægsseddel blive omtalt som Ciprofloxacin.

Ciprofloxacin er et antibiotikum, som tilhører gruppen af fluorquinoloner. Det aktive stof er ciprofloxacin. Ciprofloxacin virker ved at dræbe de bakterier, der er skyld i infektionen. Det virker kun mod specifikke bakteriestammer.

Voksne

Hos voksne anvendes Ciprofloxacin til at behandle følgende bakterielle infektioner:

- Luftvejsinfektioner
- Langvarig eller tilbagevendende øre- eller bihulebetændelse
- Urinvejsinfektioner
- Infektioner i testiklerne
- Infektioner i de kvindelige kønsorganer
- Infektioner i mave-tarmkanalen og bughulen
- Infektioner i hud og bløddede
- Infektioner i knogler og led
- Til behandling af infektioner hos patienter med et meget lavt antal hvide blodceller (neutropeni)

- Til forebyggelse af infektioner hos patienter med et meget lavt antal hvide blodceller (neutropeni)
- Til forebyggelse af infektioner forårsaget af bakterien *Neisseria meningitidis*
- Miltbrand eksponering ved indånding

Hvis du har en alvorlig infektion eller en der er forårsaget af mere end én type bakterie kan du få supplerende antibiotisk behandling som supplement til Ciprofloxacin.

Børn og unge

Under tilsyn af en lægelig specialist kan Ciprofloxacin anvendes til at behandle følgende bakterielle infektioner:

- Infektioner i lunger eller bronkier hos børn og unge, der lider af cystisk fibrose
- Komplerede urinvejsinfektioner herunder infektioner, der har nået nyrerne (pyelonephritis)
- Miltbrand eksponering ved indånding

Ciprofloxacin kan også anvendes til at behandle andre specifikke alvorlige infektioner hos børn og unge, når lægen anser det for nødvendigt.

Lægen kan have givet dig Ciprofloxacin for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE CIPROFLOXACIN

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Ciprofloxacin:

- hvis du er allergisk over for det aktive stof, andre lægemidler i gruppen af quinoloner eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ciprofloxacin (angivet i pkt. 6).
- hvis du tager tizanidin (se pkt. 2: Brug af anden medicin sammen med Ciprofloxacin BMM Pharma).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket, før du tager Ciprofloxacin BMM Pharma

- nogensinde har haft problemer med nyrerne, fordi det kan være nødvendigt at justere din behandling
- lider af epilepsi eller andre neurologiske sygdomme
- tidligere har haft problemer med dine sener ved behandling med antibiotika såsom Ciprofloxacin
- har myasthenia gravis (en type af muskelsvækkelse)
- tidligere har haft unormal hjerterytme (arytmier) herunder at blive født med lidelsen "medfødt forlænget QT-interval"
- tidligere har haft en hjertesygdom (herunder hjertesvigt, hjerteanfald, langsom hjerterytme)

Hjerteproblemer

Du skal være forsigtig, når du tager denne slags medicin, hvis du er født med et forlænget QT-interval (som ses på et hjertediagram (EKG), der er en elektrisk registrering af hjertet), eller hvis det findes i familien, hvis du har forstyrrelser af saltbalancen i blodet (særligt lavt kalium- eller magnesiumindhold), hvis du har en meget langsom hjerterytme (som kaldes bradykardi), hvis du har dårligt hjerte (hjertesvigt), hvis du har haft et hjerteanfald (myokardieinfarkt), hvis du er kvinde eller

ældre, eller hvis du tager anden medicin, som kan medføre ændringer i hjertediagrammet (se afsnittet Brug af anden medicin sammen med Ciprofloxacin BMM Pharma).

Når du tager Ciprofloxacin

Fortæl det straks til din læge, hvis noget af følgende optræder mens du tager Ciprofloxacin. Din læge vil afgøre, om behandlingen med Ciprofloxacin skal stoppes.

- Pludselig alvorlig allergisk reaktion (*en anafylaktisk reaktion/chok, angioødem*). Selv med den første dose er der en lille risiko for at du kan opleve en alvorlig allergisk reaktion med følgende symptomer: trykken i bryste, svimmelhed, kvalme eller besvimelse, eller du oplever svimmelhed når du står op, hævelse i ansigt eller hals. Hvis noget af dette sker skal du stoppe med at tage Ciprofloxacin og straks kontakte din læge.
- Smerter og hævelse i led og sener kan forekomme lejlighedsvis især, hvis du er ældre og også behandles med kortikosteroider. På det første tegn på smerte eller betændelse skal du stoppe med at tage Ciprofloxacin og hvile de smertefulde områder. Undgå unødvendig bevægelse, da dette kan øge risikoen for et senebrud. Denne risiko kan vare flere måneder efter ophør med ciprofloxacin behandlingen.
- **Hvis du lider af epilepsi eller anden neurologisk sygdom** såsom blodprop i hjernen eller slagtilfælde, kan du opleve bivirkninger forbundet med det centrale nervesystem. Hvis dette sker, skal du stoppe med at tage Ciprofloxacin og straks kontakte din læge.
- Du kan opleve psykiske reaktioner, første gang du tager Ciprofloxacin. Hvis du lider af depression eller en psykisk sygdom kan dine symptomer blive forværret under behandling med Ciprofloxacin. Du kan få selvmordstanker eller forsøge selvmord. Hvis noget af dette sker skal du stoppe med at tage Ciprofloxacin og straks kontakte din læge.
- Du kan opleve symptomer på neuropati, såsom smerter, svien, snurren, følelsesløshed og/eller svaghed. Hvis dette sker skal du stoppe med at tage Ciprofloxacin og straks kontakte din læge.
- Du kan opleve at få diarré mens eller endda flere uger efter du er holdt op med at tage antibiotika herunder Ciprofloxacin. Hvis det bliver alvorligt eller vedvarende, eller du bemærker at din afføring indeholder blod eller slim skal du straks stoppe med at tage Ciprofloxacin da dette kan være livstruende. Du må ikke tage medicin der virker stoppende på din afføring. Kontakt din læge.
- Fortæl din læge eller apoteket at du tager Ciprofloxacin, hvis du skal give en blod- eller urinprøve.
- Ciprofloxacin kan forårsage leverskade. Hvis du bemærker symptomer som appetitløshed, gulsot (gulfarvning af huden), mørk urin, kløe eller ømhed i maven skal du stoppe med at tage Ciprofloxacin og straks kontakte din læge.
- Ciprofloxacin kan forårsage en reduktion i antallet af hvide blodceller og din modstandsdygtighed mod infektioner kan være nedsat. Hvis du oplever en infektion med symptomer som feber og alvorlig forværring af din generelle tilstand, eller feber med symptomer som ondt i halsen eller vandladningsproblemer, bør du straks kontakte din læge. En blodprøve vil blive taget for at kontrollere en mulig reduktion af de hvide blodceller. Det er vigtigt at informere din læge om din medicin.

- Fortæl din læge, hvis du eller et medlem af din familie har en kendt mangel på glukose-6-fosfat-dehydrogenase (G6PD), da du kan have en risiko for at få blodmangel ved behandling med ciprofloxacin.
- Din hud bliver mere følsom overfor sollys eller ultraviolet (UV) lys når du tager Ciprofloxacin. Undgå udsættelse for stærkt sollys eller kunstigt UV-lys som solarium.

Brug af anden medicin sammen med Ciprofloxacin BMM Pharma

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Du skal fortælle det til lægen, hvis du tager anden medicin, som kan ændre hjerterytmen: medicin, som tilhører gruppen af antiarytmika (f.eks. quinidin, hydroquinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), tricykliske antidepressiva, visse midler mod infektioner (som tilhører gruppen makrolider) og visse midler mod sindslidelser (antipsykotika).

Tag ikke Ciprofloxacin sammen med tizanidin, da dette kan give bivirkninger såsom lavt blodtryk og søvnighed (*se pkt. 2 Tag ikke Ciprofloxacin*).

Følgende lægemidler er kendt for at interagere med Ciprofloxacin i din krop. Tages Ciprofloxacin sammen med disse lægemidler kan det påvirke den terapeutiske effekt af disse lægemidler. Det kan også øge risikoen for bivirkninger.

Fortæl det til din lægen, hvis du tager:

- Warfarin eller anden oral antikoagulant (blodfortyndende) såsom acenocomarol, phenprocoumon eller fluindion).
- Probenecid (gigtmiddel)
- Methotrexat (mod nogle typer kræft, psoriasis og leddegigt)
- Theophyllin (for vejrtrækningsproblemer)
- Clozapin eller olanzapin (antipsykotisk midler)
- Ropinirol (mod Parkinsons sygdom)
- Pheytin (mod epilepsi)
- Duloxetin (mod depression)
- Glibenclamid (mod diabetes)
- Lidocain (lokal smertestillende)
- sildenafil (impotens)
- ciclosporin (for at forhindre afstødning af transplanterede organer)
- omeprazole (mod fordøjelsesbesvær og GERD)
- metoclopramid (anvendes til forebyggelse af kvalme og opkastning)
- en type af antibiotika kaldet makrolider, fx azithromycin, clathrithromycin, erythromycin osv.
- medicin til behandling af depression kendte som tricykliske antidepressiva f.eks amitriptylin, clomipramin, nortriptylin osv.
- medicin til behandling af uregelmæssig hjerterytme fx quinidin, procainamid, aminodaron osv.
- medicin til behandling af psykotiske sygdomme som skizofreni og bipolar lidelse

Ciprofloxacin kan øge niveauet af følgende medicin i blodet:

- Pentoxifyllin (for kredsløbslidelser)
- Koffein

Visse typer af lægemidler kan nedsætte effekten af Ciprofloxacin. Fortæl din læge, hvis du tager eller ønsker at tage:

- Syreneutraliserende
- Mineraltilskud
- Sulcrafat (middel mod mavesår)
- En polymer fosfatbinder (f.eks. sevelamer, middel mod for meget fosfat)
- Lægemidler eller kosttilskud som indeholder calcium, magnesium, aluminium eller jern

Hvis disse præparater er af afgørende betydning, tages Ciprofloxacin cirka to timer før eller ikke senere end fire timer efter dem.

Brug af Ciprofloxacin sammen med mad og drikke

Medmindre du tager Ciprofloxacin under et måltid, må du ikke spise eller drikke mælkeprodukter (såsom mælk eller yoghurt) eller drikkevarer med tilsat kalk når du tager tabletterne, da det kan påvirke optagelsen af lægemidlet.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel.

Det er bedst at undgå brugen af Ciprofloxacin under graviditet. Fortæl din læge, hvis du planlægger at blive gravid.

Tag ikke Ciprofloxacin mens du ammer, da ciprofloxacin udskilles i modermælken og kan være skadeligt for dit barn.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ciprofloxacin kan få dig til at føle dig mindre opmærksom og påvirke din evne til at reagere. Derfor skal du vide, hvordan du reagere på Ciprofloxacin før du kører bil eller betjener maskiner. Hvis du er i tvivl så tal med din læge.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE CIPROFLOXACIN

Tag altid Ciprofloxacin nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Din læge vil fortælle dig præcist, hvor mange Ciprofloxacin tabletter du skal tage, samt hvor ofte og hvor længe. Dette vil afhænge af den type af infektion du har og hvor slem den er.

Fortæl din læge, hvis du lider af nyreproblemer, da din dosis måske skal ændres.

Behandlingen vare normalt fra 5 til 21 dage men kan vare længere tid ved alvorlige infektioner. Tag tabletterne nøjagtig som din læge har fortalt dig. Spørg din læge eller på apoteket, hvis du usikker på, hvor mange tabletter du skal tage og hvordan man tager Ciprofloxacin.

- Synk tabletterne med rigeligt væske. Tyg ikke tabletter da de ikke smager godt.
- Forsøg at tag tabletter omkring samme tid hver dag.
- Du kan tage tabletter til måltiderne eller mellem dem. Men du må ikke tage Ciprofloxacin tabletterne sammen med mejeriprodukter såsom mælk eller yoghurt eller drikkevarer tilsat calcium (f.eks. calcium-beriget appelsinjuice).

Husk at drikke rigeligt med væske mens du tager Ciprofloxacin.

Hvis du har taget for mange Ciprofloxacin tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Ciprofloxacin tabletter, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas. Tag æsken med.

Hvis du har glemt at tage Ciprofloxacin

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Vær sikker på at gennemføre dit behandlingsforløb.

Hvis du holder op med at tage Ciprofloxacin

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Ciprofloxacin.

Det er vigtigt at du fuldfører behandlingen selvom du begynder at få det bedre efter nogle få dage. Hvis du stopper med at tage denne medicin for hurtigt, er din infektion formentlig ikke helt helbredt og symptomerne på infektionen kan vende tilbage eller blive forværret. Du kan også udvikle resistens overfor antibiotikummet.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis nogen af bivirkningerne bliver alvorlige, eller hvis du bemærker nogen form for bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel, så fortæl det til din læge eller på apoteket.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Kvalme, diarré
- Ledsmerter hos børn

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Alvorlige svampeinfektioner
- En høj koncentration af eosinofile, en type af hvide blodceller
- Tab af appetit (anorexi)
- Hyperaktivitet eller rastløs uro (agitation)
- Hovedpine, svimmelhed, søvnproblemer eller smagsforstyrrelser
- Opkasning, mavesmerter, fordøjelsesproblemer såsom maveproblemer (forstoppelse / halsbrand) eller luft i maven.
- Øget mængde af visse stoffer i blodet (transaminase og/eller bilirubin)
- Udslæt, kløe eller nældefeber
- Ledsmerter hos voksne
- Dårlig nyrefunktion
- Smerter i muskler og knogler, kraftløshed og svaghed (asteni) eller feber
- Stigning i blodets alkaliske fosfatase (et bestemt stof i blodet)

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Betændelse i tarmen (colitis) i forbindelse med anvendelse af antibiotika (kan være dødelig i meget sjældende tilfælde. Se pkt. 2: Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin)
- Ændringer i antallet af blodceller (*leukopeni, leukocytose, neutropeni, anæmi*), forhøjet eller nedsat mængde af faktorer til blodets størkning (*trombocytter*).
- Allergisk reaktion, hævelse (*ødem*) eller hurtig hævelse af hud og slimhinder (*angio-ødem*).
- Forhøjet blodsukker (*hyperglykæmi*).
- Forvirring, desorientering, angst reaktioner, mærkelige drømme, depression (inklusive selvmordstanker og selvmordsforsøg) eller hallucinationer.
- Prikken og stikken (i huden), usædvanlig følsomhed eller nedsat følsomhed i huden
- Rystelser, kramper herunder anfald uden kramper nogengange kendt som 'absencer (non-konvulsive status epilepticus) (se pkt. 2: Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin) eller svimmelhed
- Synsproblemer herunder dobbeltsyn (diplopia)
- Tab af hørelse, ringen for ørerne, nedsat hørelse
- Hurtig hjertebanken (*tachycardi*)
- Udvidelses af blodkarrene (vasodilation), lavt blodtryk eller besvimelse
- Åndenød inklusiv astmatiske symptomer
- Leversygdomme, gulsot (ikterus kolestase) eller leverbetændelses
- Lysfølsomhed (Se pkt. 2: Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin)
- Muskelsmerter, ledbetændelse, øget muskelspænding eller krampe
- Nyresvigt, blod eller krystaller i urinen (Se pkt. 2: Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin)
- Betændelse i urinvejene eller i nyrerne
- Væskeophobning eller overdreven svedtendens
- Unormalt indhold af størkningsfaktoren (protrombin) eller forhøjet indhold af enzymet amylase, som kan findes ved rutine blodprøver

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Reduktion af røde blodceller (hæmolytisk anæmi)
- Reduktion af en type af hvide blodceller (agranulocytose)
- Reduktion i antallet af røde og hvide blodceller og blodplader (pancytopeni) som kan være dødelig
- Knoglemarvsdepression, som kan være dødelig (se pkt. 2: Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin)
- Alvorlig allergiske reaktioner (anafylaktiske reaktioner eller anafylaktisk chok, som kan være dødelig – serum) (se pkt. 2: Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin)
- Mentale forstyrrelser (psykotiske reaktioner) herunder selvmordstanker og selvmordsforsøg (se pkt. 2: Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin)
- Migræne, forstyrret kordination, usikker gang (gangforstyrrelser)
- Forstyrrelser i lugtesansen (olfaktorisk forstyrrelse)
- Øget tryk i hjernen (intrakranial tryk)
- Visuel farve forstyrrelser
- Betændelse i væggene af blodkarrene (vasculitis)
- Betændelse i bugspytkirtlen (pankreatitis)
- Døde leverceller (lever nekrose), meget sjældent førende til livstruende leversvigt
- Små, prik-blødninger under huden
- Forskellige hududslæt eller udslæt (for eksempel det potentielt dødelige Stevens-Johnson syndrom eller toksis epidermal nekrolyse)
- Muskelsvaghed
- Sene betændelse

- Sene brud – især af de lange sener bag på anklen (Achillesenen) (se pkt. 2: Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin)
- Forværring af symptomerne på alvorlig muskelsvækkelse (myastheni gravis) (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin)

Frekvens ikke kendt (kan ikke estimeres fra de tilgængelige data)

- Problemer forbundet med nervesystemet, såsom smerter, svien, snurren, følelsesløshed og/eller svaghed i arme og ben
- Hurtig udbrud områder med rødmen oversået med små blærer fyldt med hvid/gul væske (akut generaliseret eksantematøs pustulose)
- Hvis du tager antikoagulantia kan dine INR målinger, som bliver taget af lægen, være højere (se afsnit 2: Vær særlig forsigtig med Ciprofloxacin)
- **Hjerteproblemer**
Unormal hurtig hjerterytme, livstruende uregelmæssig hjerterytme, ændringer i hjerterytmen (som kaldes forlængelse af QT-intervallet og ses på hjertediagrammet, der viser hjertets elektriske aktivitet)

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke fremgår af denne indlægsseddel.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Sundhedsstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Sundhedsstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

Opbevares i den originale æske.

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke Ciprofloxacin efter den udløbsdato, der står på blister kortet eller æsken efter "EXP". Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Ciprofloxacin indeholder:

Det aktive stof er ciprofloxacinhydrochlorid.

En 250 mg film-overtrukken tablet indeholder 291,08 mg ciprofloxacinhydrochlorid svarende til 250 mg ciprofloxacin.

En 500 mg film-overtrukken tablet indeholder 582,16 mg ciprofloxacinhydrochlorid svarende til 500 mg ciprofloxacin.

En 750 mg film-overtrukken tablet indeholder 873,24 mg ciprofloxacinhydrochlorid svarende til 750 mg ciprofloxacin.

Ingredienserne i tablet kernen er mikrokrySTALLinsk cellulose, croscarmellosenatrium, povidon, silica, kolloid vandfri, magnesiumstearat, hypromellose, talkum, propylenglycol, macrogol og titandioxid (E171).

Udseende og pakningsstørrelser

Ciprofloxacin 250 mg filmoverttrukne tabletter er hvide runde, bikonvekse tabletter. Mærket med BMM på den ene side og mærket med "CPX 250" på den anden.

Ciprofloxacin 500 mg filmoverttrukne tabletter er hvide kapselformede bikonvekse tabletter. Mærket med BMM på den ene side og mærket med "CPX 500" og en delelinje på den anden side.

Ciprofloxacin 750 mg filmoverttrukne tabletter er hvide kapselformede bikonvekse tabletter. Mærket med BMM på den ene side og mærket med "CPX 750" på den anden side.

Ciprofloxacin findes i blister pakninger med 6, 10, 20 eller 100 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

BMM Pharma AB
Blasieholmsgatan 2
SE-111 48 Stockholm
Sverige

Dansk repræsentant:

Bluefish Pharmaceuticals AB
Torsgatan 11
SE-111 23 Stockholm
Sverige

Fremstiller:

APC Pharmaceuticals & Chemicals (EUROPE) Ltd
9th Floor, CP House,
97-107 Uxbridge Road,
Ealing, London W5 5TL
England

og

Basic Pharma Manufacturing B.V.
Burgemeester Lemmensstraat 352, 6163 JT Geleen, 3
Holland

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark: Ciprofloxacin BMM Pharma
England: Ciprofloxacin

Finland: Ciprofloxacin BMM Pharma
Sverige: Ciprofloxacin BMM Pharma

Denne indlægsseddel blev senest revideret 2013-02-20

Anbefaling / Medicinsk uddannelse

Antibiotika anvendes til at helbrede bakterielle infektioner. De er ikke effektive mod virusinfektioner.

Hvis din læge har ordineret antibiotika er det kun til din nuværende sygdom.

Selvom man tager antibiotika kan nogle bakterier overleve og vokse. Dette er kendt som resistens, hvor nogle antibiotika behandlinger er uden effekt.

Misbrug af antibiotika øger resistensen. Du kan endda hjælpe bakterierne til at blive resistente og derved forsinke din helbredelse eller nedsætte effekten af antibiotika, hvis du ikke overholder den korrekte:

- Dosis
- Behandlingsregime
- Behandlingens varighed

For at bevare effekten af dette lægemiddel:

1. Brug kun antibiotika når det er ordineret.
2. Følg nøje ordineringen.
3. Genbrug ikke et antibiotikum uden recept, selv om du vil behandle en lignende sygdom.
4. Giv aldrig dit antibiotika til en anden person. Det er muligvis ikke det rigtige produkt til deres sygdom.
5. Efter afslutningen af behandlingen afleveres al ubrugt medicin på apoteket for at sikre korrekt bortskaffelse.