

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Finasterid BMM Pharma 5 mg filmovertrukne tabletter

Finasterid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Finasterid BMM Pharma til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Finasterid BMM Pharma
3. Sådan skal du bruge Finasterid BMM Pharma
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Finasterid BMM Pharma tilhører gruppen af lægemidler, der kaldes 5-alfa-reduktase-hæmmere. De virker ved at formindske prostatas (blærehalskirtlen) størrelse hos mænd.

Finasterid BMM Pharma bruges til behandling og kontrol af godartet (ikke cancer) forstørrelse af prostataen.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE FINASTERID BMM PHARMA

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Finasterid BMM Pharma

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for finasterid eller et af de øvrige indholdsstoffer (se pkt. 6).
- hvis du er en kvinde eller et barn.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Finasterid BMM Pharma

- hvis du har problemer med at tømme din blære fuldstændigt eller hvis du har kraftig nedsat urinflow, skal din læge undersøge dig nøje, før du starter behandlingen med Finasterid BMM Pharma for at udelukke andre hindringer i urinrøret

Hvis du skal have foretaget en blodprøve kaldet "PSA", skal du fortælle din læge, at du bruger finasterid, da finasterid kan påvirke resultatet af blodprøven.

Hvis din partner er gravid eller måske kan være gravid, bør du undgå at hun kommer i kontakt med din sæd, da den kan indeholde små mængder af stoffet.

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Finasterid BMM Pharma kan normalt tages sammen med anden medicin. Spørg din læge, før du bruger anden medicin på samme tid.

Brug af Finasterid BMM Pharma sammen med mad og drikke

Du kan tage Finasterid BMM Pharma sammen med eller uden mad.

Graviditet og amning

Finasterid BMM Pharma er kun beregnet til behandling af mænd.

Kvinder bør ikke håndtere knuste eller delte Finasterid BMM Pharma tabletter, hvis de er eller forsøger at blive gravide. Hvis finasterid optages gennem huden eller indtages gennem munden af en gravid kvinde med et drengefoster, kan barnet blive født med deforme kønsorganer. Tabletterne er fillovertrukne, dette forhindrer kontakt med finasterid, hvis tabletterne ikke knuses eller deles.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er intet der tyder på, at Finasterid "BMM Pharma" påvirker arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Finasterid BMM Pharma

Finasterid BMM Pharma indeholder lactosemonohydrat. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE FINASTERID BMM PHARMA

Brug altid Finasterid BMM Pharma nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller apoteket.

Den sædvanlige dosis er 1 tablet dagligt.

Tabletten skal sluges hel og må ikke deles eller knuses. Tabletten kan tages med eller uden mad.

Selvom der ses forbedring i løbet af kort tid, kan det være nødvendigt at fortsætte behandlingen i mindst 6 måneder. Du må ikke ændre eller stoppe behandlingen uden at kontakte din læge.

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om eller følger dig usikker på.

Hvis du har brugt for mange Finasterid BMM Pharma tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Finasterid BMM Pharma, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Hvis du har glemt at bruge Finasterid BMM Pharma

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. Du skal blot tage den næste tablet til sædvanlig tid.

4. BIVIRKNINGER

Finasterid BMM Pharma kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Impotens, nedsat sexlyst, nedsat ejakulationsvolumen (nedsat mængde sædvæske ved udløsning).

Ikke almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Forstørrelse af brystet og/eller ømhed af brystet, problemer med at få udløsning, udslæt.

Ikke-kendt (kan ikke estimeres ud fra de tilgængelige data):

Testikelømhed, kløe, urticaria (nældefeber), allergiske reaktioner som hævelse af ansigt og læber, forhøjet lever enzymer. Unormal hjertebanken.

Du skal stoppe med at bruge Finasterid BMM Pharma og straks kontakte din læge, hvis du får nogle af følgende symptomer: hævelse af ansigtet, tunge eller svælg og læber, synkebesvær eller nældefeber og vejtrækningsbesvær.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Finasterid BMM Pharma efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Finasterid BMM Pharma indeholder:

- Aktivt stof: Finasterid. En filmovertrukken tablet indeholder 5 mg finasterid.
- Øvrige indholdsstoffer:
Tabletterne: Lactosemonohydrat, natriumstivelsesglycolat (Type A), majsstivelse; silica, kolloid dioxid; docusatnatrium, natriumbenzoat (E211), magnesiumstearat. Filmovertræk: Hypromellose, macrogol, titandioxid (E171) og indigotin (E132).

Finasterid BMM Pharma udseende og pakningstørrelse

Finasterid BMM Pharma er en lys blå, rund bikonveks tablet.

Blister (PVC/PVDC/Al)

Pakningsstørrelser: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 90, 98, 100 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Særlig advarsel ved håndtering: se pkt. 2 angående graviditet og amning.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

BMM Pharma AB
Blasieholmsgatan 2
SE-111 48 Stockholm
Sverige

Fremstiller

Basic Pharma Manufacturing B.V.
Burgemeester Lemmensstraat 352
NL-6163 JT Geleen
Holland

Dansk repræsentant

BioPhausia A/S
Fruebjergvej 3
2100 København Ø
Mail: info@biophausia.dk
Tlf: 48 18 18 13

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark	Finasterid BMM Pharma
Finland	Finasterid BMM Pharma 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Norge	Finasterid BMM Pharma 5 mg tabletter, filmdrasjerte
Sverige	Finasterid BMM Pharma 5 mg filmdragerade tabletter

Denne indlægsseddel blev senest revideret: 20. oktober 2010