

Antepsin[®], oral suspension 200 mg/ml

Indlægsseddel

Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen

- Du kan få denne medicin uden recept. For at opnå den bedste virkning, skal du altid følge vejledningerne i denne information.
- Gem informationen. Du får måske brug for at læse den igen.
- Ønsker du mere information, så kontakt læge eller apotek.

I denne indlægsseddel er der oplysning om:

1. Virkning og anvendelse
2. Vigtig information, som du skal læse, før du bruger Antepsin[®]
3. Sådan skal du tage Antepsin[®]
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere information

Antepsin[®] indeholder:

Antepsin[®] oral suspension 200 mg/ml.

Det aktive indholdsstof i Antepsin[®] er sucralfat.

De øvrige indholdsstoffer i Antepsin[®] er: Glycerol 85%; natriumethylparahydroxybenzoat (E219); natriumpropylparahydroxybenzoat (E217); saccharinnatrium (E954); natriumdihydrogenphosphatdihydrat (E954); xanthangummi (E415); karamel-essens (E150); anis-essens; rensset vand.

Markedsføring i Danmark:

Orion Corporation
Orionintie 1
02200 Espoo
Finland

Repræsentant i Danmark:

Orion Pharma A/S
Møllevej 9
DK-2990 Nivå
Tlf. 4912 6600
opdk@orionpharma.com

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Antepsin[®] er en oral suspension, som virker helende på sår i spiserøret, mavesækken og tolvfingertarmen.

Du kan tage Antepsin[®] ved:

- behandling af sår på tolvfingertarm og mavesæk
- behandling af spiserørskatar (sure opstød og halsbrand)
- forebyggelse af stress-mavesår hos akut syge

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. VIGTIG INFORMATION, SOM DU SKAL LÆSE, FØR DU TAGER ANTEPSIN[®]

Tag ikke Antepsin[®] hvis:

- du er overfølsom over for sucralfat eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Antepsin[®]

Særlige forholdsregler

Hvis dine nyrer ikke virker normalt, skal du altid tale med din læge, før du tager Antepsin[®].

Du må kun tage Antepsin[®] mod mavesår efter aftale med lægen.

Brug af Antepsin[®] sammen med mad og drikkevarer.

Se doseringsafsnittet.

Vigtig information om nogle af hjælpestofferne i Antepsin[®]

Antepsin[®] indeholder natriumethylparahydroxybenzoat og natriumpropylparahydroxybenzoat, der kan give allergiske reaktioner, også efter de er holdt op med at bruge Antepsin[®].

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Du må kun tage Antepsin[®] efter lægens anvisning.

Amning

Erfaringerne med Antepsin[®] er begrænsede. Tal med din læge, inden du tager Antepsin[®], hvis du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Antepsin[®] påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Brug af anden medicin

Hvis du tager Antepsin[®] sammen med anden medicin kan virkningen blive anderledes.

Tal med din læge, hvis du tager:

- tetracyclin og fluoroquinolon (antibiotika)
- digoxin og quinidin (hjertesygdomme)
- isoniazid (mod tuberkulose)
- disulfiram (antabus)
- phenytoin (mod epilepsi)

JAAKKO-TAARA OY	APPROVED WITH CHANGES	NEW PROOF
COLORS OF THE PROOF	APPROVED FOR PRINTING	CHECKED BY
125982		
112297-7		
02.11.2005		
DOTSIZE 8		
SIZE 150 x 210 mm		
Black	PMS 2935	
DIE CUT		
		200
		COLORS ARE REFERENTIAL

- cimitidin og ranitidin (middel mod for meget mavesyre)
- ketoconazol (mod svampeinfektion)
- theophyllin (astmamiddel)
- levothyroxin (nedsat skjoldbruskkirtel funktion)
- wafarin (blodfortyndende middel)

Der bør gå 2 timer mellem du tager disse lægemidler og Antepsin®.
Der bør gå 30 minutter mellem du tager Antepsin® og andre midler mod for meget mavesyre.
Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE ANTEPSIN®

Dosering

Voksne:

Sår på tolvfingertarmen:

5 ml 4 gange daglig, eller 10 ml 2 gange daglig.

Ved forebyggende langtidsbehandling kan dosis nedsættes til 5 ml 2 gange daglig.

Mavesår:

5 ml 4 gange daglig.

Ved forebyggende langtidsbehandling kan dosis nedsættes til 5 ml 2 gange daglig.

Spiserørskatar (sure opstød og halsbrand):

5 ml 4 gange daglig.

Forebyggelse af stress-mavesår hos svær akut syge:

5 ml 4 gange daglig.

Du bør indtage Antepsin® ½-1 time før måltiderne samt før sengetid.

Børn

Erfaring savnes. Du må kun bruge Antepsin® til børn under 15 år efter lægens anvisning.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Du skal følge lægens anvisninger.

Har du taget for meget Antepsin®?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Antepsin®, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Har du glemt at tage Antepsin®?

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det.

Hvis det er tidspunktet for næste dosis, skal du ikke tage dobbelt dosis, men blot følge din sædvanlige dosis.

4. BIVIRKNINGER

Antepsin® kan som al anden medicin give bivirkninger.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

Forstoppelse og kvalme.

Ikke almindelige (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Mundtørhed, udslæt og nældefeber.

Hvis du lider af nedsat nyrefunktion med uræmi (ophobning af affaldsstoffer i blodet), kan der

forekomme bivirkninger som f.eks. krampe.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne kan

blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre. Fortæl læge eller

apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behand-

ling. Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du

finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside:

www.laegemiddelstyrelsen.dk.

5. OPBEVARING

Opbevar Antepsin® utilgængeligt for børn.

Brug ikke Antepsin® efter den udløbsdato, der står på pakningen.

6. YDERLIGERE INFORMATION

Afløber altid medicinrester på apoteket.

Revideret oktober 2005



112297-7