

AMPICILLIN NORDMEDICA 1 g og 2 g pulver til injektionsvæske, opløsning ampicillin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at få medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Ampicillin NordMedica til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Ampicillin NordMedicas virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at få Ampicillin NordMedica
3. Sådan skal du behandles med Ampicillin NordMedica
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevares Ampicillin NordMedica
6. Yderligere oplysninger

1. AMPICILLIN NORDMEDICAS VIRKNING OG ANVENDELSE

Ampicillin NordMedica er et pulver, som skal opløses i en væske for at kunne sprøjtes ind i en muskel eller en blodåre. Du vil få Ampicillin NordMedica af sundhedspersonalet. Ampicillin NordMedica er et antibiotikum af penicillintype.

Ampicillin NordMedica virker på en række bakterier som er årsag til betændelse (infektion). Du får Ampicillin NordMedica mod alvorlige infektioner.

Lægen kan have brugt Ampicillin NordMedica af anden årsag. Spørg lægen.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT FÅ AMPICILLIN NORDMEDICA

Du må ikke få ampicillin hvis:

- Du er overfølsom over for det aktive stof ampicillin eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer.
- Du er overfølsom over for penicilliner eller anden antibiotika (beta-lactamantibiotika).

Særlige forholdsregler

Tal med din læge, hvis du:

- har kyskesyge (mononukleose).

- har blodkræft (lymfatisk leukæmi).
- er overfølsom over for anden medicin mod betændelse (cefalosporiner).

Vær opmærksom på følgende:

- Ved længere tids behandling bør din læge kontrollere din lever- og nyrefunktion og blodprøver.

Kontakt straks lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får:

- pludselige overfølsomhedsreaktioner (inden for minutter til timer) f.eks. hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (anafylaktisk reaktion). Ring evt. 112. Kan være livsfarligt.
- nældefeber, hævelse af tunge, læber og ansigt, ledsmerter, ledhævelse og let feber. Ring evt. 112.
- voldsom eller langvarig, blodig diaré, når du bruger eller har brugt Ampicillin NordMedica. Det kan være tegn på alvorlig tarmbetændelse.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Ampicillin NordMedica.

Ampicillin NordMedica kan påvirke dine prøveresultater.

Brug af anden medicin

Tal med lægen, hvis du tager:

- Medicin mod urinsyreigt (allopurinol og probenecid).
- Anden medicin mod betændelse (f.eks. kloramfenikol og tetracyklin).

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også medicin, som ikke er på recept, medicin som er købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Brug af Ampicillin NordMedica sammen med mad og drikke

Ikke relevant.

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apotek til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet:

Du kan få Ampicillin NordMedica under graviditet.

Amning:

Du kan amme, selv om du får Ampicillin NordMedica.

Ampicillin NordMedica bliver udskilt i modermælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ampicillin NordMedica påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i {Ampicillin NordMedica}

Denne medicin indeholder 2,7 mmol (eller 62 mg) natrium pr. dosis. Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal du tage hensyn hertil.

3. SÅDAN SKAL DU BEHANDLET MED AMPICILLIN NORDMEDICA

Du får ampicillin sprøjtet langsomt ind i en blodåre eller direkte ind i en muskel.

Dosering

Voksne:

Indsprøjtning i en muskel: 0,5 g til 1 g indsprøjtet 3 til 4 gange daglig.

Indsprøjtning i en blodåre: 0,5 g til 1 g indsprøjtet langsomt 3 til 4 gange daglig.

Børn:

Dosis afhænger af barnets vægt. Tal med lægen.

Nedsat nyrefunktion:

Det er her nødvendigt at der går længere tid mellem indsprøjtningerne .

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.
Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Har du fået for meget Ampicillin NordMedica?

Ampicillin NordMedica bliver givet under tæt medicinsk overvågning. Kontakt sundhedspersonalet, hvis du mener, at du har fået for meget Ampicillin NordMedica, og du føler dig utilpas.

Symptomer på overdosering er kvalme, opkastning, diaré, forstyrrelser i saltbalancen, bevidsthedssløring, muskeltrækninger, kramper, dyb bevidstløshed (koma), nyresvigt og blodmangel med gulsot.

4. BIVIRKNINGER

Ampicillin NordMedica kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Forandringer i blodet, der kan vise sig ved blødning fra hud og slimhinder og blå mærker (trombocytopeni). Søg straks læge.
- Forandringer i blodet, der kan vise sig ved infektioner og feber (agranulocytose). Søg straks læge.
- Voldsomt udslæt og blødninger. Kontakt straks læge.

Sjælden til meget sjælden (forekommer hos færre end 1 ud af 1.000 patienter):

- Pludselige overfølsomhedsreaktioner (inden for minutter til timer), f.eks. hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (anafylaktisk shock). Ring 112. Kan være livsfarligt.

- Serumsyge, der kan vise sig ved symptomer som nældefeber, hævelse af tunge, læber og ansigt, ledsmerter, ledhævelse og let feber. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag. Kontakt straks læge eller skadestue.

Hyppigheden ikke kendt

- Langvarig eller blodig diaré med mavesmerter eller feber. Kontakt straks lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter)

- Diaré.
- Hududslæt.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter)

- Træthed og bleghed på grund af blodmangel. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med din læge.
- Træthed, infektioner og feber pga. forandringer i blodet (leukopeni). Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge, da det hos nogle kan udvikle sig til en alvorlig bivirkning.
- Kvalme, opkastning.
- Nældefeber.
- Betændelse på tungen, betændelse i munden.

Sjælden til meget sjælden (forekommer hos færre end 1 ud af 1.000 patienter):

- Udslæt i ansigt og på arme og ben, samt feber.

Hyppigheden ikke kendt:

- Tendens til allergiske reaktioner.
- Smerter i leddene.
- Feber.
- Sortfarvet "behåret" tunge.
- Svampeinfektion i mund og skede.

Ampicillin NordMedica kan give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i laboratorieprøver, f.eks. forhøjede levertal og ændringer i blodets sammensætning (eosinofili).

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Patienter og pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted <http://laegemiddelstyrelsen.dk>.

5. SÅDAN OPBEVARER DU AMPICILLIN NORDMEDICA

Opbevares utilgængeligt for børn.

Ampicillin NordMedica efter må ikke bruges efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Ampicillin NordMedica indeholder:

- Aktivt stof: ampicillinnatrium

Ampicillin NordMedicas udseende og pakningstørrelse

Ampicillin NordMedica er et hvidt pulver. Det markedsføres i pakningsstørrelserne:

- 10 x 1 g
- 10 x 2 g

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Nordmedica A/S
Bredgade 41
1260 København K

Fremstiller

Vepidan ApS
Østerbrogade 23
9670 Løgstør.



Denne indlægsseddel blev senest revideret i januar 2009

Følgende oplysninger er kun til læger og sundhedspersonale:

UFORLIGELIGHED

Bør kun opløses i/blandes med steril vand og isotonisk lidocainchlorid injektionsvæske (i.m.) eller isotonisk natriumchlorid injektionsvæske (i.v.).

Bør ikke tilblandes andre farmaka.

INSTRUKTION VEDRØRENDE HÅNDTERING OG DESTRUKTION

Tilberedning af opløsninger

1 g ampicillin (som natriumsalt) indeholder ca. 3 mmol natrium sv.t. omkring 20 ml isotonisk natriumkloridopløsning.

Opløsning til intramuskulær injektion: 1 g opløses i 3,5 ml sterilt vand og 2 g opløses i 6,8 ml sterilt vand (indeholder 250 mg ampicillin pr. ml).

Opløsning til intravenøs injektion: 1 g opløses i 7,5-20 ml og 2 g opløses i 15-40 ml sterilt vand.

Opløsning til intravenøs infusion: Opløs som ovenfor angivet i sterilt vand og bland med sterilt vand eller isotonisk natriumkloridinfusionsvæske til en koncentration på max. 30 mg pr. ml. På grund af begrænset stabilitet i surt eller basisk miljø bør andre infusionsvæsker ikke anvendes, medmindre det udtrykkeligt er angivet.

HOLDBARHED

Holdbarheden af ampicillin opløsning er afhængig af koncentration, temperatur og pH. Holdbarheden er bedst i tynde opløsninger, ved kølig opbevaring i neutral pH.

Intramuskulært: 1 g i 3-8 ml steril vand eller isotonisk natriumklorid injektionsvæske.

Holdbarheden:

- 3 timer ved stuetemperatur.
- 6 timer i køleskab.

Intervenøs injektion: 1 g i 20 ml eller 2 g i 40 ml sterilt vand eller isotonisk natriumklorid injektionsvæske, som injiceres langsomt. Opløsning kan også gives langsomt via infusions-slangen.

Holdbarhed:

- 6 timer ved stuetemperatur.
- 24 timer i køleskab.

Intravenøs infusion: Fremstilles ud fra de under intravenøs injektion nævnte opløsninger, som tilblandes infusionsvæsken.

Holdbarhed:

- Se ovenfor for stamopløsning. Den færdigblandede infusionsvæske er holdbar i 12 timer ved stuetemperatur.

Intraperitonealt: Ampicillin NordMedica pulver til injektionsvæske opløses i en passende mængde sterilt væske. Tørstoffet kan også anvendes i doser på op til 1 g i et operationsfelt, efter at peritoneum er lukket. Til peritoneal dialyse anvendes 25 mg pr. l dialysevæske. Ved peritonitis anvendelse 1 g til 1 l dialysevæske.