

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Pondocillin® 500 mg og 700 mg filmovertrukne tabletter pivampicillin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
- Lægen har ordineret Pondocillin® til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal De vide, før De begynder at tage Pondocillin®
3. Sådan skal De tage Pondocillin®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Pondocillin® er et antibiotikum af penicillintypen.

Pondocillin® virker på bakterier ved at hindre opbygningen af bakteriernes væg, så bakterien ødelægges.

De kan bruge Pondocillin® til behandling af betændelse (infektion) forårsaget af bakterier, der er følsomme overfor Pondocillin®.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT TAGE PONDOCILLIN®

Tag ikke Pondocillin®

- hvis De er overfølsom (allergisk) over for det aktive stof pivampicillin eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- hvis De er overfølsom (allergisk) over for andre antibiotika (betalactam-antibiotika).
- hvis De lider af en stofskiftesygdom (porfyri eller andre arvelige stofskiftesygdomme).

Vær ekstra forsigtig med at tage Pondocillin®

Tal med lægen hvis

- De har kyskesyge (mononukleose)
- De har blodkræft (lymfatisk leukæmi)
- De tager medicin mod epilepsi (valproat).
- De tager anden medicin mod betændelse (pivmecillinam)

- De får voldsom eller langvarig, evt. blodig diarré når De bruger eller har brugt Pondocillin®. Det kan være tegn på tarmbetændelse (pseudomembranøs colitis).

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med lægen hvis De tager:

- anden medicin mod betændelse (erythromycin, kloramfenikol, tetracyklin, aminoglykosider).
- Medicin mod urinsyreigt (allopurinol, probenecid)

Brug af Pondocillin® sammen med mad og drikke

De kan tage Pondocillin® sammen med mad og drikke.

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De tager nogen form for medicin.

Graviditet: De kan tage Pondocillin® under graviditet.

Amning: De kan amme, selv om De tager Pondocillin®.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pondocillin® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. SÅDAN SKAL DE TAGE PONDOCILLIN®

Tag altid Pondocillin® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Brugsanvisning

De bør tage Pondocillin® med et glas vand.

Dosering

Voksne:

Ved lette infektioner: 1 tablet (500 mg) 2 gange dagligt.

Ved svære infektioner: 1 tablet (700 mg) 2 gange dagligt
2 tabletter på 500 mg (i alt 1000 mg) 2 gange daglig.

Engangsdosis ved ukompliceret gonoré:

2 tabletter på 700 mg (i alt 1,4 g pivampicillin) og 1 g probenecid.

Børn:

Børn over 6 år:

Ved lette infektioner: 1 tablet (500 mg) 2 gange dagligt.

Ved svære infektioner: 1 tablet (700 mg) 2 gange dagligt
2 tabletter på 500 mg (i alt 1000 mg) 2 gange daglig.

Børn under 6 år:

Dosis afhænger af barnets vægt og mindste dosis vil normalt være 1 tablet på 500 mg 2 gange daglig. Ved sværere infektioner kan dosis være højere. Følg lægens anvisninger. De kan normalt ikke bruge Pondocillin®, filmoverttrukne tabletter, til børn der vejer under 14 kg. Følg lægens anvisninger.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Hvis De har taget for mange Pondocillin® tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Pondocillin®, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas. Der er ikke kendskab til forgiftninger efter brug af Pondocillin®.

Hvis De har glemt at tage Pondocillin®

Har De glemt at tage Pondocillin®, skal De blot fortsætte med næste dosis. De skal ikke tage dobbelt dosis.

Hvis De holder op med at tage Pondocillin®

Spørg lægen eller på apoteket hvis der er noget, De er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Pondocillin® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

- Forandringer i blodet, der kan vise sig ved blødning fra hud og slimhinder og blå mærker.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

- Pludselige alvorlige overfølsomhedsreaktioner (inden for minutter til timer), f.eks. hududslæt, åndedrætsbesvær, besvimelse, kramper (anafylaktisk shock). Ring 112.
- Betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber (Stevens-Johnsons syndrom). Kontakt læge eller skadestue.

Hyppigheden ikke kendt:

- Hævelse af tunge, læber og ansigt, der i sjældne tilfælde kan være alvorligt og medføre, at luftvejene blokeres. Ring 112.
- Forandringer i blodet, der kan vise sig ved træthed, infektioner og feber. Kontakt straks læge.
- Svær, langvarig eller blodig diarré med mavesmerter eller feber. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

- Kvalme, diarré.
- Udslæt.
- Smerter i leddene.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

- Nældefeber.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

- Udslæt i ansigt og på arme og ben, samt feber (erythema multiforme).

Hyppigheden ikke kendt:

- Træthed og blegghed på grund af blodmangel.
- Feber på grund af overfølsomhedsreaktioner.
- Muskelsvaghed.
- Fordøjelsesbesvær, med mavesmerter, sure opstød, halsbrand og opkastninger.

- Kløe.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Patienter og pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares over 25 °C.

Brug ikke Pondocillin® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (udløb) er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Pondocillin® indeholder:

- Aktivt stof i Pondocillin® er: Pivampicillin.
- Øvrige indholdsstoffer i Pondocillin® er: Pregelatineret majsstivelse; natriumstivelsesglycolat (type A); methylcellulose; magnesiumstearat; hypromellose.

Udseende og pakningsstørrelser

Pondocillin® 500 mg er en oval hvid tablet påtrykt 500 på en side.

Pondocillin® 700 mg er en oval hvid tablet påtrykt 700 på en side.

Pondocillin® 500 mg findes i pakningsstørrelserne 20 stk. og 30 stk.

Pondocillin® 700 mg findes i pakningestørrelserne 14 stk., 20 stk. og 30 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

PharmaCoDane ApS
Marielundvej 46 A
2730 Herlev

Fremstiller

Athlone Laboratories
Ballymurray
Co. Roscommon
Ireland.

Denne indlægsseddel blev senest revideret januar 2013.