

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Folimet 1 mg tabletter

Folsyre

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Folimet til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Folimet
3. Sådan skal du tage Folimet
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Folsyre er et B-vitamin.

Tabletterne mindsker bivirkninger og modvirker mangel på folsyre ved behandling med methotrexat (lægemiddel mod gigtsygdomme og visse kræftsygdomme).

Lægen kan have givet dig Folimet for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE FOLIMET

Tag ikke Folimet

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for folsyre eller et af de øvrige indholdsstoffer
- hvis du har mangel på B₁₂-vitamin (perniciøs anæmi), medmindre det er bevist, at du har mangel på folsyre.

Vær ekstra forsigtig med at tage Folimet

- tal med lægen inden du tager Folimet, hvis du har mangel på B₁₂-vitamin, som skal behandles samtidigt.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:

- leddegigt og betændelse i tyktarmen (salazosulfapyridin).
- epilepsi. De fleste midler mod epilepsi kan nedsætte indholdet af folsyre i blodet, specielt hos børn. Folsyre kan nedsætte virkningen af phenytoin mod epilepsi.
- infektion (chloramfenikol, sulfonamider og trimethoprim).

Brug af Folimet sammen med mad og drikke

Du kan tage Folimet i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. Du skal tage Folimet med et glas vand.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Kan anvendes under graviditet, men methotrexat må ikke anvendes under graviditet.

Amning

Folimet kan anvendes i ammeperioden. Folimet udskilles i modermælken, men der foreligger ingen oplysninger om bivirkninger hos det ammede barn.

Hvis du ammer, må du ikke få methothrexat. Methothrexat udskilles i modermælken og kan sandsynligvis give bivirkninger hos det ammede barn.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Folimet påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Folimet

Dette lægemiddel indeholder lactose. Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE FOLIMET

Tag altid Folimet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er 1 tablet på 1 mg dagligt på de dage, hvor du ikke tager methothrexat.

Hvis du har taget for mange Folimet tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Folimet, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas.

Tag emballagen med.

Hvis du har glemt at tage Folimet

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Folimet

Spørg lægen eller på apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Folimet kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

- alvorlige allergiske reaktioner (som f.eks. hududslæt, hævelse af ansigt, tunge og svælg, vejrtrækningsbesvær, shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

- gener fra mave-tarmkanalen (som f.eks. kvalme, oppustethed og luftafgang fra tarmen).

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

- kløe, nældefeber, rødmen.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjælden):

- overfølsomhed over for folsyre.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Folimet ved almindelig temperatur.

Brug ikke Folimet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Folimet 1 mg tabletter indeholder:

- Aktivt stof: Folsyre. Hver tablet indeholder 1 mg vandfri folsyre.
- Øvrige indholdsstoffer: Magnesiumstearat, gelatine, talcum, kartoffelstivelse, lactosemonohydrat.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende: Gule tabletter uden delekærv.

Pakningsstørrelse: 100 tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

DOC Medical A/S
Kløckersvej 1
2820 Gentofte
Danmark

Fremstiller

Viminco A/S
Lodhusvej 11
4230 Skælskør

Denne indlægsseddel blev senest revideret 10/2008