

**XALATAN®**

50 mikrogram/ml, øjendråber, opløsning

Latanoprost

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedden. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apoteket, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Xalatan® til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Nyeste indlægsseddel kan findes på [www.indlaegsseddel.dk](http://www.indlaegsseddel.dk)

**Oversigt over indlægssedlen:**

1. Virkning og anvendelse.
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Xalatan®.
3. Sådan skal du bruge Xalatan®.
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring.
6. Yderligere oplysninger.

**1. Virkning og anvendelse**

- Xalatan® er et middel mod forhøjet tryk i øjet.
- Du kan bruge Xalatan® til at sænke tryk i øjet f.eks. ved grøn stær (glaukom).

Lægen kan have givet dig Xalatan® for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

**2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Xalatan®****Brug ikke Xalatan®**

- hvis du er overfølsom over for latanoprost, eller et af de øvrige indholdsstoffer.

**Vær ekstra forsigtig med at bruge Xalatan®**

- Tal med lægen, inden du bruger Xalatan®, hvis:
- du har astma, eller andre lungeproblemer,
  - du har eller har haft virusinfektion i øjet forårsaget af herpes simplex-virus (HSV),
  - du skal have foretaget eller har fået foretaget øjenoperation (herunder operation for grå stær),
  - du har problemer med øjnene (f.eks. øjensmerter, øjenirritation eller øjenbetændelse, uklart syn),
  - du lider af tørre øjne,
  - du bruger kontaktlinser.

**Vær opmærksom på følgende**

- Xalatan® kan gradvist ændre farven af det behandlede øje ved at øge mængden af brunt farvestof i regnbuehinden (iris). Farvændringen kan være varig.
- Xalatan® kan gradvist ændre øjenvipperne af det behandlede øje f.eks. tykkelse, længde, farve, øge mængden af øjenvipperne eller øjenvipper der vokser i forkert retning. Ændringerne forsvinder efter stop af behandling med Xalatan®.

**Brug af anden medicin**

Tal med lægen, hvis du bruger anden medicin mod forhøjet tryk i øjet.

Hvis du bruger Xalatan® sammen med andre øjendråber, bør der mindst gå 5 minutter imellem drypning med de forskellige øjendråber.

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

**Graviditet og amning**

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

**Graviditet:**

- Hvis du er gravid, må du kun bruge Xalatan® efter aftale med lægen.

**Advarsel:**

- Hvis du ammer, må du ikke bruge Xalatan®, da det går over i mælken. Tal med lægen.
- Du skal stoppe med at amme, hvis behandlingen med Xalatan® er nødvendig. Tal med lægen.

**Trafik- og arbejdssikkerhed**

Xalatan® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. Vær opmærksom på, at du efter brug kan få forbigående sløret syn. Hvis det sker for dig, bør du ikke køre bil, motorcykel eller cykle og du bør ikke arbejde med værktøj eller maskiner, før dit syn bliver klart igen.

**Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Xalatan®**

Xalatan® indeholder benzalkoniumchlorid, som kan give irritation af øjnene og misfarve bløde kontaktlinser. Undgå derfor kontakt med bløde kontaktlinser. Tag kontaktlinserne ud, inden du bruger medicinen, og vent mindst 15 minutter, før du sætter kontaktlinserne i igen.

**3. Sådan skal du bruge Xalatan®****Den sædvanlige dosis er****Voksne (inklusive ældre):**

1 dråbe i det/de angrebne øje/øjne én gang dagligt. Det er bedst at anvende øjendråberne om aftenen.

Efter hver drypning bør du sammenpresse tårekanalen ved øjenkrogen i et minut, så risikoen for at medicinen fordeler sig i kroppen mindskes.

Hvis du bruger Xalatan® sammen med andre øjendråber, bør der mindst gå 5 minutter imellem drypning med de forskellige øjendråber.

Den daglige dosis bør ikke overskride 1 dråbe i det/de angrebne øje/øjne.

**Børn:**

Børn må kun få Xalatan® efter aftale med lægen.

Brug altid Xalatan® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteket.

**Brugsanvisning**


1. Vask hænderne.
2. Fjern sikkerhedshætten.



3. Skru låget af flasken.



- Træk forsigtigt ned i det nederste øjenlåg med en finger.



- Før spidsen af flasken tæt til øjet uden at røre øjet.
- Tryk let på flasken og dryp en dråbe i øjet.
- Slip øjenlåget.
- Skru låget på flasken.

**Hvis du har brugt for meget Xalatan®**

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Xalatan®, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

**Symptomer:**

Hvis du drypper for mange dråber i øjet, kan du få irritation af øjnene og røde øjne.

**Hvis du har glemt at bruge Xalatan®**

Tag aldrig dobbeltdosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

**Hvis du holder op med at bruge Xalatan®**

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om eller følger dig usikker på.

**4. Bivirkninger**

Xalatan® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

**Alvorlige bivirkninger**

**Sjældne bivirkninger:** (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter).

- Betændelse af regnbuehinde og strålelegemet med øjensmerter, lyskyhed og evt. nedsat syn. Kontakt læge eller skadestue.

**Meget sjældne bivirkninger** (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Forværring af brystkrammer (angina pectoris). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

**Ikke alvorlige bivirkninger**

**Meget almindelige bivirkninger** (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):

- Gradvis ændring af øjenfarven (brun pigmentering), som ikke forsvinder, når du stopper med behandlingen.
- Øjnerødme.
- Øjenirritation (stikkende, brændende fornemmelse og fornemmelse af noget i øjet).
- Mørkere, længere og tykkere øjenvipper.

**Almindelige bivirkninger** (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Forbigående, pletvise, overfladiske skader på hornhinden, betændelse af øjenlåsranden, øjensmerter.

**Ikke almindelige bivirkninger** (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Hævede øjenlåg, tørre øjne, betændelse i hornhinden, sløret syn og betændelse i øjets bindehinde.
- Hududslæt.

**Sjældne bivirkninger** (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Øjenvipper som vokser i forkert retning, ekstra række af øjenhår, irritation og mørkfarvning af øjenlågshuden.
- Hævelse omkring øjnene.
- Hævelse og skade af hornhinden.
- Hævelse i nethinden.
- Astma, forværring af astma, åndenød. Kan være eller blive alvorligt. Kontakt læge eller skadestue.

**Meget sjældne bivirkninger** (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Brystmerter.

**Hypigheden er ikke kendt:**

- Hovedpine, svimmelhed.
- Hjertebanken.
- Muskelsmerter, ledsmerter.
- Cystdannelse i regnbuehinden.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemedelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemedelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemedelstyrelsens netsted: [www.meldenbivirkning.dk](http://www.meldenbivirkning.dk)

**5. Opbevaring**

- Opbevar Xalatan® utilgængeligt for børn.
- Opbevar Xalatan® i køleskab (2-8 °C).
- Efter åbning: Skal anvendes inden 4 uger og må ikke opbevares over 25 °C.
- Opbevar Xalatan® i original emballage.
- Brug ikke Xalatan® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den anførte måned.

Afløber altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

**6. Yderligere oplysninger**

**Xalatan® 50 mikrogram/ml øjendråber, opløsning indeholder:**

Latanoprost 50 mikrogram.

**Øvrige indholdsstoffer:**

Natriumchlorid, vandfrit dinatriumphosphat, natriumhydrogenphosphatmonohydrat, benzalkoniumchlorid og vand til injektionsvæsker.

**Pakningsstørrelser:**

Xalatan® fås i:

Xalatan® 50 mikrogram/ml i pakninger med 2,5 ml og 3 x 2,5 ml.

Alle pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

**Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller**

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  
Mail: [info@orifarm.com](mailto:info@orifarm.com)

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S.



3 1 0 1 9 0 2 0 4