

INDLÆGSSEDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
Rhinocort® Aqua næsespray, suspension
32 og 64 mikrogram/dosis
Budesonid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Rhinocort® Aqua til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Rhinocort® Aqua
3. Sådan skal du bruge Rhinocort® Aqua
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Rhinocort® Aqua er en vandig opslæmning.

Rhinocort® Aqua indeholder et hormon, som forhindrer hævelse og irritation i næsen på grund af allergi (kløe, tilstoppet og/eller løbende næse).

Du kan bruge Rhinocort® Aqua lokalt i næsen til:

- Forebyggelse af høfeber og helårssnue.
- Behandling af polypper i næsen.
- Forebyggelse af nye polypper efter operation.

Lægen kan have givet dig Rhinocort® Aqua for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE RHINOCORT® AQUA

Tag ikke Rhinocort® Aqua

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for budesonid eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Særlige forholdsregler

Børn der behandles med stor dosis eller er i langvarigt behandlingsforløb bør følges tæt af lægen.
Fortæl din læge, hvis du har eller har haft lunge-tuberkulose.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke bruge Rhinocort® Aqua. Tal med lægen.

Amning

Du kan bruge Rhinocort® Aqua, selvom du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Rhinocort® Aqua påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Rhinocort® Aqua

Kaliumsorbat kan give hududslæt.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE RHINOCORT® AQUA

Tag altid Rhinocort® Aqua nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Forebyggelse af høfeber og snue:

Du bør starte den forbyggende behandling af din høfeber, inden pollensæsonen begynder.

Du får fuld virkning efter få dages brug, i sjældne tilfælde kan der dog gå op til 2 uger.

Næsespray 32 mikrogram/dosis

Forebyggende lokalbehandling af høfeber og helårssnue:

Voksne: 2 pust i hvert næsebor 2 gange dagligt (det svarer til 256 mikrogram i alt). Når den ønskede virkning er opnået, kan du nøjes med 1 pust i hvert næsebor 2 gange dagligt (det svarer til 128 mikrogram i alt).

Næsespray 64 mikrogram/dosis

Forebyggende lokalbehandling af høfeber og helårssnue:

Voksne: 2 pust i hvert næsebor om morgenen (det svarer til 256 mikrogram i alt). Når den ønskede virkning er opnået, kan du nøjes med 1 pust i hvert næsebor om morgenen (det svarer til 128 mikrogram i alt).

Forebyggelse og behandling af næsepolypper:

Voksne: 1 pust i hvert næsebor morgen og aften (det svarer til 256 mikrogram i alt).

Børn: Som for voksne. Du bør ikke bruge Rhinocort® Aqua til børn under 6 år.

Børn over 6 år, kan have brug for hjælp, når de skal bruge Rhinocort® Aqua næsespray.

Brugsanvisning:

Inden du anvender Rhinocort® Aqua næsespray første gang, skal du ryste flasken, og derefter pumpe 5-10 gange i luften, indtil sprayen afgiver forstøvet væske. Hvis du ikke anvender Rhinocort® Aqua dagligt, skal du først pumpe en enkelt gang i luften.

Gør derefter som følgende:

1. Puds næse. Ryst flasken. Fjern den brune plastikhætte.
2. Hold tommelfingeren på bunden og pegefinger og langfinger på udløserplatformen.
3. Hold hovedet oprejst. Læg ikke hovedet bagover. Spray en gang i hvert næsebor, imens du lukker det andet med en finger. Træk samtidigt vejret normalt ind gennem næsen.
4. Sæt den brune plastikhætte på flasken igen.

Rengøring:

Gør plastikdelene rene med passende mellemrum. Tag den brune plastikhætte og den hvide næsespids af. Skyl begge dele i lunkent vand. Lad plastikdelene lufttørre og sæt dem på plads igen. Flasken opbevares stående.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Hvis du har brugt for meget Rhinocort® Aqua

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Rhinocort® Aqua næsespray, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Der er dog ingen akut risiko forbundet ved at bruge for meget Rhinocort® Aqua en enkelt gang.

Hvis du har glemt at bruge Rhinocort® Aqua

Tag aldrig dobbelt dosis, hvis du har glemt at bruge en dosis Rhinocort® Aqua næsespray. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

4. BIVIRKNINGER

Rhinocort® Aqua kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvortlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

- Hævelse i mund og svælg. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.

- Dannelse af hul i næseskillevæggen. Søg læge.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjældne)

- Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvortlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.

- Irritation i næsen i form af tørhed og nysen, umiddelbart efter brugen, samt næseblod.

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

- Hudreaktioner i form af nældefeber, udslæt, kløe og betændelseslignende tilstande.

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.

- Sårdannelse i næsen.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemedelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemedelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemedelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Rhinocort® Aqua ved almindelig temperatur.

Tag ikke Rhinocort® Aqua efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Rhinocort® Aqua 32 mikrogram/dosis og 64 mikrogram/dosis næsespray indeholder:

Aktivt stof: Budesonid 32 eller 64 mikrogram. Øvrige indholdsstoffer: Mikrokrystallinsk cellulose, natriumcarboxymethylcellulose, vandfri glukose, polysorbat 80, dinatriumedetat, saltsyre (pH-justering), rensed vand, kaliumsorbat 1,2 mg per ml.

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende

Rhinocort® Aqua er i en glasflaske med doseringspumpe.

Pakningsstørrelse

Rhinocort® Aqua 32 mikrogram/dosis og 64 mikrogram/dosis næsespray fås i pakningsstørrelse å 120 doser.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Zcare4, Tømrervej, Esbjerg V.

Ompakket og frigivet af

Zcare4, Tømrervej, Esbjerg V.

Rhinocort® Aqua er et registreret varemærke, der tilhører AstraZeneca AB.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret februar 2009