

Beconase™ 50 mikrog/dosis, næsespray, suspension

beclometasondipropionat

0266255903

Beconase™ er et registreret varemærke, som tilhører GlaxoSmithKline Koncernen

Læs denne indlægsseddel grundigt.

Den indeholder vigtige informationer.

- De kan få Beconase™ uden recept. For at opnå den bedste behandling skal De være omhyggelig med at følge anvisningerne for Beconase™.
- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere De vil vide.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Beconase™s virkning og hvad De skal bruge det til
2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Beconase™
3. Sådan skal De bruge Beconase™
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer De Beconase™
6. Yderligere oplysninger

1. Beconase™s virkning og hvad De skal bruge det til

Beconase™ indeholder et hormon, som forhindrer hævelse og irritation i næsen på grund af allergi (kløe, tilstoppet og/eller løbende næse). De kan bruge Beconase™ til forebyggelse af høfeber og helårssnu.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Beconase™

Brug ikke Beconase™ hvis:

- De er overfølsom overfor beclometasondipropionat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Beconase™.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Beconase™

- Tal med Deres læge, hvis De har betændelse i næsen. De kan få behandlet betændelsen samtidig med, at De bruger Beconase™.
- Hvis De har sår, nylig skade eller er opereret i næsen, skal De rådføre Dem med Deres læge, før De bruger Beconase™.
- Skift ikke fra tabletbehandling med binyrebarkhormon til behandling med Beconase™ næsespray uden at rådføre Dem med lægen.

Brug af anden medicin

De kan bruge Beconase™ samtidig med anden medicin.

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apotek til råds, før De bruger nogen form for medicin.

Graviditet

De må kun bruge Beconase™ efter lægens anvisning.

Amning

De kan amme selv om De bruger Beconase™.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Beconase™ påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Beconase™

Beconase™ indeholder benzalkoniumchlorid, som kan give åndedrætsbesvær, virke hudirriterende og give udslæt på huden.

3. Sådan skal De bruge Beconase™

Brug altid Beconase™ nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl så spørg lægen eller på apoteket.

Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.


Voksne over 18 år: Den sædvanlige dosis er 2 pust (100 mikrogram) i hvert næsebor 2 gang daglig.

De får den bedste virkning af Beconase™, hvis De bruger den hver dag i de perioder, hvor De har allergi. Virkningen begynder efter nogle ganges anvendelse. Der går 3-4 dage, inden der er fuld virkning.

De må kun anvende Beconase™ til børn efter lægens anvisning.

Brug ikke Beconase™ i mere end 3 måneder i træk uden lægens anvisning.

Sådan skal De bruge næsesprayen:



Ryst flasken og tag beskyttelseshætten af.



Pres pumpen ned et par gange ved at trykke på den hvide krave indtil, der bliver afgivet forstøvet væske. Dette er kun nødvendigt, når De bruger sprayen første gang eller efter et par dage uden brug.



Puds næsen og bøj hovedet let forover. Luk for det ene næsebor med pegefingern, hold næsesprayen lodret og før den ind i det andet. Træk vejret gennem næsen mens De trykker én gang på pumpen. Gentag dette. Det andet næsebor behandles på samme måde. Tør næsestudsene af, og sæt beskyttelseshætten på efter brug.

Børn behøver ofte hjælp fra en voksen for at sikre den korrekte brug af næsesprayen.

Rengøring af næsesprayen:

Fjern beskyttelseshætten og træk den hvide krave forsigtigt af. Vask disse to dele under den kolde hane. Lad dem tørre og sæt dem sammen igen.

Stik aldrig i næsestudsene med spidse genstande. Kontakt eventuelt apoteket.

Hvis De har brugt for meget Beconase™ næsespray

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Beconase™, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet.

Der kendes ikke tilfælde af overdosering efter brug af næsespray.

Hvis De har glemt at bruge Beconase™

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis, men skal fortsætte med Deres sædvanlige dosering.

4. Bivirkninger

Beconase™ kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 10.000 patienter):

- Øget tryk i øjet (grøn stær). Det viser sig ved øjensmerter, nedsat syn, ringe omkring lyse genstande. Kontakt straks læge eller skadestue.
- Grå stær (uklart syn). Kontakt lægen.

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Overfølsomhedsreaktioner som pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær, hævelse af ansigt, læber og hals, besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Krampelignende sammentrækning af muskulaturen i lungerne. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 100 patienter):

- Tørhed og irritation i næse og svælg
- Ubehagelig smag og lugt.

Sjældne bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 10.000 patienter):

- Næseblod.

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Dannelse af hul i næseskillevæggen. Søg læge.
- Hududslæt, nældefeber, kløe.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger som ikke er nævnt her.

Fortæl læge eller apotek, hvis De får bivirkninger, der bliver ved eller er generende. Nogle bivirkninger kræver behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk.

5. Sådan opbevarer De Beconase™

- Opbevar Beconase™ utilgængeligt for børn.
- Brug ikke Beconase™ efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
- Anvend kun Beconase™ i 3 måneder efter, at flasken er åbnet.
- Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Beconase™ indeholder:

- Aktivt stof: Beclometasondipropionatmonohydrat svarende til beclometasondipropionat 50 mikrogram/dosis.
- Øvrige indholdsstoffer: Mikrokrystallinsk cellulose, carboxymethylcellulosenatrium, vandfri glucose, polysorbat 80, renset vand, benzalkoniumklorid, phenylethylalkohol.

Beconase™s udseende og pakningsstørrelse:

Beconase™ næsespray er en vandig opslemning (suspension), som skal omrystes før brug. Beconase™ næsespray indeholder 200 doser (pust) i plastflaske.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S
Industriparken 23-25, 2750 Ballerup

Ompakket og frigivet:

Paranova Pack A/S
Industriparken 23-25, 2750 Ballerup

Denne indlægsseddel blev senest revideret 12/2008