

Promixin® 1 mill. IE, pulver til opløsning til nebulisator

colistimethatnatrium

0592605908

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge medicinen

- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
- Lægen har ordineret Promixin® til Dem personligt. Lad derfor være med at give Promixin® til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan ses på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Promixin®
3. Sådan skal De bruge Promixin®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Promixin® er et antibiotikum af typen polymyxin som ødelægger bakterierne.

De kan bruge Promixin® til behandling af betændelse i lungerne, hvis De har cystisk fibrose.

Lægen kan have givet Dem Promixin® til anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT BRUGE Promixin®

Brug ikke Promixin®, hvis De:

- er overfølsom over for colistimethatnatrium eller andre polymyxiner.
- lider af muskelsygdommen myasthenia gravis.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Promixin®

Tal med lægen, inden De bruger Promixin®, hvis De

- har dårlige nyrer. Det kan være nødvendigt, at De får undersøgt Deres blod regelmæssigt.
- lider af stofskiftesygdommen porfyri.

Kontakt straks lægen, hvis De

- får astmalignende vejrtrækningsbesvær og trængsel i brystet.

Vær opmærksom på følgende

- Så længe De får Promixin®, skal De have undersøgt Deres lungefunktion regelmæssigt.
- Længerevarende behandling med Promixin® kan medføre resistensudvikling. Din læge vil teste for resistensudvikling ved længerevarende behandling, eller hvis din sygdom forværres.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med Deres læge, hvis De

- skal i fuld bedøvelse (muskelfarvslappende medicin, f.eks. rocuronium, cisatracurium, mivacurium).
- tager medicin mod betændelse (f.eks. antibiotika af typen aminoglykosider).

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis De er gravid, må De kun bruge Promixin® efter aftale med lægen.

Amning

Hvis du ammer bør du ikke bruge Promixin®, da Promixin® går over i modermælken. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdsikkerhed

Promixin® kan hos enkelte give bivirkninger, f.eks. svimmelhed, forvirring og synsforstyrrelser, som kan påvirke arbejdsikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. SÅDAN SKAL DE BRUGE Promixin®

Tag altid Promixin® nøjagtig efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.

Børn over 2 år og voksne:

Sædvanlig dosis er 1-2 hætteglas (1-2 mill. IE) 2 eller 3 gange dagligt. Dosis bliver fastsat af Deres læge. Dosis er afhængig af betændelsens art, og hvor svær betændelsen er. Følg lægens anvisning.

Nedsat nyrefunktion

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Børn under 2 år

Promixin® bør ikke anvendes til børn under 2 år, da sikkerhed og dosering ikke er kendt.

Brugsanvisning

Første gang De får Promixin®, skal det normalt ske under lægens opsyn.

Noget af medicinen kan komme ud i luften under inhalering. Brug Promixin® i et ventileret rum. Tag hensyn til andre.

De kan fortynde Promixin® med vand til injektionsvæsker eller med en blanding af vand til injektionsvæsker og fysiologisk saltvand i forholdet 50:50. De kan inhalere opløsningen ved hjælp af en nebulisator. Brug blandingen straks efter tilberedning.

De skal bruge et nebulisator-system, der er beregnet til at inhalere antibiotika i lungerne. Bland Promixin® med den mængde opløsningsvæske, der passer til Deres nebulisator-system. Se efter i vejledningen til Deres nebulisator, hvor stor en mængde væske, De skal bruge.

Promixin® leveres i en pakning med 30 hætteglas sammen med en Promixin® Disc®, som De kan bruge til nebulisator-systemet I-neb® AAD®. Se i vejledningen til I-neb® AAD® hvordan De bruger det til Promixin®.

Hvis De har brugt for meget Promixin®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har brugt mere af Promixin®, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet.

Symptomer på overdosering er uregelmæssig vejrtrækning med vejrtrækningspauser, muskelsvaghed, svimmelhed, forbigående prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i ansigtet, sløret tale, svingende blodtryk med tendens til besvimelse, forvirring, sindslidelser, synsforstyrrelser og nedsat nyrefunktion.

Hvis De har glemt at bruge Promixin®

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis, men skal fortsætte med Deres sædvanlige dosering.

Hvis De holder op med at bruge Promixin®

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, De er i tvivl om eller føler Dem usikker på. De må kun holde pauser eller stoppe med behandlingen efter aftale med lægen.

4. BIVIRKNINGER

Promixin® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger

(forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter)

- Kortåndethed, astmalignende vejrtrækningsbesvær og/eller tæthed for brystet. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger

(forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter)

- Hoste.

Hyppigheden er ikke kendt

- Ømhed i hals eller mund.
- Overfølsomhedsreaktioner f.eks. hududslæt.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Fortæl læge eller apotek, hvis De får bivirkninger, der bliver ved eller er generende. Nogle bivirkninger kræver behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

- Opbevar Promixin® utilgængeligt for børn.
- De kan opbevare Promixin® ved almindelig temperatur.
- Brug ikke Promixin®, efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
- Hvis der er rester tilbage af opløsningen med Promixin® i nebulisatoren efter behandlingen, skal De kassere disse.
- Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Promixin® 1 mill. IE, pulver til opløsning til nebulisator indeholder:

- Aktivt stof: 1 million internationale enheder (I.E.) svarende til ca. 80 mg colistimethatnatrium.
- Der er ingen øvrige indholdsstoffer.

Promixin®s udseende og pakningsstørrelse

Promixin® er et hvidt til næsten hvidt pulver i et hætteglas.

Promixin® 1 mill. IE fås i pakningsstørrelsen 30 hætteglas.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S
Marielundvej 46D, DK-2730 Herlev

Ompakket og frigivet:

Paranova Pack A/S
Marielundvej 46D, DK-2730 Herlev

Denne indlægsseddel blev senest revideret juli 2011