

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Cetirizin Mylan 10 mg fillovertrukne tabletter

cetirizin



Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

De kan få Cetirizin Mylan uden recept. For at opnå den bedste behandling skal De være omhyggelig med at følge anvisningerne for Cetirizin Mylan.

- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
- Kontakt lægen, hvis De får det værre, eller hvis De ikke får det bedre.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal De vide, før De begynder at tage Cetirizin Mylan
3. Sådan skal De tage Cetirizin Mylan
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger.

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Cetirizin Mylan hører til gruppen af lægemidler, der kaldes antihistaminer og anvendes til behandling af allergiske lidelser.

Cetirizin Mylan virker ved at blokere virkningen af histamin, som er et stof, der findes i kroppens væv, og som blandt andet udløser kløe i huden, løbenæse, tilstoppet næse, øjenkløe, røde øjne og tåreflod. Virkningen af Cetirizin Mylan indtræder efter 2 timer og holder i 24 timer.

Voksne og unge over 12 år:

Cetirizin Mylan anvendes til behandling af symptomer på høfeber og høsnu, ledsagende allergisk øjenbetændelse samt til behandling af kronisk nældefeber.

Børn 6-12 år:

Cetirizin Mylan anvendes til behandling af symptomer på høfeber og høsnu samt til behandling af kronisk nældefeber.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DE VIDE FØR DE BEGYNDER AT TAGE CETIRIZIN MYLAN

Tag ikke Cetirizin Mylan:

- hvis De er overfølsom (allergisk) over for det aktive stof cetirizindihydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Cetirizin Mylan.
- hvis De har alvorligt nedsat nyrefunktion.

Cetirizin Mylan tabletter må ikke anvendes til børn under 6 år.

Vær ekstra forsigtig med at tage Cetirizin Mylan

Det er meget vigtigt, at De holder en god mundhygiejne, når De er i behandling med Cetirizin Mylan, da der ved langtidsbehandling er øget risiko

for caries på grund af mundtørhed.

De skal udvise forsigtighed i følgende tilfælde:

- Hvis De har nedsat nyre- eller leverfunktion, da udskillelsen af cetirizin kan være nedsat.
- Ved samtidig indtagelse af alkohol, da virkningen af alkohol kan forstærkes.
- Ved samtidig brug af lægemidler mod depression med virkning på centralnervesystemet.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Cetirizin Mylan

Dette lægemiddel indeholder lactose. Kontakt lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter.

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De tager nogen form for medicin.

Graviditet:

De må kun tage Cetirizin Mylan efter lægens anvisning.

Amning:

Erfaringerne med Cetirizin Mylan er begrænsede. De må derfor så vidt muligt ikke tage Cetirizin Mylan, hvis De ammer. Spørg lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Brug af Cetirizin Mylan kan måske virke sløvende i større eller mindre grad. Det skal De tage hensyn til, hvis De skal færdes i trafikken eller arbejde med maskiner.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept. Anvendelse af Cetirizin Mylan skal stoppes tre dage før allergi-testning, da det kan påvirke resultatet. De bør udvise forsigtighed ved samtidig anvendelse af lægemidler mod depression og med virkning på centralnervesystemet.

Kontakt lægen. Det er eventuelt nødvendigt at justere dosis.

3. SÅDAN SKAL DE TAGE CETIRIZIN MYLAN

Tag altid Cetirizin Mylan nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

LT0960AC

Dosering

Voksne og unge over 12 år: Den anbefalede dosis er 1 tablet dagligt. De kan tage tabletten om aftenen, hvis der opstår døsighed.

Børn 6-12 år: Den anbefalede dosis er 1 tablet dagligt eller 5 mg (½ tablet) to gange dagligt (morgen og aften).

Børn under 30 kg: Den anbefalede dosis er 5 mg (½ tablet) én gang dagligt.

Eldre: Dosis som for voksne.

Børn: Cetirizin Mylan må ikke anvendes til børn under 6 år.

Nedsat nyre- og leverfunktion: Det er her nødvendigt at justere dosis. De skal følge lægens anvisninger.

Behandlingsvarigheden afhænger af symptomerne.

Hvis De har taget for mange Cetirizin Mylan tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget flere Cetirizin Mylan tabletter, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet.

Følgende symptomer kan forekomme ved overdosering: søvnighed, bevidstløshed og/eller irritation (hovedsageligt hos børn). Manglende koordinering af bevægelser, rysten, hovedpine, hallucinationer, kramper, tør mund, rødmen og hypertermi (abnorm høj legemstemperatur (41-43°C) ledsaget af neurologiske forstyrrelser, opkastning og diaré; væske- og salttabet kan medføre akut nyresvigt. Svær hypertermi er absolut behandlingskrævende), stor pupil, tilbageholdelse af urinen samt hurtig puls, blodtryksfald, hjerterytmeforstyrrelser, kvalme og opkastning. Ekstrapyramidale symptomer såsom nedsatte og langsomme bevægelser, øget spænding i musklerne og rysten af hænder i hvile samt ufrivillige bevægelser.

Cetirizin har en beroligende effekt, det kan være tegn på overdosering.

Hvis De har glemt at tage Cetirizin Mylan

De må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt behandlingen uændret.

4. BIVIRKNINGER

Cetirizin Mylan tabletter kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Følgende bivirkninger kan forekomme: mundtørhed, hovedpine, svimmelhed, søvnighed hos børn og voksne, uro, maveonder, fordøjelsesforstyrrelser. I enkelte tilfælde er der set allergiske reaktioner såsom hudreaktioner og væskeansamlinger i underhuden og bindevæv.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

De finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted:

<http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>.

5. OPBEVARING

Opbevar Cetirizin Mylan tabletter utilgængeligt for børn.

Cetirizin Mylan tabletter må ikke opbevares over 25°C.

Brug ikke Cetirizin Mylan efter den udløbsdato, der er anført på pakningen.

Spørg på apoteket, hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Cetirizin Mylan tabletter indeholder:

- Aktivt stof: cetirizindihydrochlorid.
- Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, prægelatineret majsstivelse, povidon, magnesiumstearat, opadry, titandioxid (E171), hypromellose (E464), macrogol og talcum.

Udseende og pakningsstørrelser

- Cetirizin Mylan filmovertrukne tabletter er hvide, kapselformede med delekærv, mærket "CZ" og "10" på den ene side og "G" på den anden.
- Cetirizin Mylan fås i plastikbeholder med 30, 100 eller 250 filmovertrukne tabletter og i blisterpakninger med 7, 10, 14, 15, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 100 (10x10) eller 50 (50x1).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Mylan AB,

Ynglingagatan 14, 10435 Stockholm, Sverige

Fremstiller

Gerard Laboratories,

Baldoye Industrial Estate, Dublin 13, Irland

Repræsentant i Danmark

Mylan ApS, Sluseholmen 2-4, 2450 København SV

Denne indlægsseddel blev sidst opdateret september 2010