

Indlægsseddel: Information til patienten

Ropinirol Mylan 5 mg filmovertrukne tabletter ropinirol (som hydrochlorid)

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Ropinirol Mylan til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ropinirol Mylan
3. Sådan skal du tage Ropinirol Mylan
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Det aktive indholdsstof i Ropinirol Mylan er ropinirol, der tilhører gruppen af lægemidler, som kaldes dopaminagonister. Dopaminagonister påvirker hjernen på samme måde som det naturligt forekommende stof i hjernen, der hedder dopamin.

Ropinirol Mylan anvendes til behandling af Parkinsons sygdom. Mennesker med Parkinsons sygdom har mangel på dopamin i visse dele af hjernen. Da Ropinirol Mylan har en dopamin-lignende virkning, medvirker det til at mindske symptomerne på Parkinsons sygdom.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ropinirol Mylan

Tag ikke Ropinirol Mylan

- hvis du er **allergisk** over for ropinirol eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6)
- hvis du har en alvorlig nyresygdom
- hvis du har en leversygdom.

Fortæl det til lægen, hvis du tror et eller af flere af disse punkter gælder for dig.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Ropinirol Mylan. Ikke alle former for medicin er egnet til alle. Inden du tager Ropinirol Mylan, skal lægen vide det, hvis du har eller har haft en eller flere af følgende tilstande:

- hvis du er **gravid** eller hvis du tror, at du er gravid
- hvis du **ammer**
- hvis du er **under 18 år**
- hvis du har **alvorlige hjerteproblemer**
- hvis du har **alvorlige psykiske problemer**

- hvis du tidligere har oplevet **usædvanlige behov og/eller usædvanlig adfærd** (såsom udtalt spilletrang eller overdreven seksuel adfærd)
- hvis du ikke tåler **visse sukkerarter** (f.eks. lactose)

Fortæl din læge, hvis du oplever symptomer som **depression, ligegyldighed, angst, træthed, svedtendens eller smerter** efter at være stoppet eller have nedsat din behandling med Ropinirol Mylan (**dette kaldes dopaminagonist-abstinenssyndrom eller DAWS**). Hvis problemerne varer ved i mere end et par uger, vil din læge muligvis justere din behandling.

Fortæl din læge, hvis du eller din familie/omsorgsperson bemærker, at du udvikler stærk trang eller adfærd, som er usædvanlig for dig og hvis du ikke kan modstå lysten eller fristelsen for at udføre bestemte aktiviteter, som kan skade dig selv eller andre. Denne form for opførsel kaldes sygelige vane- og impulshandlinger og kan omfatte adfærd såsom sygelig spilletrang, overdreven spisning eller brug af penge, unormalt stor sexlyst eller øget antal seksuelle tanker eller følelser. Der kan være behov for, at din læge ændrer din behandling.

Fortæl din læge, hvis du eller din familie/ omsorgsperson bemærker, at du udvikler episoder af hyperaktivitet, opstemthed eller irritabilitet (symptomer på mani). Disse kan forekomme med eller uden symptomer på sygelige vane- og impulshandlinger (se ovenfor). Der kan være behov for, at din læge ændrer din behandling.

Fortæl din læge, hvis du tror, at noget af ovenstående gælder for dig. Din læge kan beslutte, at Ropinirol Mylan ikke er egnet til dig, eller at du har behov for ekstra kontrol, mens du tager det.

Mens du tager Ropinirol Mylan

Fortæl det til lægen, hvis du eller nogen i din familie bemærker, at du har udviklet unormal adfærd (såsom unormal spilletrang eller øget sexlyst og/eller seksuel adfærd), mens du tager Ropinirol Mylan. Lægen vil muligvis justere dosis eller afbryde behandlingen.

Ropinirol Mylan kan gøre dig døsigt. Det kan få en til at føle sig meget søvnig og nogle gange kan det få en til at falde i søvn meget pludseligt uden varsel. Dette sker oftere hos personer med Parkinsons sygdom. Hvis du oplever dette, må du ikke køre bil eller betjene maskiner.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Ropinirol Mylan virker sløvende, og at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Ropinirol Mylan kan gøre dig døsigt. **Det kan få dig til at føle dig meget søvnig**, og du kan risikere pludseligt at falde i søvn uden varsel.

Ropinirol kan forårsage hallucinationer (man ser, hører eller føler ting, der ikke er virkelige). Hvis du oplever dette, må du ikke køre bil eller motorcykel eller betjene maskiner.

Hvis du har mærket dette, må du ikke køre i bil eller betjene maskiner eller bringe dig selv eller andre i en situation, hvor søvnighed eller det at falde i søvn kan medføre alvorlig skade eller død. Du skal undgå sådanne situationer, så længe du mærker dette.

Tal med lægen, hvis ovenstående skaber problemer for dig.

Brug af andre lægemidler sammen med Ropinirol Mylan

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager andre lægemidler, for nylig har taget andre lægemidler eller planlægger at tage andre lægemidler. Husk at fortælle det til lægen, hvis du begynder at tage et andet lægemiddel, mens du tager Ropinirol Mylan.

Andre lægemidler kan påvirke virkningen af Ropinirol Mylan og dermed øge risikoen for bivirkninger. Ropinirol Mylan kan også påvirke andre lægemidlers virkning.

Dette gælder for:

- medicin mod **depression** (f.eks. **fluvoxamin**)
- medicin mod andre **psykiske sygdomme** (f.eks. **sulpirid**)
- hormon substitutionsbehandling (**HRT**)
- medicin mod **kvalme** og **halsbrand** (f.eks. **metoclopramid**)
- medicin mod **infektion** (f.eks. **ciprofloxacin** eller **enoxacin**)
- andre lægemidler mod Parkinsons sygdom.

Fortæl det til lægen, hvis du tager eller for nyligt har taget nogle af disse lægemidler.

Du skal have taget flere blodprøver, hvis du tager følgende lægemidler sammen med ropinirol:

- Vitamin K-antagonister (bruges til forebyggelse af blodpropper) såsom warfarin.

Rygning og Ropinirol Mylan

Fortæl det til lægen, hvis du er begyndt at ryge eller hvis du er holdt op med at ryge, mens du tager Ropinirol Mylan. Lægen vil muligvis justere dosis.

Brug af Ropinirol Mylan sammen med mad og drikke

Hvis du tager Ropinirol Mylan sammen med mad, kan det nedsætte risikoen for at få kvalme eller kaste op. Du bør derfor så vidt muligt tage Ropinirol Mylan i forbindelse med et måltid.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Du må ikke tage Ropinirol Mylan, hvis du er gravid, medmindre din læge vurderer, at fordelene for dig er større end risikoen for det ufødte barn. **Hvis du ammer, må du ikke tage Ropinirol Mylan**, da Ropinirol Mylan kan nedsætte mælkemængden.

Fortæl det straks til lægen, hvis du er gravid, hvis du tror, at du er gravid eller hvis du planlægger at blive gravid. Lægen vil også rådgive dig, hvis du ammer eller hvis du har planer om at amme. Lægen vil muligvis råde dig til at stoppe med at tage Ropinirol Mylan.

Ropinirol Mylan indeholder lactose og natrium

Ropinirol Mylan tabletter indeholder en lille mængde af en sukkerart, der hedder lactose. Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit.

3. Sådan skal du tage Ropinirol Mylan

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Du får enten kun Ropinirol Mylan til behandling af Parkinsons sygdom eller du får Ropinirol Mylan sammen med et andet lægemiddel, der kaldes L-dopa (kaldes også levodopa).

Du må ikke give Ropinirol Mylan til børn. Ropinirol Mylan ordineres normalt ikke til personer under 18 år.

Så meget Ropinirol Mylan skal du tage

Det kan tage lidt tid at finde den dosis af Ropinirol Mylan, der passer bedst til dig.

Den sædvanlige startdosis er 0,25 mg 3 gange dagligt i den første uge. Herefter vil lægen øge dosis hver uge i de næste tre uger. Herefter vil lægen gradvist øge dosis, indtil du når den dosis, der passer

bedst til dig. Den sædvanlige dosis er 1-3 mg 3 gange dagligt (total daglig dosis på 3-9 mg). Hvis der ikke er sket tilstrækkelig bedring af dine Parkinsons-symptomer, vil lægen måske gradvist øge dosis yderligere. Nogle patienter tager op til 8 mg Ropinirol Mylan 3 gange dagligt (total daglig dosis på 24 mg).

Hvis du også tager et andet lægemiddel mod Parkinsons sygdom, vil lægen muligvis råde dig til gradvist at mindske dosis af det andet lægemiddel. Hvis du tager L-dopa, kan du opleve ukontrollerbare bevægelser (dyskinesi), når du begynder med at tage Ropinirol Mylan. Fortæl det til din læge, hvis dette sker, da din læge muligvis skal justere dosis af den medicin, du tager.

Du må ikke tage flere Ropinirol Mylan tabletter end anvist af lægen.

Der kan gå et par uger, før Ropinirol Mylan begynder at virke.

Sådan tager du dosis

Slug tabletten hel med et glas vand. Det er bedst at tage Ropinirol Mylan i forbindelse med et måltid, da det så er mindre sandsynligt, at du får kvalme.

Hvis du har taget for mange Ropinirol Mylan tabletter

Kontakt straks lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Ropinirol Mylan, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet. Medbring Ropinirol Mylan-æskan, og vis den til lægen.

Hvis du har taget for mange Ropinirol Mylan tabletter, kan du få følgende symptomer: Kvalme, opkastning, svimmelhed, dødsghed, mental eller fysisk træthed, besvimelse eller se, føle og høre ting, der ikke findes (hallucinationer).

Hvis du har glemt at tage Ropinirol Mylan

Du må ikke tage ekstra tabletter eller en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Tag den næste dosis som planlagt.

Hvis du har glemt at tage Ropinirol Mylan en hel dag eller i flere dage i træk, skal du tale med lægen om, hvordan du skal fortsætte med at tage tabletterne.

Hvis du holder op med at tage Ropinirol Mylan

Du skal tage Ropinirol Mylan lige så længe lægen tilråder det. Du må ikke ophøre med behandlingen medmindre, lægen har bedt dig om det.

Hvis du pludseligt ophører med at tage Ropinirol Mylan, kan dine symptomer hurtigt blive meget værre. Hvis du pludseligt stopper med at tage Ropinirol Mylan, kan du få noget, der hedder malignt neuroleptikasyndrom, som kan være livsfarligt. Symptomerne er f.eks. nedsat evne til at bevæge musklerne (akinesi), stive muskler, feber, ustabil blodtryk, hurtig puls (takykardi), forvirring, nedsat bevidsthedsniveau (f.eks. koma).

Hvis du skal ophøre med at tage Ropinirol Mylan, vil lægen sænke din dosis gradvist.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkninger er mest sandsynlige i begyndelsen af behandlingen eller ved dosisøgning. De er som oftest milde og bliver mindre generende efter et stykke tid. Tal med lægen, hvis du er bekymret over bivirkningerne.

Meget almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer):

- besvimelse
- kvalme
- døsighed

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

- hallucinationer (ser ting der ikke er der)
- opkastning
- svimmelhed
- halsbrand
- mavesmerter
- hævede ben, fødder eller hænder

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

- lavt blodtryk (hypotension)
- svimmelhed eller følelse af svaghed, især når du rejser dig op (dette skyldes et fald i blodtrykket)
- voldsom træthed om dagen (ekstrem døsighed)
- man falder pludseligt i søvn uden varsel
- psykiske problemer såsom udpræget forvirring, vrangforestillinger (fornuftsstridige forestillinger) eller paranoia (ubegrundede mistanker)
- hikke

Nogle patienter kan opleve følgende bivirkninger (hyppighed ikke kendt, kan ikke vurderes ud fra de eksisterende oplysninger):

- allergiske reaktioner som f.eks. røde, kløende hævelser på huden (nældefeber), hævelse i ansigt, af læber, i mund, tunge eller hals, hvilket kan give synkebesvær og åndedrætsbesvær, udslæt eller voldsom kløe (se afsnit 2)
- aggressivitet
- overforbrug af Ropinirol Mylan (trang til at tage store doser dopaminholdig medicin ud over den nødvendige dosis for at kunne kontrollere bevægelsesforstyrrelserne, kaldes dopamin-dysreguleringssyndrom)
- efter stop eller nedtrapning af din behandling med Ropinirol Mylan: Depression, ligegyldighed, angst, træthed, øget svedtendens eller smerter kan forekomme (dette kaldes dopaminagonist-seponeringssyndrom eller DAWS)
- ændret leverfunktion, som kan påvises i blodprøver
- spontan penis erektion

Du kan få følgende bivirkninger:

- manglende evne til at modstå trangen til at gøre noget som kan være skadeligt for dig selv eller andre, hvilket kan være:
 - sygelig spilletrang på trods af alvorlige personlige eller familiære konsekvenser.
 - ændret eller øget seksuel interesse og opførsel, der skaber bekymring for dig eller andre, f.eks. øget sexlyst.
 - ukontrolleret og overdreven købelyst eller brug af penge
 - overspisning (spiser store mængder mad på meget kort tid) eller tvangsspisning (spiser mere mad end normalt eller mere end der skal til for at gøre dig mæt)
 - episoder med hyperaktivitet, opstemthed eller irritabilitet

Fortæl din læge, hvis du oplever nogen af disse symptomer; Lægen vil tale med dig om, hvordan man kan reducere og kontrollere disse symptomer.

Hvis du tager Ropinirol Mylan sammen med L-dopa

Hvis du tager Ropinirol Mylan samtidig med L-dopa kan du med tiden få andre bivirkninger:

- ukontrollerbare bevægelser (dyskinesi) er en meget almindelig bivirkning. Hvis du tager L-dopa, kan du opleve ukontrollerbare bevægelser (dyskinesi), når du begynder med at tage Ropinirol Mylan. Fortæl det til din læge, hvis dette sker, da din læge muligvis skal justere dosis af den medicin, du tager
- forvirring er en almindelig bivirkning

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige opbevaringsbetingelser.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ropinirol Mylan indeholder:

- Aktivt stof: ropinirol
En filmoverttrukket tablet indeholder 5 mg ropinirol (som hydrochlorid).
- Øvrige indholdsstoffer: Mikrokrystallinsk cellulose, lactosemonohydrat (se afsnit 2 "Ropinirol Mylan indeholder lactose"), croscarmellosematrium, hypromellose, magnesiumstearat.

Tablettens filmovertæk indeholder:

Hypromellose
Titandioxid (E171)
Macrogol
Polysorbat
Indigocarmin (E132)

Udseende og pakningsstørrelser

Blå, kapselformet, bikonveks filmoverttrukket tablet med delekærv på begge sider. Tabletten kan deles i to lige store dele.

Ropinirol Mylan fås i en HDPE-flerdosisbeholder med børnesikret låg med 21, 28, 84 og 126 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Mylan AB
Postboks 23033
104 35 Stockholm
Sverige
Tel: +46 (0) 8 555 227 50
Fax: +46 (0) 8 555 227 51
E-mail: inform@mylan.se

Lokal repræsentant

Viatrix ApS
Borupvang 1
2750 Ballerup

Fremstiller

McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories
Baldoyle Industrial Estate, Grange Road
Dublin 13
Irland

eller

Mylam Hungary Kft
H-2900 Komarom
Mylan utca 1
Ungarn

eller

Mylan Germany GmbH
Zweigniederlassung Bad Homburg v. d. Hoehe, Benzstrasse 1
Bad Homburg v. d. Hoehe
Hessen, 61352,
Tyskland

Denne indlægsseddel blev senest ændret oktober 2023.