

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Feldene 0,5% gel Piroxicam

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

- De kan få Feldene gel uden recept. For at opnå den bedste behandling skal De være omhyggelig med at følge anvisningerne for Feldene.
- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
- Kontakt lægen, hvis De får det værre, eller ikke får det bedre, inden et par dage.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse.
2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Feldene.
3. Sådan skal De bruge Feldene.
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring.
6. Yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Feldene tilhører gruppen af ikke-steroid betændelsesdæmpende lægemidler (NSAID). Feldene dæmper betændelse og er smertestillende.

De kan bruge Feldene mod smerter, ømhed og hævelse i muskler, sener og led pga. betændelse.

Lægen kan have givet Dem Feldene for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Feldene

Brug ikke Feldene, hvis De:

- Er overfølsom (allergisk) over for piroxicam eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- Tidligere har haft vejrtrækningsproblemer, hævet ansigt, svælg, tunge og slimhinder, astma, snue eller nældefeber efter behandling med acetylsalicylsyre eller anden smertestillende medicin (NSAID).
- Er gravid i 7.-9. måned.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Feldene

Kontakt lægen, hvis De

- Får irritation eller udslet på behandlingsstedet.
- Har eller har haft dårlige nyrer.

Vær opmærksom på følgende:

- De må ikke bruge Feldene i øjne, på slimhinder, på beskadiget hud eller ved hudsygdomme.
- Feldene kan gøre det sværere at blive gravid. Tal med lægen.
- Hvis De er i behandling med medicin mod betændelse (metronidazol) eller Antabus, så tal med lægen, da Feldene Gel indeholder små mængder alkohol.
- Feldene gel kan misfarve huden og tøjet. Det er vigtigt, at gelen smøres fuldstændigt ind i huden.

- Feldene indeholder propylenglycol, som kan irritere huden.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Feldene indeholder alkohol (ethanol). Hvis De er i behandling med Antabus eller metronidazol (mod betændelse), må De ikke bruge Feldene uden først at tale med lægen eller apoteket.

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis De er gravid, må De kun bruge Feldene efter aftale med Deres læge.

De må ikke bruge Feldene i de sidste 3 måneder af graviditeten.

Amning

Hvis De ammer, må De kun bruge Feldene efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Feldene påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Feldene

Feldene indeholder propylenglycol, som kan irritere huden.

Feldene indeholder alkohol (ethanol). Hvis De er i behandling med Antabus eller metronidazol (mod betændelse), må De ikke bruge Feldene gel uden først at tale med lægen eller apoteket.

3. Sådan skal De bruge Feldene

Hvis Deres læge har ordineret Feldene til Dem, skal De altid følge lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

De skal smøre Feldene ind i huden, til den føles helt tør.

De skal vaske hænder efter påsmøringen. Feldene kan gulfarve huden lidt og plette tøjet, hvis Feldene ikke er gnedet fuldstændigt ind i huden.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne:

De skal gnide 2-5 cm Feldene gel (det svarer til ca. 1 g gel) ind i huden 3-4 gange dagligt.

Børn:

De må kun bruge Feldene til børn under 15 år efter lægens anvisning.

De må ikke dække den påsmurte hud med plastik eller gaze.

Hvis De har brugt for meget Feldene

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har brugt mere Feldene, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas. Tag pakningen med.

Hvis De har glemt at bruge Feldene

Hvis De har glemt at bruge Feldene, bør De blot bruge gelen, så snart De kommer i tanke om det. Brug aldrig dobbelt mængde.

4. Bivirkninger

Feldene kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

- Vejrtrækningsbesvær, åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 behandlede):

- Mavebesvær som kvalme, sure opstød.

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

- Mavesmerter, opkastninger.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

- Irritation på huden, rødmen af huden, udslæt, kløe, eksem, tør afskalning af huden.
- Kontakteksem.
- Øget følsomhed af huden for lys.
- Forbigående misfarvning af huden.
- Påvirkning af nyrer.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. De eller Deres pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted:

www.meldenbivirkning.dk

5. OPBEVARING

- Opbevar Feldene utilgængeligt for børn.
- De kan opbevare Feldene ved almindelig temperatur.
- Brug ikke Feldene efter den udløbsdato, der står på pakningen.
- Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Feldene 0,5% gel indeholder:

Aktivt stof: piroxicam.

Øvrige indholdsstoffer: carbapol 980, propylenglycol, ethanol 96%, benzylalkohol, diisopropanolamin, hydroxyethylcellulose, rensset vand.

Udseende og pakningsstørrelser:

Udseende

Feldene gel er klar til lysegul.

Pakningsstørrelser

Gelen er pakket i en aluminiumstube der indeholder 50 g

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

SinGad Pharma ApS.

Vibe Allé 5, blok 2B

2980 Kokkedal

Ompakket og frigivet af

SinGad Pharma ApS.

Vibe Allé 5, blok 2B

2980 Kokkedal

Denne indlægsseddel blev sidst revideret oktober 2009