

Alfuzosin Alternova depottabletter 10 mg

Alfuzosin

1132390901AD

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Alfuzosin Alternova til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Alfuzosin Alternova virkning og hvad du skal bruge det til
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Alfuzosin Alternova
3. Sådan skal du tage Alfuzosin Alternova
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer du Alfuzosin Alternova
6. Yderligere oplysninger

1. ALFUZOSIN ALTERNOVA VIRKNING OG HVAD DU SKAL BRUGE DET TIL

Alfuzosin Alternova er en alfa 1-receptor blokker, der mindsker muskelspændingen i blærebunden, blærehalskirtlen og urinrøret. Dette letter presset på urinrøret, så vandladningsproblemerne mindskes. Alfuzosin Alternova afhjælper vandladningsproblemer, som følge af godartet forstørret blærehalskirtel (Benign prostatahyperplasi, også kaldet BPH). Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE ALFUZOSIN ALTERNOVA

Tag ikke Alfuzosin Alternova

- Hvis du er allergisk (overfølsom) over for Alfuzosin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Alfuzosin Alternova.
- Hvis du har tendens til for lavt blodtryk, når du rejser dig.
- Hvis du har nedsat leverfunktion.

Alfuzosin Alternova bør ikke anvendes sammen med andre alfa-blokkere. Er du i tvivl, om du kan tage Alfuzosin Alternova, så spørg din læge.

Vær ekstra forsigtig med at tage Alfuzosin Alternova

- Hvis du anvender blodtryksmedicin, lider af svimmelhed eller let reagerer på Alfuzosin.

I sjældnere tilfælde kan svimmelhed optræde ved start af behandlingen, hvilket er et forbigående fænomen. Hvis dette opstår, skal du ligge ned, indtil symptomerne er forsvundet helt.

Hvis du skal opereres for grå stær, bør du inden operationen informere din øjenspecialist om, at du er i behandling eller tidligere har været i behandling med Alfuzosin Alternova. Alfuzosin Alternova kan forøge risikoen for komplikationer i forbindelse med operationen. Disse komplikationer kan håndteres, hvis øjenspecialisten er informeret.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

For at undgå indvirkning på andre lægemidler bør du fortælle din læge eller apotek, hvilke lægemidler du anvender. Dette gælder især, hvis du får blodtryksmedicin, andre alfa-blokkere eller nitratpræparater.

Ved fuld bedøvelse kan brug af Alfuzosin Alternova medføre ustabil blodtryk, hvorfor man inden operation/bedøvelse bør gøre narkoselægen opmærksom på, at man tager Alfuzosin Alternova.

Brug af Alfuzosin Alternova sammen med mad og drikke

Du bør tage Alfuzosin Alternova efter et måltid.

Graviditet og amning

Denne medicin er ikke beregnet til kvinder.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Brug af Alfuzosin Alternova kan måske virke sløvende i større eller mindre grad. Det skal du tage hensyn til, hvis du skal færdes i trafikken eller arbejde med maskiner.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE ALFUZOSIN ALTERNOVA

Tag altid Alfuzosin Alternova nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteket.

Dosering:

Den anbefalede dosering er én depot-tablet daglig.

Depottabletten synkes hel, og bør indtages efter samme måltid hver dag (f.eks. aftensmåltidet).

Nedsat leverfunktion:

Det er her nødvendigt at justere eller nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Følg altid lægens anvisning. Der er stor forskel på, hvad den enkelte har brug for.

Ændring eller stop af behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Hvis du har taget for mange Alfuzosin Alternova depottabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Alfuzosin Alternova, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet.

Hvis du har glemt at tage Alfuzosin Alternova

Hvis du glemt at tage en depottablet, fortsætter du blot næste dag med én depottablet dagligt som ordineret. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for en glemt dosis.

Hvis du holder op med at tage Alfuzosin Alternova

Hold ikke op med behandlingen uden at kontakte lægen først.

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.

4. BIVIRKNINGER

Alfuzosin Alternova kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Almindelige bivirkninger:

Mavesmerter, kvalme, matted, svimmelhed, træthed og hovedpine

Ikke almindelige bivirkninger:

Ortostatisk hypotension (meget lavt blodtryk i stående stilling), hjertebanken, smerter i brystet, hævelser, hedsure, diarré, utilpashed, døsighed, mundtørhed, hud udslet og kløe.

Hvis en bivirkning bliver alvorlig eller du bemærker nogen form for bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel, bør du fortælle det til deres læge eller apotek.

Der kan i sjældne eller meget sjældne tilfælde optræde andre ikke alvorlige bivirkninger. Ønsker du information om disse bivirkninger, så spørg lægen eller apoteket.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

5. SÅDAN OPBEVARER DU ALFUZOSIN ALTERNOVA

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Alfuzosin Alternova efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Alfuzosin Alternova indeholder:

- Aktivt stof: Alfuzosinhydrochlorid svarende til alfuzosin 10 mg.
- Øvrige indholdsstoffer: hypromellose, hydrogeneret vegetabilsk olie, magnesiumstearat, povidon K 30, silica, kolloid vandfri, titandioxid (E171), calciumhydrogenphosphat, propylenglycol.

Alfuzosin Alternova udseende og pakningsstørrelse

Hvide, runde, let hvælvede tabletter.

Blisterpakninger af 10, 30, 50, 90, 100 eller 500 depottabletter

Ikke alle pakningsstørrelser bliver nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen
Alternova A/S
Lodshusvej 11,
4230 Skælskør

Fremstiller
Viminco A/S
Lodshusvej 11
4230 Skælskør
Danmark

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Lægemidlet er ikke markedsført af Alternova i andre europæiske lande.

Denne indlægsseddel blev senest godkendt 06/2008