

Bricanyl® Turbuhaler® 0,5 mg/dosis, inhalationspulver

Bricanyl® Turbuhaler® svarer til lægemidlet Bricanyl® Turbuhaler®

Bricanyl® og Turbuhaler® er registrerede varemærker, som tilhører AstraZeneca koncernen.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge medicinen.

- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
- Lægen har ordineret Bricanyl® Turbuhaler® til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Bricanyl® Turbuhaler®
3. Sådan skal De bruge Bricanyl® Turbuhaler®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Inhalationspulver der følger med indåndingsluften ned i lungerne, når De trækker vejret dybt gennem mundstykket.

Virkemåde:

Bricanyl® Turbuhaler® indeholder et bronkieudvidende middel, der afslapper musklerne i luftvejene og ophæver herved den pludselige forsnævring i bronkierne, som optræder i forbindelse med et astmaanfald. Luften kan nu lettere passere, og det bliver nemmere at trække vejret. Bricanyl® Turbuhaler® virker i løbet af få minutter, og virkningen holder sig i ca. 6 timer.

Anvendelse:

De skal bruge Bricanyl® Turbuhaler® til behandling af astmaanfald og andre former for vejrtrækningsbesvær. De skal kun bruge Bricanyl® Turbuhaler®, når De har behov for det i forbindelse med et astmaanfald. Brug ikke Bricanyl® Turbuhaler® som vedligeholdelsesbehandling.

Lægen kan have givet Dem Bricanyl® Turbuhaler® for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT BRUGE BRICANYL® TURBUHALER®

Brug ikke Bricanyl® Turbuhaler®:

Hvis De er overfølsom (allergisk) overfor terbutalin.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Bricanyl® Turbuhaler®

Tal med lægen hvis De:

- har hjerte/karsygdomme, for højt blodtryk eller høj, uregelmæssig puls, og De er i behandling med digoxin eller anden hjertemedicin, sukkersyge eller for højt stofskifte (Basedow).
- hvis medicinen ikke har samme virkning som den plejer, og De får flere symptomer på astma, f.eks. hoste og åndenød eller Deres forbrug af Bricanyl® Turbuhaler® stiger.
- hvis De har en svær astma, er der risiko for, at kalium i blodet bliver for lavt, især hvis De samtidig tager vanddrivende medicin, astmamedicin med theofyllin eller lignende stoffer eller binyrebarkhormoner.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

De kan bruge Bricanyl® Turbuhaler® sammen med anden medicin, men tal først med Deres læge, hvis De er i behandling med medicin mod:

- Forhøjet blodtryk eller hjertesvigt (visse beta-blokkere, spørg Deres læge)
- Forstyrrelser i hjerterytmen (digitalis eller digoxin)
- Grøn stær (visse øjendråber, spørg Deres læge)
- Medicin, der øger hjerterytmen
- eller hvis De er i behandling med binyrebarkhormoner, vanddrivende midler eller andre midler til behandling af astma.

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De bruger nogen form for medicin.

Graviditet:

De kan bruge Bricanyl® Turbuhaler® under graviditet, men rådfør Dem med Deres læge.

Bricanyl® Turbuhaler® kan hæmme veerne under fødslen.

Amning:

De kan bruge Bricanyl® Turbuhaler®, men rådfør Dem med Deres læge. Terbutalin bliver udskilt i modermælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Bricanyl® Turbuhaler® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. SÅDAN SKAL DE BRUGE BRICANYL® TURBUHALER®

Brug altid Bricanyl® Turbuhaler® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Dosering:

De bør kun bruge Bricanyl® Turbuhaler®, når De har behov for det i forbindelse med et astmaanfald og ikke som en regelmæssig behandling.

Voksne:

Sædvanligvis 1 sug fire gange dagligt. Hvis det er nødvendigt, kan De tage op til 3 sug under samme anfald.

De bør ikke tage mere end 12 sug i døgnet.

Børn fra 10 år:


Sædvanligvis 1 sug to gange dagligt. Hvis det er nødvendigt, kan et barn tage op til 2 sug under samme anfald.

Et barn bør ikke tage mere end 8 sug i døgnet.

Korrekt håndtering af Bricanyl® Turbuhaler® Brugsanvisning:

Sådan anvendes Bricanyl® Turbuhaler®:

1. Beskyttelseshætten skrues af.
2. Hold Bricanyl® Turbuhaler® lodret med det farvede bundstykke nedad. Bundstykket drejes én gang frem og tilbage, se Figur 1.




Figur 1

3. Pust ud

NB! Der må ikke pustes ud i Bricanyl® Turbuhaler®

4. Mundstykket sættes til munden, og der tages så dyb og kraftig en indånding som muligt, se Figur 2.




Figur 2

5. Tag Bricanyl® Turbuhaler® fra munden og ånd langsomt ud.
6. Hvis lægen har ordineret mere end en dosis, gentages behandlingen fra punkt 2 til 5.
7. Beskyttelseshætten skrues på.

Følg altid brugsanvisningen nøje og skru altid beskyttelseshætten på efter brug.

Bricanyl® Turbuhaler® afgiver ved korrekt brug altid én dosis terbutalinsulfat også selv om der er drejet flere gange. Den inhalerede dosis kan hverken smages eller mærkes.

Bricanyl® Turbuhaler® er forsynet med en dosisindikator se Figur 3.



Figur 3

Når det røde mærke kommer til syne øverst i dosisindikatoren, er der ca. 20 doser tilbage.

Dosisindikatoren tæller antal klik.

Når det røde mærke når bunden af dosisindikatoren, er Bricanyl® Turbuhaler® tom, og den kasseres.

I bunden af Bricanyl® Turbuhaler® er der et tørremiddel. Den lyd der kommer, når Bricanyl® Turbuhaler® rystes, stammer fra dette tørremiddel og *ikke* fra medicinen!

Mundstykket må *ikke* rengøres med vand, da fugt får inhalationspulveret til at klumpe sammen.

Hvis De har brugt for meget Bricanyl® Turbuhaler®
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har brugt mere Bricanyl® Turbuhaler®, end der står her eller mere end lægen har foreskrevet, og De af den grund føler Dem utilpas. Tag pakningen med.

Overdosering kan give hjertebanken, evt. blodtryksfald (besvimelse), angst, rysten på hænderne og symptomer som beskrevet under bivirkninger.

Hvis De har glemt at bruge Bricanyl® Turbuhaler®
Bricanyl® Turbuhaler® bør anvendes ved behov og ikke som regelmæssig behandling.

Hvis De holder op med at bruge Bricanyl® Turbuhaler®
Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Bricanyl® Turbuhaler® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 1-10% af de behandlede patienter kan forvente at få bivirkninger. De fleste bivirkninger vil forsvinde spontant i løbet af 1-2 uger fra behandlingsstart.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10 000 behandlede):

- Åndedrætsbesvær/astmaligende anfald. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (Det sker hos flere end 1 ud af 10 patienter)

- Hovedpine
- rysten

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

- Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i sjældne tilfælde blive alvorligt med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.
- Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis De får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal De kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Langvarige muskelkramper.
- Hjertebanken

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10 000 behandlede):

- Søvn- og adfærdsforstyrrelser som ophidselse, hyperaktivitet og rastløshed.
- Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
- Utilstrækkelig iltforsyning lokalt i hjertet.
- Kvalme
- Hududslæt
- nældefeber

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. De eller Deres pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted:

www.meldenbivirkning.dk

5. OPBEVARING

- Opbevar Bricanyl® Turbuhaler® utilgængeligt for børn.
- Brug ikke Bricanyl® Turbuhaler® efter den udløbsdato, der står på pakningen.
- Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.
- Opbevar Bricanyl® Turbuhaler® tørt og med beskyttelseshætten skruet tæt til.
- Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE INFORMATION

Bricanyl® Turbuhaler® 0,5 mg/dosis, inhalationspulver

Aktivt stof: terbutalinsulfat 0,5 mg/dosis.

Bricanyl® Turbuhaler® indeholder ingen hjælpestoffer.

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende

Bricanyl® inhalationspulver er et farveløst og smagsløst pulver.

Pakningsstørrelse

Bricanyl® Turbuhaler® findes i en pakning med 200 doser.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

SinGad Pharma ApS, Vibe Allé 5, blok 2B, 2980 Kokkedal

Ompakket og frigivet af

SinGad Pharma ApS, Vibe Allé 5, blok 2B, 2980 Kokkedal

Denne indlægsseddel blev sidst revideret september 2011

Find også den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk