

Selexid®

Filmovertrukne tabletter 200 mg

Læs denne information godt igennem, før De begynder at tage medicinen

- Gem denne information. De får måske brug for at læse den igen.
- Ønsker De mere information, så kontakt læge eller apotek.
- Lægen har ordineret Selexid® til Dem personligt. Giv derfor ikke medicinen til andre.

1. Virkning og anvendelse:

Selexid® tabletter er hvide, runde tabletter. Tabletterne er præget "137" på den ene side og med symbol på den anden.

Selexid® er et antibiotikum af penicillintype.

Selexid® virker på bakterier ved at hindre opbygningen af bakteriernes væg, så bakterien ødelægges.

De kan få Selexid® mod urinvejsinfektioner og infektioner med salmonella.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Vigtig information som De skal læse, før De tager Selexid®.

Tag ikke Selexid® hvis:

- De er overfølsom over for pivmecillinam eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer.
- De er overfølsom over for penicillin.

Særlig forholdsregler

Tal med lægen hvis:

- De er overfølsom over for cefalosporiner.
- De lider af en stofskiftesygdom.
- De tager medicin mod epilepsi (valproat).
- De tager anden medicin mod betændelse (pivampicillin).
- De har forsnævring af spiserøret.
- De får langvarig eller blodig diaré under behandlingen med Selexid®. Dette kan være tegn på alvorlig tarmbetændelse (pseudomembranøs colitis).

Brug af Selexid® sammen med mad og drikkevarer

De kan tage Selexid® sammen med mad og drikke.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før De tager nogen form for medicin.

Graviditet:

De kan tage Selexid® under graviditet.

Amning:

De kan amme, selv om De tager Selexid®.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Selexid® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Brug af anden medicin

Tal med Deres læge, hvis De tager:

- anden medicin mod betændelse (f.eks. tetracyklin, erythromycin, andre betalactamantibiotika, aminoglykosider).
- medicin mod urinsyreigt (probenecid).

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin som er købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

3. Sådan skal De tage Selexid®:

Dosering:

Voksne:

1-2 tabletter på 200 mg (i alt 200-400 mg) 3 gange daglig.

Børn:

Dosis afhænger af barnets vægt. Tal med lægen.

F.eks. skal et barn der vejer 30 kg have 1 tablet på 200 mg 3 gange daglig.

De kan normalt ikke bruge Selexid®, filmovertrukne tabletter til børn under 30 kg. Følg lægens anvisning.

Ældre:

Det er ikke nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Nedsat nyre- og leverfunktion:

Det er ikke nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.
--

Brugsanvisning

De bør tage Selexid[®] filmovertrukne tabletter med mindst 1/2 glas vand.
De kan tage Selexid[®] sammen med mad.

Har De taget for mange Selexid[®]?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Selexid[®], end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas.

Symptomer på overdosering er mavesmerter, kvalme og opkastning.

Har de glemt at tage Selexid[®]?

Hvis De har glemt at tage Selexid[®], skal De ikke tage dobbelt dosis, men blot fortsætte med sædvanlig dosis.

4. Bivirkninger:

Selexid[®] kan som al anden medicin give bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Hyppigheden er ikke kendt:

- Pludselige overfølsomhedsreaktioner (inden for minutter til timer), f.eks. hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (anafylaktisk shock). Ring 112. Kan være livsfarligt.
- Svær langvarig, blodig diaré med mavesmerter eller feber. Kontakt straks læge.
- Hævelse af tunge, læber og ansigt. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Forandringer i blodet, der kan vise sig ved blødning fra hud og slimhinder, blå mærker, træthed, infektioner og feber. Søg straks læge.
- Smerter bag nederste del af brystbenet, fornemmelse af at føden ikke kan passere og sure opstød, pga. sår i nedre del af spiserøret. Kontakt straks læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Almindelige - meget almindelige bivirkninger (ses hos flere end 1 ud af 100 behandlede):

- Diaré, opkastning, kvalme.

Ikke almindelige bivirkninger (ses hos mellem 1 og 10 ud af 1000 behandlede):

- Udslæt.
- Synkebesvær, mavesmerter.

Sjældne - meget sjældne bivirkninger (ses hos færre end 1 ud af 1000 behandlede):

- Nældefeber.

Hyppigheden er ikke kendt:

- Forbigående forhøjelse af levertal (laboratorieprøver), kløe, ledsmerter, feber, muskelsvaghed.
- Sår i munden og betændelse i spiserøret med smerter bag brystbenet, svien og meget sure opstød.

Der er en række bivirkninger, som først ses ved blodprøvekontrol. Det er forbigående forhøjelse af levertal og andre forandringer i blodet.

Fortæl læge eller apotek, hvis De får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl læge eller apotek, hvis De får bivirkninger der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

De finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted;

<http://www.Lægemiddelstyrelsen.dk>

5. Opbevaring:

Opbevar Selexid[®] utilgængeligt for børn.

Tag ikke Selexid[®] efter den udløbsdato, der står på pakningen.

6. Ydeligere information:

Aflever altid medicinrester på apoteket.

Selexid[®] indeholder:

Selexid[®] filmovertrukne tabletter 200 mg.

Det aktive indholdsstof i Selexid[®] er: pivmecillinamhydrochlorid 200 mg (svarende til 137 mg mecillinam).

De øvrige indholdstoffer er: mikrokrySTALLinsk cellulose, hydroxypropylcellulose, hypromellose, magnesiumstearat.

Pakningsstørrelser

Selexid[®] filmovertrukne tabletter findes i blisterpakninger á 108 filmovertrukne tabletter.

Markedsføring i Danmark:

SinGad Pharma, Vibe Allé 5 blok 2B, 2980 Kokkedal

Fremstiller:

Recip Strängnäs AB, 64541 Strängnäs, Sverige

Selexid[®] er et registreret varemærke, som tilhører LEO Pharma A/S

Revideret 03/2008.