

68 016 47.03

Rhinosol[®] næsespray, suspension 32 mikrogram/dosis

Læs denne information godt igennem før du begynder at bruge medicinen.
- Du kan få denne medicin uden recept. For at få den bedste virkning, skal du altid følge vejledningerne i denne information.
- Gør informationen, du får måske brug for at læse den igen.
- Ønsker du mere information, så kontakt læge eller apotek.

Rhinosol indeholder:

- Rhinosol næsespray 32 mikrogram/dosis.
- Det virksomme indholdstof i Rhinosol er budesonid.
- De øvrige indholdstoffer er: Mikrokrystallinsk cellulose, Natriumcarboxymethylcellulose, Vandfri glukose, Polysorbat 80, Dinatriumedet, Søltsyre (pH-justerings), Renset vand, Kallumsorbat 1,2 mg per ml.

Markedsføring i Danmark:

AstraZeneca A/S
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tlf: 43 66 64 62
Fax: 43 66 61 00
E-mail: med.info@astrazeneca.com

Frøemstiller:

AstraZeneca AB
Sodertälje
Sverige

1. Virkning og anvendelse

- Rhinosol næsespray er en vandig opløsning.
- Rhinosol indeholder et hormon, som forhindrer hævelse og irritation i næsen på grund af allergi (køle, tilstoppet og/eller løbende næse).
- Du skal bruge Rhinosol næsespray lokalt i næsen til forebyggelse af hefeber.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Vigtig information, som du skal læse, før du bruger Rhinosol

- Brug ikke Rhinosol hvis:

Du er overfølsom over for budesonid eller et eller flere af de øvrige indholdstoffer.

- Særlige forholdsregler

Fortæl din læge, hvis du har eller har haft lungetuberkulose.

Du må ikke anvende Rhinosol i længere tid end 3 måneder. Inden længere behandling bør du kontakte din læge.

- Vigtig information om nogle af øvrige indholdstoffer i Rhinosol

Kallumsorbat kan give husudslæt.

- Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet: Hvis du er gravid, skal du rådføre dig med din læge, inden du bruger Rhinosol.

Advarsel: Du kan bruge Rhinosol, selvom du ammer.

- Trafik- og arbejdssikkerhed

Rhinosol næsespray påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

- Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

3. Sådan skal du bruge Rhinosol

- Dosering

Voksne: 2 pust i hvert næsebor 2 gange dagligt. Når effekten er opnået, kan du prøve at nøjes med et pust i hvert næsebor 2 gange dagligt.

Børn under 15 år: Du bør kun bruge Rhinosol til børn under 15 år efter lægens anvisning.

Dosis for børn mellem 6 og 15 år er som for voksne.

For børn under 6 år skal lægen angive en dosering.


Du får først fuld virkning efter nogle dages brug. I sjældne tilfælde kan der gå op til to uger.

Du bør starte forebyggende behandling af din hefeber, inden pollensæsonen begynder.

- Brugsanvisning:

Inden du bruger Rhinosol sprayer første gang, skal du ryste flasken og pumpe 5-10 gange i luften, indtil den afgiver forstøvet væske. Hvis du ikke bruger Rhinosol dagligt, skal du først pumpe en enkelt gang i luften.

Gør derefter følgende:



1. Puds næsen. Ryst flasken. Fjern den brune plastikhætte.
2. Hold næsespræyeren som vist på tegningen.
3. Hold hovedet oprejst. Læg ikke hovedet bagover. Spray én gang i hvert næsebor, mens du lukker det andet med en finger. Træk samtidig vejret normalt ind gennem næsen.
4. Sæt den brune plastikhætte på flasken igen.

Børn: Børn kan have brug for hjælp, når de skal bruge Rhinosol næsespray.

- Rengøring:

Gør plastikdelene rene med passende mellemrum. Tag den brune plastikhætte og den hvide næsespids af. Skyl begge dele i lunkent vand. Lad plastikdelene lufttørre og sæt dem på plads igen. Opbevar flasken stående.

- Har du brugt for meget Rhinosol?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Rhinosol, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Der er dog ingen risiko forbundet ved at bruge for meget Rhinosol næsespray en enkelt gang.

- Har du glemt at bruge Rhinosol?

Du skal ikke tage en ekstra dosis, men blot fortsætte med den planlagte dosering. Tag aldrig dobbelt dosis.

6. Bivirkninger

Rhinosol kan som al anden medicin give bivirkninger.

- Alvorlige bivirkninger:

Ikke almindelige bivirkninger (optræder hos mellem 1 og 10 ud af 1000 behandlede): Hævelse i mund og svelg. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Meget sjældne bivirkninger (optræder hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): Dannelse af hul i næseskilevæggen. Søg læge.

- Ikke alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger (optræder hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): Irritation i næsen i form af tørhed og rysen umiddelbart efter brugen, samt næseblod.

Ikke almindelige bivirkninger (optræder hos mellem 1 og 10 ud af 1000 behandlede): Hudreaktioner i form af nældfeber, udslæt, kløe og betændelselignende tilstande.

Meget sjældne bivirkninger (optræder hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): Sårdannelse i næsen.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: <http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>

5. Opbevaring

- Opbevar Rhinosol utilgængeligt for børn.

- Anvend ikke Rhinosol efter den udløbsdato, der er anført på pakningen.

6. Yderligere information

Aflever altid eventuelle medicinrester på apoteket.

Revideret februar 2004.

AstraZeneca