

Pulmicort® 200 mikrog/dosis inhalationsspray, suspension budesonid

1250515903

Pulmicort® svarer til lægemidlet Spirocort®
Pulmicort® er et registreret varemærke, som tilhører
AstraZeneca AB

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen

- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
- Lægen har ordineret Pulmicort® til Dem personligt. Lad derfor være med at give Pulmicort® til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer som De har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Pulmicort®
3. Sådan skal De bruge Pulmicort®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Pulmicort® indeholder drivgas, som forstøver væsken til meget små, inhalerbare dråber.

Pulmicort® indeholder et binyrebarkhormon, der hæmmer slimdannelse og hævelse i luftvejene. Luften kan lettere passere, og det bliver nemmere at trække vejret. Når De inhalerer Pulmicort® inhalationsspray, følger medicinen med ned i lungerne.

De kan bruge Pulmicort® til at forebygge astma. Pulmicort® er en forebyggende behandling og virker ikke på et pludseligt astmaanfald. De skal bruge Pulmicort® regelmæssigt, også når De ikke har symptomer.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT BRUGE Pulmicort®

Tag ikke Pulmicort® hvis:

- De er overfølsom overfor budesonid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Pulmicort®.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Pulmicort®

Kontakt Deres læge, hvis:

- Deres astma blusser op eller Deres forbrug af anfaldsmedicin stiger.

De skal stadig bruge Deres hurtigtvirkende bronkieudvidende medicin til akutte anfald. Her kan De ikke bruge Pulmicort®. Hav derfor altid den hurtigtvirkende medicin på Dem.

Hvis De skal afbryde behandlingen, skal De nedtrappe dosis gradvist. Tal med lægen.

Hvis Deres barn får Pulmicort®, skal De sørge for, at Deres barn dyrker motion og får en tilstrækkelig stor mængde kalk i kosten, evt. som kosttilskud.

Hvis Deres barn får Pulmicort® i længere tid, skal barnets højde måles jævnligt.

Hvis De, som voksen, tager Pulmicort®, skal De tale med Deres læge om, hvordan De sikrer, at De får tilstrækkeligt med kalk og D-vitamin.

Hvis De tager Pulmicort® i mere end 5 år, skal De tale med Deres læge om kontrol af Deres knogler med en skanning.

Husk at fortælle lægen, at De bruger Pulmicort®, hvis De skal i narkose.

Brug af anden medicin

Hvis De får Pulmicort® samtidig med binyrebarkhormon i tabletform eller som næsespray, skal De tale med Deres læge.

Tal med lægen, hvis De får medicin mod svampeinfektioner (ketoconazol).

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis De er gravid, må De kun bruge Pulmicort® efter lægens anvisning.

Amning

De kan amme, selv om De bruger Pulmicort®.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pulmicort® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. SÅDAN SKAL DE BRUGE Pulmicort® Voksne

Startdosis: Op til 4 pust (800 mikrog) 2 gange daglig.
Vedligeholdelsesdosis: 1 pust (200 mikrog) 2 gange daglig.

Børn fra 2 år

Startdosis: Op til 2 pust (400 mikrog) i døgnet fordelt på 2 doser.

Til børn anbefales det at anvende Pulmicort® inhalationsspray sammen med en spacer. Til mindre børn bør der ligeledes bruges ansigtsmaske. Tal med lægen eller spørg på apoteket.

Dosering 2 gange daglig (morgen og aften) er sædvanligvis tilstrækkeligt.

Vigtigt:

Det er muligt, at De får det bedre allerede efter den første dosis Pulmicort® inhalationsspray. Der kan dog godt gå flere uger, før De har fuld effekt. De skal blive ved med at tage medicinen, også i perioder hvor De har det godt.

Brugsanvisning:

1. Fjern beskyttelseshætten.
2. Ryst beholderen omhyggeligt.
3. Luk læberne tæt om mundstykket.
4. Ånd roligt ud gennem mundstykket.
5. Tag en langsom indånding samtidig med, at De udløser dosis ved at trykke på sprayen.
6. Hold vejret så længe som muligt, helst i 10 sekunder, efter indånding af dosis.
7. Det er vigtigt, at indånding og afgivning af dosis foregår samtidigt, ellers kan virkningen udeblive.
8. Skyl munden med vand efter brug af sprayen og spyt ud.
9. Opbevar beholderen med ventilen nedad.

Brug altid Pulmicort® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl så spørg lægen eller apoteket. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.

Hvis De har brugt for meget Pulmicort® inhalationsspray

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Pulmicort®, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet. Symptomer på overdosering er hæmning af binyrebarkfunktionen.

Hvis De har glemt at bruge Pulmicort®

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis, men skal fortsætte med Deres sædvanlige dosering.

Hvis De holder op med at bruge Pulmicort®

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, De er i tvivl om eller føler Dem usikker på. Ændring eller stop med behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

4. BIVIRKNINGER

Pulmicort® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 10.000 patienter): Overfølsomhedsreaktioner som pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær, hævelse af ansigt, læber og hals, besvimelse. Kan være livsfarligt. Ring 112. Åndedrætsbesvær lige efter brug af sprayen. Kontakt lægen.

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): Undertrykkelse af binyrebarkens funktion, grå stær, grøn stær (øget tryk i øjet, det viser sig ved øjensmerter, nedsat syn, ringe omkring lyse genstande), knogleskørhed. Kontakt læge eller sygehus, ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 100 patienter): Hæshed, hoste, irritation i svelget og svamp i mund og svælg (skyl munden eller børst tænder

der lige efter, De har taget medicinen, for at undgå det). De kan blive behandlet for svamp i munden hurtigt og samtidig med at De bruger Pulmicort®. Tal med lægen.

Sjældne bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 10.000 patienter): Kvalme, adfærdsforstyrrelser, nervøsitet, rastløshed, nældefeber, eksem, udslæt, kløe, mindre blødninger i huden og tynd hud, der let går i stykker. Depression. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): Væksthæmning hos børn og unge.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Fortæl læge eller apotek, hvis De får bivirkninger, der bliver ved eller er generende. Nogle bivirkninger kræver behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

- Opbevar Pulmicort® utilgængeligt for børn.
- Må ikke opbevares over 30° C.
- Beholderen bør opbevares med ventilen nedad.
- Brug ikke Pulmicort®, efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
- Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Pulmicort® 200 mikrog/dosis inhalationsspray, suspension, indeholder:

- Aktivt stof: Budesonid 200 mikrog/dosis.
- Øvrige indholdsstoffer: Magnesiumstearat, norfluran (HFA 134a).

Pulmicort®'s udseende og pakningsstørrelse:

Pulmicort® 200 mikrog/dosis inhalationsspray, suspension, består af en aerosolbeholder samt en brun holder med hvidt mundstykke. Mundstykket dækkes af en grå beskyttelseshætte.

Pulmicort® findes i en pakningsstørrelse med 120 doser.

Indehaver af markedsføringstilladelsen i Danmark:

Paranova Danmark A/S
Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Ompakket og frigivet:

Paranova Pack A/S
Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Denne indlægsseddel blev senest revideret januar 2009