

Betnovat® med chionoform 1 mg/g + 30 mg/g creme

Betamethason + clioquinol

1726505907

Betnovat® med chionoform er et registreret varemærke, som tilhører Glaxo Group Limited.

Læs denne indlægsseddel grundigt, før De begynder at bruge medicinen

- Gem indlægssedlen, De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere De vil vide.
- Lægen har ordineret Betnovat® med chionoform til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Opsigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Betnovat® med chionoform
3. Sådan skal De bruge Betnovat® med chionoform
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Betnovat® med chionoform indeholder et stærkt binyrebarkhormon, der dæmper hævelse og irritation. Chionoform virker desinficerende og hæmmer vækst af bakterier og svampe.

De kan bruge Betnovat® med chionoform til behandling af udslæt, eksem og psoriasis, når huden også er betændt.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT BRUGE BETNOVAT® MED CHINOFORM

Brug ikke Betnovat® med chionoform hvis:

- De er overfølsom over for betamethason, clioquinol, iod eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Betnovat® med chionoform.
- De ikke har udslæt, eksem eller psoriasis, selvom der er betændelse i huden.

Brug ikke Betnovat® med chionoform mod:

- En betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet, som viser sig ved rødme, især på hagen, næsen, på kinderne og i panden (rosacea).
- Irritation eller betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit).
- Bumsen eller på områder med bumsen.
- Sygdomme på huden, der skyldes virus (f.eks. forkølelssår og skoldkopper).
- Hudsygdomme hos børn under 1 år, f.eks. eksem eller ble-eksem.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Betnovat® med chionoform

- De bør ikke bruge Betnovat® med chionoform i længere tid end aftalt med lægen. Det gælder især ved behandling af børn.

- De bør undgå lang tids brug på store hudområder og på den sarte hud i ansigt, armhuler, lysken, ved endetarmsåbning og på kønsdele.
- Ved behandling af store hudområder gennem længere tid, specielt hos børn og ved behandling under forbindelse, er der øget risiko for bivirkninger.
- De bør ikke bruge tætsluttende og lufttæt forbindelse eller plaster, hvis der er betændelse i huden.
- Kontakt lægen, hvis der kommer irritation. Behandlingen skal muligvis ophøre.
- Hvis De ikke har fået det bedre i løbet af få dage, eller hvis De har fået det værre, skal De kontakte lægen.
- De bør ikke bruge Betnovat® med chionoform rundt om øjnene.
- Undgå at få Betnovat® med chionoform i øjnene.
- Hvis De har brugt Betnovat® med chionoform i lang tid, må De ikke stoppe behandlingen pludseligt, da det kan forværre Deres hudsygdom. Tal med lægen om langsom aftrapning af behandlingen.
- Deres binyrers dannelse af hormoner kan blive nedsat, når De bruger Betnovat® med chionoform i lang tid. Fortæl lægen, at De bruger Betnovat® med chionoform, hvis De er kommet alvorligt til skade, har en svær betændelse (f.eks. lungebetændelse) eller skal opereres.
- Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at De er i behandling med Betnovat® med chionoform.

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

De kan bruge Betnovat® med chionoform sammen med anden medicin.

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De tager nogen form for medicin.

Graviditet:

De må kun bruge Betnovat® med chionoform efter lægens anvisning.

Amning:

De kan bruge Betnovat® med chionoform i kort tid, selv om De ammer. Spørg lægen.

De bør ikke bruge Betnovat® med chionoform på brystet, mens De ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Betnovat® med chionoform påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Betnovat® med chionoform, creme

Betnovat® med chionoform creme indeholder chlorcresol, der kan medføre allergiske reaktioner.

Betnovat® med chionoform creme indeholder cetostearylalkohol, der kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem).

3. SÅDAN SKAL DE BRUGE BETNOVAT® MED CHINOFORM

Dosering

Voksne: Påsmør et tyndt lag 1-3 gange dagligt.

Børn: De må kun bruge Betnovat® med chionoform til børn efter lægens anvisning.

Undgå at få Betnovat® med chionoform i øjnene. Vask hænder efter brug, med mindre De skal behandle hænderne.

Vær opmærksom på, at Betnovat® med chionoform kan misfarve hud, hår og tøj.

Brug altid Betnovat® med chionoform nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Hvis De har brugt for meget Betnovat® med chionoform creme

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har brugt mere Betnovat® med chionoform, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas. Tag pakningen med.

I sjældne tilfælde med langvarig eller overdreven brug kan De få rødt, rundt "måneansigt", tørst pga. sukkersyge, hovedpine pga. for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken. Kontakt lægen.

Hvis De har glemt at bruge Betnovat® med chionoform

Hvis De har glemt en dosis skal De ikke bruge dobbelt dosis, men fortsætte med Deres sædvanlige dosering.

4. BIVIRKNINGER

Betnovat® med chionoform kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkninger kommer især hvis De bruger lufttæt forbindelse og ved lang tids behandling.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Træthed, svækket modstandskraft pga. nedsat eller hæmmet funktion af binyrebarken. Kontakt lægen.
- Rødt, rundt "måneansigt", tørst pga. sukkersyge, hovedpine pga. for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken. Kontakt lægen.
- Psoriasis med pusfyldte knopper på hænder og fødder eller over hele kroppen. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 100 patienter):

- Brændende fornemmelse, kløe.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 1.000 patienter):

- Betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme og evt. små knopper eller bumser.
- Små punktformede eller større blødninger i huden pga. bristede blodkar.

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Tynd hud, som let går i stykker, strækmærker, hvide eller brune pletter på huden (pigmentforandringer), tydelige små blodkar i huden.
- Øget behåring hos kvinder, evt. skægvekst/tynde bløde hår i ansigt, på krop samt arme og ben.
- Allergisk kontakteksem, overfølsomhed.
- Forværring af hudsygdom ved ophør af behandlingen.
- Forværring af symptomer.

Bivirkninger, hvor hyppighed ikke er kendt:

- Ny betændelse i det behandlede område, sløring af betændelse i huden, forværring af betændelse i huden.
- Irritation eller betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit), udslett med små væskefyldte blærer pga. stærk sved eller feber.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. De eller Deres pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.melden-bivirkning.dk

5. OPBEVARING

- De kan opbevare Betnovat® med chionoform ved almindelig temperatur.
- Opbevar Betnovat® med chionoform utilgængeligt for børn.
- Brug ikke Betnovat® med chionoform efter den udløbsdato, der står på pakningen.
- Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Betnovat® med chionoform indeholder:

- Aktive stoffer: Bethametason 1 mg/g som bethametasonvalerat og clioquinol 30 mg/g.
- Øvrige indholdsstoffer: Chlorcresol, cetomacrogol 1000, cetostearylalkohol, hvid blid paraffin, paraffinolie, natriumdi-hydrogenfosfat, phosphorsyre eller natriumhydroxid (surhedsregulerende) og rensat vand.

Pakningsstørrelser:

Betnovat® med chionoform findes i pakningsstørrelserne 25 g og 50 g. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S
Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Ompakket og frigivet af:

Paranova Pack A/S
Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Senest revideret november 2006