

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Mestinon 60 mg overtrukne tabletter Mestinon 10 mg tabletter

Pyridostigminbromid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
- Lægen har ordineret Mestinon til Dem personligt. Lad derfor være med at give Mestinon til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Mestinons virkning og hvad De skal bruge det til
2. Det skal De vide, før De begynder at tage Mestinon
3. Sådan skal De tage Mestinon
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer De Mestinon
6. Yderligere oplysninger

1. MESTINONS VIRKNING OG HVAD DE SKAL BRUGE DET TIL

Mestinon hæmmer nedbrydningen af signalsubstansen acetylcholin, som formidler nerveimpulser til musklerne. Mestinon hjælper hjernens meddelelser til lettere at nå igennem til musklerne.

De kan bruge Mestinon til behandling af myasthenia gravis (alvorlig muskelsvaghed).

De kan også bruge Mestinon til behandling af slaphed af blære- og tarmmuskulatur.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT TAGE MESTINON

Tag ikke Mestinon hvis:

- De er overfølsom (allergisk) over for pyridostigminbromid eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- De har mekanisk tarmslyng
- De har forstoppelse i urinrøret
- De har bughindebetændelse

Vær ekstra forsigtig med at bruge Mestinon

Behandling med Mestinon kræver omhyggelig kontrol hvis De lider af følgende sygdomme.

Tal med Deres læge, hvis De

- har astma
- har epilepsi
- har nedsat nyrefunktion
- har lavt blodtryk
- har en hjertesygdom
- har mekanisk tarmpassagehindring
- har urinrørs-passagehindring

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Anden medicin kan påvirke virkningen af Mestinon og Mestinon kan påvirke virkningen af anden medicin. Hvis De ønsker oplysninger herom, så spørg lægen eller apoteket. Fortæl altid Deres læge, hvis De ændrer mængde af en hvilken som helst anden medicin, De anvender.

Tal med Deres læge, hvis De tager:

- medicin som udvider pupillen (atropin)
- muskelafslappende medicin (suxamethon)
- betablokkere, da langsom hjertevirksomhed og lavt blodtryk kan forekomme
- antihistaminer

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De tager nogen form for medicin.

Graviditet:

Hvis De er gravid, må De kun tage Mestinon efter aftale med lægen. Erfaring for anvendelse af Mestinon under graviditet er ringe.

Tal med Deres læge, hvis De mener, De er gravid, eller hvis De planlægger at blive gravid.

Amning:

Hvis De ammer, må De kun bruge Mestinon efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Mestinon kan give bivirkninger (lavt blodtryk, svimmelhed og tågesyn), der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Mestinon

Mestinon 60 mg overtrukne tabletter indeholder saccharose.

Mestinon, 10 mg tabletter indeholder lactose.

Kontakt lægen, før De tager Mestinon, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DE TAGE MESTINON

Tag altid Mestinon nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller apoteket.

Den sædvanlige dosis er:

Myasthenia gravis:

Voksne:

60-180 mg 2-4 gange daglig. Dette svarer til 1-3 tabletter på 60 mg eller 6-18 tabletter på 10 mg 2-4 gange daglig.

Slaphed af blære- og tarmmuskulatur

Voksne:

60 mg hver 4. time. Dette svarer til 1 tablet på 60 mg eller 6 tabletter på 10 mg.

Hvis De har taget for mange Mestinon tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget flere Mestinon, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas. Tag pakningen med. Symptomer på overdosering kan være kraftigt spytflåd, øget tåreflåd, rastløshed, øget svedtendens, koliksmarter, kvalme, opkastning, diaré, muskeltræknings, tiltagende muskellammelse. Desuden ved meget høje doser: Kramper i luftrørets muskulatur (bronkospasme), åndenød, kramper, koma, åndedrætsbesvær og hjertebesvær.

Hvis De har glemt at tage Mestion

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om eller føler Dem usikker på.

4. BIVIRKNINGER

Mestion kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige - meget almindelige bivirkninger (de forekommer hos flere end 1 ud af 100 patienter):

- Langsom hjerterevirksomhed, men hos visse patienter kan øget hjerterevirksomhed forekomme. Kontakt straks læge eller skadestue.
- Kramper i luftvejenes muskulatur (bronkospasme) med øget slimproduktion, som kan forårsage åndedrætsbesvær. Kontakt straks læge eller skadestue.
- Muskellammelse. Kontakt straks læge eller skadestue.

Meget sjældne bivirkninger (de forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Hæmning eller afbrydelse af impulserne fra hjertets forkamre (AV-blok). Kontakt straks læge eller skadestue

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige - meget almindelige bivirkninger (de forekommer hos flere end 1 ud af 100 patienter):

- Små rykninger i små muskler oftest på tunge, arme eller hænder.
- Små pupiller, øget tåreflåd, tågesyn, bindhindebetændelse.
- Koliksmarter, diaré, kvalme, opkastninger, smerter i den øvre del af maven, øgede muskelsammentrækninger i mave og tarm (øget peristaltik), øget spytflåd.
- Inkontinens.
- Øget svedtendens.
- Muskelsvaghed, muskelkramper.
- Appetitløshed.
- Tilstoppet eller løbende næse (rinit).

Ikke almindelige bivirkninger (de forekommer hos flere end 1 ud af 1.000, men færre end 1 ud af 100 patienter):

- Svimmelhed.
- Højt eller lavt blodtryk.
- Rastløshed, søvnløshed.

Sjældne bivirkninger (de forekommer hos flere end 1 ud af 10.000, men færre end 1 ud af 1.000 patienter):

- Hududslæt, hårtab ved langtidsbrug.

Meget sjældne bivirkninger (de forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Nældefeber.

Mestion kan være vanedannende.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Nye bivirkninger bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. De eller Deres pårørende kan også selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted:

www.meldenbivirkning.dk

5. SÅDAN OPBEVARER DE MESTINON

Opbevares utilgængeligt for børn.

Mestinon 60 mg overtrukne tabletter må ikke opbevares over 25 °C.

Mestinon 10 mg tabletter kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Brug ikke Mestinon efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Mestinon indeholder:

- Aktivt indholdsstof: pyridostigminbromid
- Øvrige indholdstoffer:
 - *Mestinon 60 mg overtrukne tabletter*: Silica kolloid vandfri; stivelse, pregelatineret; povidon; majstivelse; talcum; magnesiumstearat; saccharose; risstivelse; akaciegummi spraytørret; jernoxid gul (E172); jernoxid rød (E172); paraffin; paraffinolie, tynd.
 - *Mestinon 10 mg tabletter*: Majsstivelse; silica, kolloid vandfri; stivelse, pregelatineret; talcum; lactose; magnesiumstearat.

Mestinons udseende og pakningsstørrelse

Mestinon 60 mg er orange runde filmovertukne tabletter i tabletbeholder af glas.

Mestinon 10 mg er hvide runde tabletter i tabletbeholder af glas.

Pakningsstørrelse:

Mestinon 60 mg overtrukne tabletter: 150 tabletter.

Mestinon 10 mg tabletter: 250 tabletter.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Meda AS

Solvang 8

3450 Allerød

Tlf.: 44 52 88 88

Fax.: 44 52 88 99

e-mail: info.dk@meda.se

Fremstiller:

Tabletter 10 mg:

Labiana Pharmaceuticals, SL.

Casanova 27-31

08757 Corbera de Llobregat, Barcelona

Spanien

Tabletter 10 mg og 60 mg:

ICN Polfa Rzeszów S.A.

ul. Przemysłowa 2

35-959 Rzeszów

Polen

Denne indlægsseddel blev senest revideret april 2009