

Indlægsseddel

Kan Jang tabletter

Ekstrakt af russisk rod (*Eleutherococcus senticosus*) og ekstrakt af *Andrographis paniculata*

Læs denne indlægsseddel godt igennem før du begynder at tage Kan Jang

- Kan Jang er et naturlægemiddel, som du kan få uden recept. For at få den bedste virkning, skal du altid følge vejledningen i indlægssedlen.
- Gem indlægssedlen. Du får måske brug for at læse den igen.
- Ønsker du mere information, så kontakt apotek eller læge.
- Kontakt din læge, hvis du får det værre.

1. Virkning og anvendelse

- Du kan tage Kan Jang, hvis du er forkølet, hvis du er træt, eller for at komme til kræfter hvis du har været syg.

Hvis din læge har sagt, at du skal tage Kan Jang for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.

2. Vigtig information som du skal læse, før du tager Kan Jang

Tag ikke Kan Jang, hvis du er overfølsom over for russisk rod, over for *Andrographis paniculata* eller over for et eller flere af hjælpestofferne i Kan Jang tabletter.

Særlige forholdsregler

I nogle tilfælde skal du måske være særlig forsigtig med at tage Kan Jang. Tal med din læge hvis du har

- forhøjet blodtryk.
- nedsat leverfunktion.
- nedsat nyrefunktion.
- anden alvorligere sygdom.

Du må ikke tage Kan Jang i mere end 2-3 måneder.

Brug af Kan Jang sammen med mad og drikke

Der er ikke kendskab til problemer med brug af Kan Jang sammen med mad og drikke.

Vigtig information om nogle af hjælpestofferne i Kan Jang

Kan Jang indeholder lactose. Kontakt din læge før du tager tabletterne, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Kan Jang indeholder methylparahydroxybenzoat, der kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen).

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du tager nogen form for medicin.

- Graviditet: Du må kun tage Kan Jang efter aftale med din læge.
- Amning: Du må kun tage Kan Jang efter aftale med din læge.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kan Jang påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Brug af anden medicin

- Anden medicin kan måske påvirke behandlingen med Kan Jang, eller Kan Jang kan påvirke behandlingen med anden medicin. Du skal derfor altid tale med apotek eller læge, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, andre naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.
- Der er i øjeblikket ikke kendskab til problemer med brug af Kan Jang sammen med andre lægemidler eller naturlægemidler.

3. Sådan skal du tage Kan Jang

Hvis din læge har sagt, at du skal tage en anden dosis, skal du følge lægens anvisning.

Dosering

Voksne: Du skal tage 4-5 tabletter 3 gange dagligt.

Du må ikke tage Kan Jang i mere end 2-3 måneder.

Børn: Du må kun bruge Kan Jang til børn under 12 år efter aftale med en læge.

Har du taget for mange Kan Jang tabletter?

Kontakt læge, skadestue eller apotek, hvis du har taget flere Kan Jang tabletter, end der står her, og du føler dig utilpas.

Hvis du har taget for mange tabletter, kan dit blodtryk stige. Det kan medføre hovedpine, indre uro og hjertebanken.

Har du glemt at tage Kan Jang?

Du må ikke tage dobbelt dosis som erstatning for en glemt dosis.

4. Bivirkninger

Kan Jang kan som al anden medicin give bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter)

- Uregelmæssig hjerterytme, hvis du i forvejen lider af forhøjet blodtryk. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

- Søvnløshed. Hyppigheden er ikke kendt.

Sjældne til meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 1.000 patienter)

- Allergiske reaktioner fra huden, f.eks. kløe eller udslæt.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter)

- Blodtryksstigning, hvis du i forvejen lider af forhøjet blodtryk. Forhøjet blodtryk kan give hovedpine, indre uro og hjertebanken.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: <http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>.

5. Opbevaring

- Opbevar Kan Jang utilgængeligt for børn.
- Opbevar Kan Jang ved højst 25 °C.
- Brug ikke Kan Jang efter den udløbsdato, som står på pakningen.
- Aflever altid medicinrester på apoteket.

6. Yderligere oplysninger

Kan Jang tabletter indeholder

Aktive stoffer: 1 tablet indeholder:

- 33-55 mg ekstrakt (som tørrestrakt) af *Andrographis paniculata* (Burm.fil.) Wall ex Nees, herba (kariyat, urt) svarende til 5 mg total andrographolider (SHA-10).
- 5,7 mg ekstrakt (som tørrestrakt) af *Eleutherococcus senticosus* (Rupr. Et Maxim.) Maxim., svarende til ca. 120 mg tørret Russisk Rod.

Hjælpestoffer: Kartoffelstivelse, Lactosmonohydrat, Maltodextrin (blanding af glucose, di- og polysaccharider), Talcum, Gelatine, Magnesiumstearat, Silica, kolloid, vandfri, Shellac, Methylparahydroxybenzoat (E218), Kaliumsorbat (E202), Macrogol 6000.

Pakningsstørrelser:

Tabletbeholder af brunt glas.

Pakningsstørrelser: 30 stk. og 100 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Svenska Örtmedicinska Institutet AB
Prinsgatan 12
413 05 Göteborg
Sverige

Distributør for Danmark

A/S Anjo
Poppelgårdvej 17
2860 Søborg
Tlf.38191889
E-mail:anjo@anjo.dk

Revideret december 2008