

Klaricid® 500 mg depottabletter

clarithromycin

0940875903

Klaricid® svarer til lægemidlet Klacid® Uno

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen

- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
- Lægen har ordineret Klaricid® til Dem personligt. Lad derfor være med at give Klaricid® til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Klaricid®s virkning og hvad De skal bruge det til
2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Klaricid®
3. Sådan skal De tage Klaricid®
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer De Klaricid®
6. Yderligere oplysninger

1. Klaricid®s virkning og hvad De skal bruge det til

Klaricid® indeholder et antibiotika af typen makrolid.

De kan tage Klaricid® til behandling af:

- betændelse i øvre luftveje (f.eks. bihulebetændelse og halsbetændelse).
- betændelse i de nedre luftveje (f.eks. lungebetændelse og bronkitis).
- De kan også få Klaricid® til behandling af betændelse i sår og i huden (f.eks. betændelse i hårsække og bindevæv) samt mod rosen.

Lægen kan have givet Dem Klaricid® til anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Klaricid®

Tag ikke Klaricid®:

- hvis De er overfølsom over for clarithromycin, andre antibiotika af samme type (makrolid), eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- hvis De samtidig tager medicin mod:
 - migræne (ergotamin, dihydroergotamin).
 - mod sygdomme i mavesækken (cisaprid).
 - skizofreni og andre sindslidelser (pimozid).
 - allergi (terfenadin).
- hvis De har en alvorlig nyresygdom. Spørg lægen.
- hvis De har for lavt indhold af kalium (salt) i blodet. Det kan ske, hvis De f.eks. tager vanddrivende medicin.

Vær ekstra forsigtig med at tage Klaricid®

Tal med lægen, inden De tager Klaricid®, hvis De:

- har dårlig lever.
- har dårlige nyrer.
- tager anden antibiotika af typen makrolider samt lincomycin eller clindamycin.
- tager medicin mod urinsur gigt (colchicin).

Kontakt straks lægen, hvis De:

- får langvarig, evt. blodig diaré under behandlingen. Det kan være alvorligt og kræve behandling.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at De er i behandling med Klaricid®. Det kan påvirke prøveresultaterne.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Tal med Deres læge, hvis De tager:

- medicin mod sygdomme i spiserøret eller mavesækken (cisaprid).
- medicin mod skizofreni eller andre sindslidelser (pimozid, ziprasidon).
- medicin mod allergi (terfenadin).
- medicin mod migræne (ergotamin, dihydroergotamin, eletriptan).
- medicin mod svamp (fluconazol, itraconazol).
- medicin mod HIV (ritonavir, zidovudin, atazanavir, saquinavir, efavirenz, nevirapine, zidovudin).
- medicin mod tuberkulose (rifampicin, rifabutin).
- medicin mod epilepsi (carbamazepin, phenytoin, valproat).
- medicin mod forstyrrelser i hjerterytmen (digoxin, kinidin, disopyramid).
- medicin mod for højt kolesterol (statiner, f.eks. lovastatin, simvastatin).
- blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin).
- medicin mod impotens (sildenafil, tadalafil, vardenafile).
- medicin mod astma (theofyllin).
- medicin mod hyppig vandladning (tolterodin).
- medicin mod angst og uro (f.eks. alprazolam, midazolam).
- sovemedicin (f.eks. triazolam).
- medicin mod mavesår og for meget mavesyre (omeprazol).
- forebyggende medicin mod opkastning og kvalme (aprepitant).
- medicin som hæmmer immunforsvaret, i forbindelse med transplantationer (ciclosporin, tacrolimus).
- binyrebarkhormon (prednison, methylprednisolon).
- medicin mod kræft (vinblastin).
- medicin mod urinsur gigt (colchicin).

Kontakt lægen. Det kan være nødvendigt at ændre dosis.

Anden medicin kan påvirke behandlingen med Klaricid® eller Klaricid® kan påvirke behandlingen med anden medicin. Spørg lægen eller apoteket, hvis De ønsker flere oplysninger herom.

Brug af Klaricid® sammen med mad og drikke

De skal tage Klaricid® i forbindelse med et måltid. De skal tage Klaricid med et glas vand.

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apoteket til råds før De tager nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis De er gravid, må De kun tage Klaricid® efter aftale med lægen.

Amning

De må normalt ikke tage Klaricid®, hvis De ammer. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdsikkerhed

Klaricid® kan hos enkelte give bivirkninger (f.eks. døsighed), som kan påvirke arbejdsikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Klaricid®

Klaricid® indeholder lactose. Kontakt lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal De bruge Klaricid® depottabletter

Tag altid Klaricid® nøjagtig efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

De skal tage tabletterne i forbindelse med et måltid og på samme tidspunkt hver dag. De skal synke tabletterne hele.

Voksne og børn over 12 år: Den sædvanlige dosis er 1 depottablet på 500 mg 1 gang daglig i 6-14 dage. Ved svære infektioner kan Deres læge øge dosis til 2 depottabletter på 500 mg (i alt 1000 mg) 1 gang daglig. Følg lægens anvisning.

Børn under 12 år: De kan normalt ikke bruge Klaricid® 500 mg depottabletter til børn under 12 år. Tal med lægen.

Nedsat nyrefunktion: De må ikke tage Klaricid® depottabletter, hvis Deres nyrefunktion er alvorligt nedsat. Tal med lægen.

Nedsat leverfunktion: Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis De har taget for mange Klaricid® depottabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget flere Klaricid®, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas. De kan få mavetarm-problemer.

Hvis De har glemt at tage Klaricid®

De skal tage den glemte dosis så snart, De kommer i tanke om det og fortsætte som hidtil. De må ikke tage dobbelt dosis som erstatning for den glemte.

Hvis De holder op med at tage Klaricid®

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om eller føler Dem usikker på.

4. Bivirkninger

Klaricid® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Blodig opkastning og/eller sort afføring på grund af blødning i mave og tarm. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt straks læge.
- Leverbetændelse, gulsot evt. hudkløe. Kontakt læge eller skadestue.

Hyppigheden er ikke kendt

- Pludselige overfølsomhedsreaktioner (inden for minutter til timer), f.eks. hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (anafylaktiske reaktioner). Det kan være livsfarligt. Ring 112.
- Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Forstyrrelser i hjerterytmen med hurtig evt. uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue.
- Betændelse i bugspytkirtlen med voldsomme mavesmerter og feber. Kontakt straks læge eller skadestue.
- Kraftig afskalning og afstødning af huden. Kontakt straks læge eller skadestue.
- Leversvigt med gulsot, sløjhed evt. bevidstløshed. Kontakt læge eller skadestue.
- Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber og ledproblemer. Kontakt læge eller skadestue.
- Nyrebetændelse med smerter, feber og blod i urinen. Kontakt læge eller skadestue.
- Langvarig evt. blodig diaré med mavesmerter eller feber, som kan være tegn på tarmbetændelse (pseudomembranøs colitis). Kontakt læge.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Smagsforstyrrelse.
- Mavesmerter, diaré, fordøjelsesbesvær, kvalme.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Træthed og bleghed pga. blodmangel. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
- Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis De får feber, skal De straks kontakte læge.
- Kramper i hænderne, prikken i hænder og fødder og muskelsvaghed pga. for lavt kalkindhold i blodet. Kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
- Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
- Astma, åndenød, lungelidelser. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
- Blod i urinen. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.

- Søvnløshed, nervøsitet, døsigthed, svimmelhed, hovedpine, rysten.
- Svampeinfektion i mund og svælg.
- Svampeinfektion i skeden, betændelse i skeden.
- Snue.
- Udslæt med pus.
- Øget appetit, appetitmangel.
- Øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd, synsforstyrrelser.
- Øreidelser, ringen for ørerne (tinnitus).
- Hedestigninger, ansigtsrødmme.
- Mavebesvær som oppustet mave, forstoppelse, mundtørhed, opstød, luftafgang fra tarmen, opkastning.
- Betændelse i munden, misfarvning af tungen.
- Tør hud, eksem, kraftig sveden, kløe, udslæt, nældefeber.
- Rygsmerter.
- Udflåd fra kønsorganerne.
- Kraftesløshed og svaghed.
- Smerter i brystkassen, væskeophobning i ansigt, utilpashed, smerter, tørst.

Hyppigheden er ikke kendt

- Mathed, koldsved, sult, forvirring, evt. bevidstløshed og kramper pga. for lavt blodsukker (blodglukose). Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
- Ændring af personlighed. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
- Hallucinationer. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
- Overfølsomhedsreaktioner.
- Unormale drømme, ængstelse, forvirring, desorientering.
- Søvnløshed, sindslidelser.
- Forstyrrelse i lugtesans.
- Døvhed.
- Betændelse i tungen, misfarvning af tænderne.
- Udslæt, nældefeber.
- Udvikling af en ny betændelse (superinfektion).

Klaricid® kan herudover give bivirkninger, som De normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver og urinprøver, pga. påvirkning af lever, nyrer eller forandringer i blodet.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Fortæl læge eller apotek, hvis De får bivirkninger, der bliver ved eller er generende. Nogle bivirkninger kræver behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemedelstyrelsen. De finder skema og vejledning på Lægemedelstyrelsens netsted: <http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>

5. Sådan opbevarer De Klaricid®

Opbevar Klaricid® utilgængeligt for børn. Opbevar ikke Klaricid® ved temperaturer over 30° C. Opbevar Klaricid® i original emballage, da det er følsomt for lys.

Brug ikke Klaricid® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Afløber altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Klaricid® 500 mg depottabletter indeholder: Aktivt stof: Clarithromycin 500 mg. Øvrige indholdsstoffer: Citronsyre, natriumalginat, natriumcalciumalginat, lactose, povidon, talcum, stearinsyre, magnesiumstearat, methylhydroxypropylcellulose, polyethylenglycol 400, macrogol 8000, titandioxid (E 171), sorbinsyre, quinalingult (E 104).

Klaricid®s udseende og pakningsstørrelse Udseende

Klaricid® 500 mg depottabletter er gule aflange tabletter.

Pakningsstørrelse

Klaricid® 500 mg depottabletter: 7 stk.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Paranova Danmark A/S
Industriparken 23-25, 2750 Ballerup

Ompakket og frigivet

Paranova Pack A/S
Industriparken 23-25, 2750 Ballerup

Denne indlægsseddel blev sidst revideret februar 2008