

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Loceryl® 50 mg/g Neglelak, medicinsk Amorolfin

02-2011
P028937-4

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

- Du kan få Loceryl® uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Loceryl®.
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre indenfor 6-12 måneder.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Loceryl®
3. Sådan skal du bruge Loceryl®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Loceryl® er et svampemiddel, som virker mod et bredt spektrum af svampe der kan forårsage neglesvamp.

Loceryl® medicinsk neglelak anvendes til behandling af negleinfektioner forårsaget af amorolfinfølsomme svampe.

Hvis din læge har ordineret Loceryl® til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE LOCERYL®

Brug ikke Loceryl®

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for amorolfin eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Loceryl®

Børn bør ikke behandles med Loceryl® på grund af manglende erfaring.

Brug ikke kunstige negle samtidig med Loceryl® lak, og tal med lægen hvis du ønsker at bruge kosmetisk neglelak under Loceryl® behandlingen. Hvis du arbejder med organiske opløsningsmidler, såsom fortynder, terpentin, benzin, paraffin o. lign. bør du anvende handsker der beskytter lak på fingernegle.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Almindeligvis kan Loceryl® medicinsk neglelak anvendes samtidig med anden medicin.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Loceryl® efter aftale med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du kun tage Loceryl® efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Loceryl® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE LOCERYL®

Brug altid Loceryl® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

De angrebne negle påsmøres med Loceryl® lak 1-2 gange om ugen.

Du må ikke selv ændre på doseringen. Hvis du mener effekten af medicinen er for svag eller for stærk, skal du tale med din læge.

Loceryl® lak må kun påføres neglene. Hvor længe du skal behandles afgøres af din læge. Neglesvamp kan tage lang tid at behandle, og lakken bør anvendes hver uge i flere måneder. Behandlingen bør fortsætte indtil de syge negle er helt udvoksede og helbredte. Det tager normalt op til 6 måneder for fingernegle og 9-12 måneder for tånegle.



1. Fil den angrebne negl grundigt (især negleoverfladen) med en af de medfølgende file. Brug aldrig neglefilen på raske negle.



2. Rens negleoverfladen med en af de medfølgende renseservietter.




3. Dyp en af spatlerne i flasken med lak. Der må ikke tørres lak på kanten af flasken.



4. Påfør lakken på hele overfladen af den angrebne negl med en spatel. Punkt 1-4 udføres for hver angrebet negl.



5. Flasken lukkes tæt umiddelbart efter brug.



6. Lad de behandlede negle tørre i 3-5 minutter.



7. Rens spatlen med den tidligere anvendte renseserviet.

Det er vigtigt at gentage alle ovenstående procedurer hver gang du behandler neglene.

Hvis du har brugt for meget Loceryl® neglelak
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Loceryl® neglelak, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.
Tag pakningen med.

Hvis du har glemt at bruge Loceryl®
Brug aldrig dobbelt mængde, hvis du har glemt en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

4. BIVIRKNINGER

Loceryl® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ikke alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.

- Der er set tilfælde med negleforandringer (f.eks. misfarvning af negle, skadede negle, skøre negle) i forbindelse med behandling med Loceryl®, medicinsk neglelak. Disse reaktioner kan også være sammenkoblet med selve svampeinfektionen.

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.

- I sjældne tilfælde er der set mild og kortvarende kontakteksem (brændende fornemmelse i området omkring den behandlede negl).

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Loceryl® efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Loceryl® 50 mg/g neglelak, medicinsk indeholder:

Aktivt stof: Amorolfen 50 mg/g som amorolfenhydrochlorid.

Øvrige indholdsstoffer: Ammoniummethacrylat copolymer (type A), butylacetat, ethylacetat, ethanol vandfri og triacetin.

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende
Glasflaske.

Pakningsstørrelse

Loceryl® fås i en pakningsstørrelse á 5 ml i glasflaske.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

2care4 ApS
Tømrervej 9
6710 Esbjerg V.

Ompakket og frigivet af

2care4 ApS
Tømrervej 9
6710 Esbjerg V.

Loceryl® er et registreret varemærke, der tilhører Galderma S.A.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret februar 2011