

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indium (In-111) Chloride, radiopharmaceutical precursor

Indium-111 som indiumchlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gern indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Indium (In-111) Chloride
3. Sådan skal du bruge Indium (In-111) Chloride
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Dette lægemiddel er kun til diagnostisk brug.

Indium (In-111) Chloride anvendes under en scanning til at undersøge forskellige dele af kroppen, afhængig af de øvrige, ikke-radioaktive komponenter, der anvendes. Lægen vil forklare dig formålet med dets anvendelse.

Dette lægemiddel indeholder et radioaktivt stof som, når det blandes med den anden komponent og indgives, samler sig i visse organer.

Det radioaktive stof kan fotograferes fra kroppens yderside ved hjælp af særlige kameraer, som udfører en scanning. Denne scanning viser fordelingen af det radioaktive stof i organet og kroppen. Dette giver lægen værdifulde oplysninger om det pågældende organs struktur og funktion.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Indium (In-111) Chloride

Brug ikke Indium (In-111) Chloride:

- hvis du er allergisk over for indiumchlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Indium (In-111) Chloride (angivet i afsnit 6).

Yderligere oplysninger vedrørende hvornår dette lægemiddel ikke må bruges, findes i indlægssedlen til den anden komponent.

Advarsler og forsigtighedsregler

Dette lægemiddel involverer behandling med radioaktivitet. Lægen vil kun give dig dette lægemiddel, hvis fordelene opvejer risiciene.

Indium (In-111) Chloride gives som én enkelt dosis af en specialist, som vil tage højde for eventuelt nødvendige forholdsregler.

Lægen vil fortælle dig, om du skal træffe særlige forholdsregler efter brug af dette lægemiddel. Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Brug af anden medicin sammen med Indium (In-111) Chloride

Fortæl det altid til lægen, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Yderligere oplysninger vedrørende lægemidler som kan påvirke eller påvirkes af Indium (In-111) Chloride, findes i indlægssedlen til den anden komponent.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du bruger dette lægemiddel.

- **Graviditet**

Lægen vil kun give dig Indium (In-111) Chloride under graviditet, hvis det er absolut nødvendigt, da det kan skade det ufødte barn.

- **Amning**

Fortæl det til lægen, hvis du ammer, da denne muligvis vil udsætte behandlingen til efter du er holdt op med at amme. Lægen kan også bede dig om at holde op med at amme, indtil radioaktiviteten er forsvundet fra din krop.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er ikke sandsynligt, at Indium (In-111) Chloride vil påvirke din evne til at køre bil eller betjene maskiner.

3. Sådan skal du bruge Indium (In-111) Chloride

Indium (In-111) Chloride vil altid blive brugt på et hospital eller lignende sted. Det vil udelukkende blive givet til dig af kvalificeret personale, der er uddannet til at håndtere radioaktive materialer sikkert.

Lægen vil beslutte, hvilken dosis af Indium (In-111) Chloride, der skal bruges. Den indgivne dosis afhænger af det lægemiddel, som det kombineres med. Der benyttes altid den laveste mulige dosis, som giver tilfredsstillende billeder.

Brug til børn (under 18 år)

Der bruges lavere doser til børn i henhold til deres vægt, kropsoverfladeareal eller alder.

Brug

En injektion i en vene er normalt tilstrækkelig. I visse tilfælde kan der være behov for en yderligere injektion.

Scanningerne kan normalt udføres på et hvilket som helst tidspunkt efter injektionen, afhængig af indgrebet.

Drik så meget væske som muligt dagen efter behandlingen. Herved forhindres det, at det aktive stof samler sig i blæren.

Hvis du har brugt for meget Indium (In-111) Chloride

Det er ikke sandsynligt, at du får en overdosis, da dette lægemiddel gives under lægeligt opsyn. Men, hvis det skulle ske, vil lægen sørge for, at du får den rette behandling.

Spørg lægen, hvis du har yderligere spørgsmål om brugen af dette produkt.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Oplysninger om eventuelle bivirkninger, som kan opstå, findes i indlægssedlen til den anden komponent.

Fortæl læge, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl læge, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Kræft eller arvelige defekter kan skyldes udsættelse for stråling, risikoen er dog meget lav, da der anvendes lave doser i disse undersøgelser.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Brug ikke Indium (In-111) Chloride efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp.

Hospitalspersonalet vil sikre en korrekt opbevaringstemperatur (under 25°C som anført på pakningen).

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Indium (In-111) Chloride indeholder:

- Aktivt stof: ^{111}In som indiumchlorid
En milliliter Indium (In-111) Chloride indeholder 370 MBq.
- Øvrige indholdsstoffer: saltsyre, vand til injektion.

Udseende og pakningsstørrelser

Indium (In-111) Chloride leveres i hætteglas (type 1 Ph. Eur.) lukket med en butylgummiprop og forseglet med en krympforsegling i aluminium.

Pakningsstørrelser:

- 111 MBq (0,3 ml)
- 185 MBq (0,5 ml)
- 370 MBq (1,0 ml)
- 555 MBq (1,5 ml)
- 740 MBq (2,0 ml)

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

• Indehaver af markedsføringstilladelsen

Mallinckrodt Medical B.V.
Westerduinweg 3
1755 LE Petten
Holland

• Fremstiller

Mallinckrodt Medical B.V.
Westerduinweg 3
1755 LE Petten
Holland

Denne indlægsseddel blev senest ændret 02/2017.

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside <http://www.dkma.dk>.