

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Fastum Gel 2,5 %, gel

Ketoprofen

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

- Du kan få Fastum Gel uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Fastum Gel.
- Gem indlægssedlen, du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fastum Gel
3. Sådan skal du bruge Fastum Gel
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Fastum Gel dæmper betændelse og er smertestillende. Det tilhører gruppen af non-steroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID).

Du kan bruge Fastum Gel mod smerter, ømhed og hævelse i muskler og led pga. betændelse. Hvis din læge har sagt, at du skal bruge Fastum Gel for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE FASTUM GEL

Brug ikke Fastum Gel, hvis du

- er overfølsom (allergisk) over for ketoprofen eller et af de øvrige indholdsstoffer
- tidligere har haft astma, allergi eller nældefeber efter behandling med acetylsalicylsyre eller anden smertestillende medicin (NSAID)
- er gravid i 7.-9. måned.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Fastum Gel

Vær opmærksom på følgende

- Du må ikke bruge Fastum Gel i øjne, på slimhinder, på åbne sår, beskadiget hud eller ved hudsygdomme.
- Fastum Gel kan gøre det sværere at blive gravid. Tal med lægen.
- Du må ikke bruge Fastum Gel under tætsluttende forbindelse.
- Hvis du har eller har haft astma eller allergi, kan Fastum Gel udløse astmalignende anfald.
- Du kan blive overfølsom efter lang tids brug af Fastum Gel. Får du udslæt, skal du stoppe behandlingen.
- De behandlede hudområder må ikke udsættes for sollys eller solarielys under behandlingen samt i 2 uger derefter.

- Vask hænderne efter påsmøring. Medmindre du behandler hænderne.
- Hvis du er i behandling med medicin mod betændelse (metronidazol) eller Antabus, så tal med lægen, da Fastum Gel indeholder små mængder alkohol.

Kontakt lægen, hvis du

- får du irritation eller udslæt af Fastum Gel
- har eller har haft dårlige nyrer.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Fastum Gel indeholder alkohol. Hvis du er i behandling med Antabus eller metronidazol (mod betændelse), må du ikke bruge Fastum Gel uden først at tale med lægen eller apoteket.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun bruge Fastum Gel efter aftale med lægen. Du må ikke bruge Fastum Gel i de sidste 3 måneder af graviditeten.

Amning

Hvis du ammer, må du kun bruge Fastum Gel efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Fastum Gel påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Fastum Gel

Fastum Gel indeholder alkohol (ethanol). Hvis du er i behandling med Antabus eller metronidazol (mod betændelse), må du ikke tage Fastum Gel uden først at tale med lægen eller apoteket.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE FASTUM GEL


Hvis din læge har ordineret Fastum Gel til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Fastum Gel er til udvortes brug.

Den sædvanlige dosis er

Voksne og børn over 2 år

- Tube: Du skal smøre 5-10 cm gel (det svarer til 4-8 g) på huden 2-3 gange daglig. Gnid det godt ind i huden efter påsmøringen.
- Dispenser: Du skal smøre 3-6 pumpedoser (det svarer til 4-8 g) på huden 2-3 gange daglig. Gnid det godt ind i huden efter påsmøringen.
- Første gang dispenserens anvendes: Tryk flere gange oven på dispenserens eller pres bunden indad, indtil der kommer gel ud. Dispenserens skal holdes vandret. (Se tegningerne nedenfor.)



Vask hænderne efter endt påsmøring, medmindre du behandler hænderne.

Du må ikke dække den påsmurte hud med tætsluttende forbinding.

Børn

Du må kun bruge Fastum Gel til børn under 2 år efter aftale med en læge.

Hvis du har brugt for meget Fastum Gel

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Fastum Gel, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Hvis du har glemt at bruge Fastum Gel

Brug aldrig dobbelt dosis, hvis du har glemt at bruge Fastum Gel. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at bruge Fastum Gel

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Fastum Gel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.

- Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

- Blodig opkastning og /eller sort afføring pga. blødning i mave og tarm. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

- Rødmen af huden.
- Kløe.
- Eksem.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.

- Øget følsomhed af huden for lys.
- Nældefeber.
- Betændelse i huden med blærer.

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.

- Udslæt og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
- Forværring i nyresygdom.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

- Smerter opadtil i maven, sure opstød og evt. opkastninger pga. mavesår. Kan være eller blive alvorligt. Kontakt lægen.
- Diarré.
- Kontakteksem.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Du kan opbevare Fastum Gel ved almindelig temperatur.
- Brug ikke Fastum Gel efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE INFORMATION

Fastum Gel 2,5 %, gel indeholder

- Aktivt stof: Ketoprofen.
- Øvrige indholdsstoffer: Ethanol, triethanolamin, nerol essens, lavendel essens, rensed vand og carbomer.

Udseende og pakningsstørrelser

Pakningsstørrelser

Fastum Gel udleveres i en 50 g tube, 100 g tube og i en 100 g dispenser af plast (pumpe uden drivgas).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l.
Via Sette Santi, 3
50131 Firenze
Italien

Fremstiller

A.Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l.
Via Sette Santi, 3
50131 Firenze
Italien

Denne indlægsseddel blev sidst revideret november 2008