

DIPRODERM®, CREME, 0,05 %

betamethasondipropionat

Receptpligtig medicin:

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret Diproderm® til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Diproderm®
3. Sådan skal du bruge Diproderm®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse.

Diproderm® er en hvid creme.

Diproderm® indeholder et stærkt binyrebarkhormon. Diproderm® dæmper hævelse og irritation ved betændelse, der ikke skyldes bakterier, virus eller svampe. Derved mindkes udbredelsen af udslæt, eksem eller psoriasis. Du kan bruge Diproderm® til behandling af forskellige former for eksem og psoriasis.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisninger.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Diproderm®.

Brug ikke Diproderm® hvis:

- du er overfølsom overfor det aktive stof eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Diproderm® creme.
- du har betændelse i huden som skyldes svampe eller bakterier, med mindre betændelsen bliver behandlet samtidig.

Brug ikke Diproderm® mod:

- en betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet, som viser sig ved rødme, især på næsen, på kinderne og i panden (rosacea).
- betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit).
- bumser eller områder med bumser.
- sygdomme på huden, der skyldes virus (forkølelssår, skoldkopper og helvedesild).
- hudlidelser hos børn under 1 år, f.eks. eksem eller bleksem.

Særlige forholdsregler

- behandlingen bør ikke vare længere end højst nødvendigt og ikke mere end fire uger, uden at din læge igen har set på din hudsygdom.
- du bør ikke bruge hormoncreme længere end aftalt med lægen. Det gælder især ved behandling af den sarte hud i ansigt, armhuler, lyske, ved endetarmsåbning og på kønsdele.

- du bør især undgå at bruge binyrebarkhormon til børn længere end aftalt med lægen. Børn har større risiko for bivirkninger.
- langvarig brug gør huden tynd og skrøbelig, især i ansigtet, på kønsdelene og på indersiden af arme og ben.
- hvis huden bliver mere irriteret, betændt, rød, eller klør og svier, bør du tale med din læge. Der kan være kommet betændelse eller allergi.
- du bør ikke bruge tætsluttende og lufttæt forbindelse eller plaster, hvis der er betændelse i huden.
- du bør ikke bruge Diproderm® rundt om øjnene.
- undgå at få Diproderm® i øjnene.
- hvis du har brugt Diproderm® i lang tid, må du ikke stoppe behandlingen pludseligt, da det kan forværre din hudsygdom. Tal med lægen om langsom aftrapning af behandlingen.
- dine binyrers dannelse af hormoner kan blive nedsat, når du bruger Diproderm® i længere tid. Fortæl derfor lægen, at du bruger Diproderm® creme, hvis du er kommet alvorligt til skade, har en svær betændelse (f.eks. lungebetændelse) eller skal opereres.
- oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Diproderm® creme.

Brug af anden medicin

Du kan bruge Diproderm® sammen med anden medicin.

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet:

Du kan bruge Diproderm® efter lægens anvisning.

Amning:

Du kan bruge Diproderm® i korte perioder, selv om du ammer. Spørg lægen. Du bør ikke bruge Diproderm® på brystet, mens du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Diproderm® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Diproderm® creme.

Diproderm® creme indeholder chlorcresol, der kan give allergiske reaktioner. Diproderm® creme indeholder cetostearylalkohol, der kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem).

3. Sådan skal du bruge Diproderm®

Den sædvanlige dosering er:

Voksne

Påsmør Diproderm® i et tyndt lag 1-2 gange dagligt (morgen og aften).

Børn:

Du må kun bruge Diproderm® til børn under 12 år efter aftale med lægen.

Du bør i så fald kun smøre cremen på små hudområder i et tyndt lag og behandlingen må højst vare 1 uge.

Vask hænder efter brug, med mindre hænderne behandles.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændringer eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Hvis du har brugt for meget Diproderm® creme

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Diproderm® creme, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag emballagen med.

Symptomer:

I sjældne tilfælde med langvarig og overdreven brug kan du få rødt, rundt måneansigt, mindre muskler, uønsket behåring, blålige striber i huden, øgede fedtdepoter på maven og i nakken samt andre bivirkninger, som står i bivirkningsafsnittet.

Hvis du har glemt at bruge Diproderm®

Smør et tyndt lag Diproderm® creme på, så snart du kommer i tanke om det, og fortsæt derefter som lægen har anvist.

Hvis du holder op med at tage Diproderm®

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Diproderm®.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Diproderm® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkninger forekommer især ved langvarig og overdreven brug, samt ved brug af lufttæt forbindelse.

Alvorlige bivirkninger ved brug af Diproderm® creme.

Sjældne bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 10.000 patienter):

- rødt, rundt måneansigt, sukkersyge, for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken. Kontakt lægen.
- risiko for alvorlig shocktilstand ved tilskadekomst, operation eller svær betændelse (f.eks. lungebetændelse).
- hæmning af kroppens egen evne til at producere binyrebarkhormon.
- børn kan vokse mindre og tage mindre på i vægt. Kontakt lægen.
- børn kan få vedvarende hovedpine på grund af forhøjet tryk i hjernen. Kontakt lægen.

Hypighed er ikke kendt:

- psoriasis med pusfyldte knopper på hænder og fødder eller over hele kroppen. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger ved brug af Diproderm® creme.

Almindelige bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 100 patienter):

- ny betændelse kan opstå i hud, som er under behandling med Diproderm®.
- betændelse i hårsække.
- brændende fornemmelse, kløe, irritation, tør hud.
- kontakteksem.

- uønsket hårvækst.
- irritation eller betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit).
- betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme og evt. små knopper eller bumser.
- udslæt med små væskefyldte blærer.
- hvide pletter på huden (mindre pigment i huden).
- tynd hud, der let går i stykker, strækmærker, laset og opblødt hud.

Ikke almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- overfølsomhed.
- små punktfornede eller større blødninger i huden.

Sjældne bivirkninger(det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- mørkere hud (øget pigment i huden).

Hypighed er ikke kendt:

- forværring af betændelse i huden, sløring af betændelse i huden.
- udvidelse af de små blodkar i huden.
- forværring af eksem ved ophør af behandlingen.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk

5. Opbevaring

Opbevar Diproderm® utilgængeligt for børn.

Tag ikke Diproderm® efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skralde-spanden.

6. Yderligere oplysninger

Diproderm®, creme, 0,05 % indeholder

Aktiv stof: betamethasonpropionat sv.t. 0,5 mg/g betamethason.

Øvrige indholdsstoffer: hvid, blød paraffin, cetomacrogol 1000, cetostearylalkohol, paraffinolie, rensset vand, fosfatstødpude og chlorcresol.

Udseende og pakningsstørrelse

Diproderm® creme fås i pakningsstørrelserne 30 og 60 g.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen i Danmark

Pharmason ApS
Bredgade 79, 5492 Vissenbjerg

Ompakket og frigivet af

Pharmason ApS
Bredgade 79, 5492 Vissenbjerg

Diproderm® er et registreret varemærke, der tilhører Schering-Plough koncernen.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 03/2009