

Serevent® 50 mikrogram/dosis, inhalationspulver salmeterol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge medicinen.

- Gem indlægssedlen, De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
- Lægen har ordineret Serevent® til Dem personligt. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Serevent®
3. Sådan skal De bruge Serevent®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Serevent® indeholder et bronkieudvidende middel, der afslapper musklerne i luftvejene og herved ophæver forsnævringen i bronkierne. Denne optræder pludseligt i forbindelse med et astmaanfald. Luften kan nu lettere passere, og det bliver nemmere at trække vejret.

Serevent® er langtidsvirkende.

De kan bruge Serevent® til forebyggelse af astma og til lindring af symptomerne på kronisk bronchitis og kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) som rygerlunger, men det bør kombineres med en forebyggende inhalationsbehandling med binyrebarkhormon afhængigt af sværhedsgraden af Deres sygdom og hvor der er akut forværring af sygdommen.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT BRUGE SEREVENT® Brug ikke Serevent®:

Hvis De er overfølsom (allergisk) overfor salmeterol eller lactose.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Serevent®:

- Forsigtighed bør udvises ved diabetes, forhøjet stofskifte og nedsat hjertefunktion.
- Der bør udvises særlig forsigtighed ved akut svær astma, da risikoen for nedsat kaliumindhold i blodet øges.
- Langtidsbehandling bør kombineres med betændelseshæmmende behandling.
- Giver behandlingen ikke den ønskede effekt, bør De ikke øge dosis eller doseringshyppighed uden at kontakte lægen.
- Kommer symptomerne ikke under kontrol eller bliver symptomerne forværret bør De kontakte Deres læge.

- Pludselig og tiltagende forværring af astmasymptomer kan være livstruende, søg læge eller ring evt. 112.
- Når astmasymptomerne er under kontrol kan det overvejes at nedsætte dosis gradvist. Tal med lægen.
- Ved KOL med akut forværring bør kombinationsbehandling med binyrebarkhormon overvejes. Tal med lægen.
- Bør ikke anvendes ved for tidlig fødsel.
- Kan hæmme veer.
- Astmabehandlingen bør følge et skema og lungefunktionen bør kontrolleres med jævn mellemrum.

Brug af anden medicin:

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

De kan bruge Serevent® sammen med anden medicin, men tal først med lægen, hvis De er i behandling med medicin mod:

- Depression (tricykliske antidepressive midler og MAO-hæmmere).
- Parkinson (MAO-hæmmere, antikolinergika).
- Hjerte- og kredsløbsslidelser (betablokkere).
- Grøn stær (betablokkere).
- Forstyrrelser i hjerterytmen (hjerteglykosider)
- Binyrebarkhormoner (kortikosteroider).
- Astma og andre former for vejtræknings-besvær (betaadrenerge stoffer, xanthiner, aminophyllin, theophyllin).
- Medicin der øger hjerterytmen eller vanddrivende midler (diuretika, ikke kaliumbesparende).

Graviditet og amning:

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De tager nogen form for medicin.

Graviditet:

Hvis De er gravid, må De kun bruge Serevent® efter aftale med lægen.

Amning:

Hvis De ammer, må De kun bruge Serevent® efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed:

Serevent® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Serevent®:

Serevent® indeholder lactose. Kontakt lægen før De bruger Serevent®, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DE BRUGE SEREVENT®

Brug altid Serevent® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er:

Astma:

Voksne: 1 sug (50 mikrogram) 2 gange daglig. Dosis kan øges til 2 sug (100 mikrogram) 2 gange daglig.

Børn over 4 år: 1 sug (50 mikrogram) 2 gange daglig.

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL):

1 sug (50 mikrogram) 2 gange daglig.

Serevent® bør ikke anvendes til børn under 4 år.

Serevent® inhalationspulver i Diskos® virker efter 5-15 minutter og i 12 timer.

Brugsanvisning:

1. Åbn Diskos® ved at skubbe fingergrebet i bund – til det siger klik.

2. Skub dosisknappen i bund – og lad den blive der. Nu er dosis klar.

3. Pust helt ud – ved siden af Diskos®. Sæt mundstykket mellem tænderne og luk læberne tæt om det. Sug ind så hurtigt som muligt. Hold vejret nogle sekunder. Sug eventuelt en ekstra gang.

4. Luk Diskos® efter brug ved at skubbe fingergrebet tilbage – til det siger klik. Hvis lægen har ordineret mere end 1 dosis, skal De gentage punkt 1-4. Hold øje med tælleren, der viser hvor mange doser, der er tilbage i Diskos®. Når der er 5 doser tilbage, bliver tallene røde. Smid Diskos® ud, når den er tom (tælleren viser 0).

Hvis De har brugt for meget Serevent®:

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Serevent®, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet.

Symptomerne på overdosering er rødme af ansigt, indre uro, rysten på hænder, kvalme, hurtig puls, hjertebanken, svimmelhed, hovedpine, systolisk blodtrykstigning, diastolisk blodtryksfald, trykken for brystet og evt. ekstra hjerteslag, nedsat kaliumindhold i blodet.

Hvis De har glemt at bruge Serevent®:

Hvis De har glemt en dosis, skal De springe den glemte dosis over, og tage den næste dosis til sædvanlig tid. De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis De holder op med at bruge Serevent®:

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om eller føler Dem usikker på.

4. BIVIRKNINGER

Serevent® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): Forstyrrelse i hjerterytmen.

Overfølsomhedsreaktioner. Væskeophobning med hævelse i hud og slimhinder i mund og svælg. Søg læge, ring evt. 112. Kortåndethed/Vejtrækningsproblemer/Astmalignende anfald/Andenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

2. udgave

Ikke alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Rysten. Hovedpine. Hjertebanken. Muskelkrampe.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Overfølsomhedsreaktioner. Udslæt. Hurtig puls. Nervøsitet.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

Væskeophobning og hævelser. Svælgirritation. Ledsmerter. Kvalme. Svimmelhed, Søvnløshed/Søvnforstyrrelser. Hyppigvandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker (blodglukose). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. Kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger kan dermed blive indberettet til lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: <http://www.lægemiddelstyrelsen.dk/>

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn. Brug ikke Serevent® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. Spørg på apoteket, hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Serevent® indeholder:

Aktivt stof: Salmeterol 50 mikrogram/dosis. Øvrigt indholdsstof: Lactose.

Pakningsstørrelse:

60 doser

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

EuroPharmaDK
Tarp Byvej 81-83
6715 Esbjerg N.

Ompakket og frigivet af:

EuroPharmaDK
Tarp Byvej 81-83
6715 Esbjerg N.

Fremstiller:

Glaxo Wellcome Production
Evreux – Frankrig.

Serevent® og Diskos® er et registrerede varemærker, der tilhører Glaxo Group Limited.