

Glucobay® 50 mg tabletter

acarbose

0301715904

Glucobay® er et registreret varemærke, som tilhører Bayer Koncernen

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen

- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
- Lægen har ordineret Glucobay® til Dem personligt. Lad derfor være med at give Glucobay® til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Glucobay®
3. Sådan skal De bruge Glucobay®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Glucobay® er til behandling af ikke insulin-krævende diabetes (type 2 diabetes mellitus). Glucobay® forsinker optagelsen af glucose (sukker) i tarmen.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT BRUGE GLUCOBAY®

Brug ikke Glucobay® hvis:

- De er overfølsom over for acarbose eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer.
- De lider af alvorligt nedsat nyrefunktion.
- De lider af kroniske tarmsygdomme, der giver forstyrrelser af fordøjelsen.
- De lider af øget gasdannelse i tarmen eller hindringer af tarmpassagen (brok, tarmslyng eller sår i tarmen).

Særlige forholdsregler:

Under behandling med Glucobay® kan De få mavesmerter eller maveirritation, hvis De spiser glukose og glukoseholdig mad.

Brug af anden medicin

Tal med lægen hvis De bruger:

- Medicin mod diabetes (sulfonylurinstoffer og insulin). Hvis De bruger Glucobay® sammen med

sulfonylurinstoffer eller insulin, skal De evt. have dosis af disse nedsat for at undgå for lavt blodglukose. Ændring af dosis skal ske i samråd med lægen. Hvis De får for lavt blodglukose, skal De indtage druesukker (glukose/dextrose), da almindeligt sukker og brød ikke virker.

- Medicin mod diaré (kultabletter).
- Kolesterolnedsættende medicin (cholestyramin).
- Medicin der fremmer fordøjelsen (fordøjelseshæmmende enzymer).
- Hjertemedicin (digoxin). De skal måske have ændret dosis. Dette skal foregå i samråd med lægen.

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin som er købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Brug af Glucobay® sammen med mad og drikke

De skal tage Glucobay® ved begyndelsen af et måltid.

Graviditet og amning

Graviditet:

De må ikke bruge Glucobay®, hvis De er gravid.

Amning:

Erfaringer med Glucobay® er endnu begrænsede. Spørg lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Glucobay® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. SÅDAN SKAL DE BRUGE GLUCOBAY®

Brug altid Glucobay® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl så spørg lægen eller på apoteket. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.

Dosering

Voksne:

Startdosis er 1 tablet (50 mg) 3 gange daglig. Efter 4-8 uger kan De gradvist øge dosis til 2 tabletter (100 mg) 3 gange daglig. De skal tage tabletterne i begyndelsen af måltidet. De kan synke tabletterne hele med lidt vand eller tygge dem.

Børn og unge:

De må kun bruge Glucobay® til børn og unge under 18 år efter lægens anvisning.

Har De taget for mange Glucobay®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Glucobay®, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas.

Symptomer på overdosering er luft i maven og diaré. Ved overdosering bør De ikke indtage kulhydrater i de efterfølgende 4-6 timer, da det kan forværre symptomerne.

Har De glemt at tage Glucobay®

Glemmer De at tage en dosis, skal De tage den så hurtigt som muligt. Er dette tæt på tidspunktet for næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag ikke dobbeltdosis.

Hvis De holder op med at tage Glucobay®

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, De er i tvivl om eller føler Dem usikker på. Ændring eller stop med behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

4. BIVIRKNINGER

Glucobay® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 10.000 patienter):

- Gulsot. Kontakt læge eller skadestue.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

- Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
- Leverbetændelse. Kontakt læge eller skadestue.
- Voldsomme anfald af smerter i maven, opkastninger, stop for luftgang og afføring pga. tarmslyng. Kontakt læge eller skadestue.
- Mavesmerter grundet luftholdige cyster i tarmen. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end 1 ud af 10 patienter):

- Luft i maven

Almindelige bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 100 patienter):

- Diaré, mavesmerter, udspilning af maven pga. luft.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 1000 patienter):

- Kvalme, opkastning, sure opstød/halsbrand.

Sjældne bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 10.000 patienter):

- Vand i kroppen. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

- Hudrødme, udslæt, nældefeber.

Glucobay® kan herudover give bivirkninger, som De normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om

visse laboratorieprøver, fx leverprøver, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger som ikke er nævnt her.

Fortæl læge eller apotek, hvis De får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

- Opbevar Glucobay® utilgængeligt for børn.
- Opbevar ikke Glucobay® ved over 25°C.
- Opbevar tabletterne i æsken/blisteren indtil umiddelbart før brug.
- Brug ikke Glucobay® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
- Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE INFORMATION

Glucobay® tabletter 50 mg indeholder:

- Det virksomme indholdsstof er acarbose.
- De øvrige indholdsstoffer er: MikrokrySTALLINSK cellulose; kolloid vandfri silica; majsstivelse, magnesiumstearat.

Glucobay®s udseende og pakningsstørrelse:

Glucobay® er en rund hvid tablet mærket G50 på den ene side og BAYER på den anden side.

Glucobay® findes i pakningsstørrelserne 30 stk. og 120 stk. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S
Industriparken 23-25, 2750 Ballerup

Ompakket og frigivet:

Paranova Pack A/S
Industriparken 23-25, 2750 Ballerup

Denne indlægsseddel blev senest revideret august 2008