



INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Indium [^{111}In] chlorid opløsning, GE Healthcare, radiofarmaceutisk mærkningsopløsning

Indium [^{111}In] chlorid

Indium [^{111}In] chlorid opløsning GE Healthcare, radiofarmaceutisk mærkningsopløsning bliver omtalt som Indium [^{111}In] chlorid i denne indlægsseddel.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide om Indium [^{111}In] chlorid
3. Sådan bliver du undersøgt med Indium [^{111}In] chlorid
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Indium [^{111}In] chlorid er en radioaktiv mærkningsopløsning.

Indium [^{111}In] chlorid er kun til diagnostisk brug, dvs. i forbindelse med undersøgelser og *ikke* i forbindelse med behandling.

Indium [^{111}In] chlorid skal blandes med forskellige produkter (f.eks. protein eller antistof) før brug. Herved bliver produktet, det blandes med radioaktivt og kan ses ved scanning.

Oplysninger om de produkter, som Indium [^{111}In] chlorid bliver blandet med findes i pakningen med det pågældende produkt.

Lægen kan give dig Indium [^{111}In] chlorid for noget andet. Spørg lægen.

2. DET SKAL DU VIDE OM INDIUM [¹¹¹In] CHLORID

Du må ikke få Indium [¹¹¹In] chlorid, hvis

- du er overfølsom (allergisk) over for Indium [¹¹¹In] chlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. Dette skyldes, at anden medicin kan påvirke virkningen af Indium [¹¹¹In] chlorid.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke undersøges med Indium [¹¹¹In] chlorid. Lægen vil vurdere det for hver enkelt.

Tal med lægen, hvis en menstruation er udeblevet, eller hvis der er den mindste chance for, at du kan være gravid.

Amning

Du skal stoppe med at amme, når du får Indium [¹¹¹In] chlorid, da små mængder radioaktiv stråling går over i modermælken. Din læge vil fortælle dig, hvornår du kan begynde at amme igen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er uvist, om Indium [¹¹¹In] chlorid påvirker arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. Du skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig.

3. SÅDAN BLIVER DU UNDERSØGT MED INDIUM [¹¹¹In] CHLORID

Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får. Er du i tvivl, så spørg lægen eller sundhedspersonalet. Det er kun lægen, der kan ændre dosis.

Den sædvanlige dosis er

Din læge vil bestemme, hvilken dosis du skal have. Dosis vil afhænge af det produkt, som Indium [¹¹¹In] chlorid skal blandes med og hvilken undersøgelse, du skal have foretaget.

En læge eller uddannet sundhedspersonale vil normalt give dig indsprøjtningen.

Den person, der undersøger dig, vil fortælle dig alt, hvad du har brug for at vide om sikker brug af Indium [¹¹¹In] chlorid.

Hvis du har fået for meget Indium [¹¹¹In] chlorid

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, du har fået for meget Indium [¹¹¹In] chlorid.

4. BIVIRKNINGER

Indium [^{111}In] chlorid kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Risikoen for bivirkninger afhænger af, hvilket produkt Indium [^{111}In] chlorid blandes med. Lægen vil fortælle dig, hvis der er risiko for bivirkninger.

Indium [^{111}In] chlorid udsender radioaktiv stråling. Radioaktiv stråling kan være kræftfremkaldende eller beskadige arveanlæggene. Risikoen er meget lille.

Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

Opbevar Indium [^{111}In] chlorid utilgængeligt for børn.

Etiketten på Indium [^{111}In] chlorid indeholder oplysninger om opbevaringsbetingelser og udløbsdato.

Sygehusets personale vil sikre, at Indium [^{111}In] chlorid opbevares og bortskaffes korrekt, og at det ikke bruges efter den udløbsdato, der står på pakningen.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Indium [^{111}In] chlorid indeholder:

- Aktivt stof: Indium [^{111}In] chlorid, 370 MBq/ml.
- Øvrige indholdsstoffer: Saltsyre (0.04 M).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Indium [^{111}In] chlorid er en klar, farveløs opløsning i et hætteglas.

Pakningsstørrelser

Hætteglas: 74, 130 og 185 MBq (2, 3,5 og 5 mCi).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

GE Healthcare Limited
Amersham Place
Little Chalfont
Buckinghamshire HP7 9NA
Storbritannien

Repræsentant for Danmark

GE Healthcare A/S
Park Allé 295
2605 Brøndby

Denne indlægsseddel blev sidst revideret september 2011