

Betnovat® med chionoform

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge medicinen

- Gem indlægssedlen, De kan få brug for at læse den igen.
- Ønsker De mere information, så kontakt læge eller apotek.
- Lægen har ordineret Betnovat® med chionoform til Dem personligt. Giv derfor ikke medicinen til andre.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Øversigt over indlægssedlen:

1. Betnovat® med chionoforms virkning og hvad De skal bruge det til
2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Betnovat® med chionoform
3. Sådan skal De bruge Betnovat® med chionoform
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer De Betnovat® med chionoform
6. Yderligere oplysninger

1. Betnovat® med chionoforms virkning og hvad De skal bruge det til:

- Betnovat® indeholder et stærkt binyrebarkhormon, der dæmper hævelse og irritation.
- Chionoform virker desinficerende og hæmmer vækst af bakterier og svampe.
- De kan bruge Betnovat® med chionoform til behandling af udslæt, eksem og psoriasis, når huden også er betændt.
- Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Betnovat® med chionoform:

Brug ikke Betnovat® med chionoform hvis:

- De er overfølsom over for betamethason, clioquinol, iod eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Betnovat® med chionoform.
- De ikke har udslæt, eksem eller psoriasis, selvom der er betændelse i huden.

Brug ikke Betnovat® med chionoform mod:

- En betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet, som viser sig ved rødme, især på næsen, på kinderne og i panden (rosacea).
- Betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit).
- Bumser eller på områder med bumser.
- Sygdomme på huden, der skyldes virus (for eksempel kølelssår, skoldkopper og helvedesild).
- Hudsygdomme hos børn under 1 år, f.eks. eksem eller bleeksem.

Særlige forholdsregler:

- De bør ikke bruge Betnovat® med chionoform længere end aftalt med lægen. Det gælder især ved behandling af børn.
- De bør undgå lang tids brug på store hudområder og på den sarte hud i ansigt, armhuler, lysken, ved endetarmsåbning og på kønsdele.
- Ved behandling af store hudområder gennem længere tid, specielt hos børn og ved behandling under forbindelse, er der øget risiko for bivirkninger.

- De bør ikke bruge tætsluttende og lufttæt forbindelse eller plaster, hvis der er betændelse i huden.
- Kontakt lægen, hvis der kommer irritation. Behandlingen skal muligvis ophøre.
- Hvis De ikke har fået det bedre i løbet af få dage, eller hvis De har fået det værre, skal De kontakte lægen.
- De bør ikke bruge Betnovat® med chionoform rundt om øjnene.
- Undgå at få Betnovat® med chionoform i øjnene.
- Hvis De har brugt Betnovat® med chionoform i lang tid, må De ikke stoppe behandlingen pludseligt, da det kan forværre Deres hudsygdom. Tal med lægen om langsom aftrapning af behandlingen.
- Deres binyrers dannelse af hormoner kan blive nedsat, når De bruger Betnovat® med chionoform i lang tid. Fortæl lægen, at De bruger Betnovat® med chionoform, hvis De er kommet alvorligt til skade, har en svær betændelse (f.eks. lungebetændelse) eller skal opereres.
- Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at De er i behandling med Betnovat® med chionoform.

Vigtig information om nogle af hjælpestofferne i Betnovat® med chionoform:

Betnovat® med chionoform creme indeholder chlorocresol, der kan give allergi. Betnovat® med chionoform creme indeholder cetostearylalkohol, der kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem).

Graviditet og amning:

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før De bruger nogen form for medicin.

Graviditet:

De må kun bruge Betnovat® med chionoform efter lægens anvisning.

Amning:

De kan bruge Betnovat® med chionoform i kort tid, selv om De ammer. Spørg lægen. De bør ikke bruge Betnovat® med chionoform på brystet, hvis De ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed:

Betnovat® med chionoform påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Brug af anden medicin:

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

De kan bruge Betnovat® med chionoform sammen med anden medicin.

3. Sådan skal De bruge Betnovat® med chionoform:

Dosering:

Voksne: Påsmør et tyndt lag 1-3 gange dagligt.

Børn: De må kun bruge Betnovat® med chionoform til børn efter lægens anvisning.

Undgå at få Betnovat® med chionoform i øjnene. Vask hænder efter brug, med mindre De skal behandle hænderne.

Vær opmærksom på, at Betnovat® med chionoform kan misfarve hud, hår og tøj. Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Har De brugt for meget Betnovat® med chionoform?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har brugt mere Betnovat® med chionoform, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas.

I sjældne tilfælde med langvarig og overdreven brug kan De få rødt, rundt måneansigt, mindre muskler, uønsket behåring, blålige striber i huden, øgede fedt på maven og i nakken samt en række af de bivirkninger, som står i bivirkningsafsnittet.

Har De glemt at bruge Betnovat® med chionoform?

Hvis De har glemt en dosis skal De ikke bruge dobbelt dosis, men fortsætte med Deres sædvanlige dosering.

4. Bivirkninger:

Betnovat® med chionoform kan som al anden medicin give bivirkninger.

Bivirkninger kommer især hvis De bruger lufttæt forbindelse og ved lang tids behandling.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Risiko for alvorlig shocktilstand ved tilskadekomst, operation eller svær betændelse (f.eks. lungebetændelse).
- Øget fedt på maven og i nakken, kuglerundt, rødt ansigt, sukkersyge, for højt blodtryk, nedsat muskelmasse. Kontakt lægen.
- Børn kan vokse mindre og tage mindre på i vægt. Kontakt lægen.
- Børn kan få vedvarende hovedpine eller ondt i øjnene på grund af forhøjet tryk i hjernen. Kontakt lægen.
- Psoriasis med pusfyldte knopper på hænder og fødder eller over hele kroppen. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 100 patienter):

- Brændende fornemmelse, kløe.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 1000 patienter):

- En betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme på næse, kinder og pande (rosacea).
 - Små blodudtrædninger i huden.
- Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):*
- Tynd hud, som let går i stykker, strækmærker, hvide eller brune pletter på huden (pigmentforandringer), uønsket hårvækst, udvidelse af de små blodkar i huden.
 - Allergisk kontakteksem, overfølsomhed.
 - Forværring af hudsygdom ved ophør af behandlingen.
 - Striber på huden, især på maven.

Hyppighed ikke kendt:

- Ny betændelse i det behandlede område, sløring af betændelse i huden, forværring af betændelse i huden.
- Betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit), bumser, udslæt med små væskefyldte blærer.

Fortæl læge eller apotek, hvis De får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl læge eller apotek, hvis De får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

De finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: <http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>

5. Sådan opbevarer De Betnovat® med chionoform:

Brug ikke Betnovat® med chionoform efter den udløbsdato, der står på pakningen. Opbevar Betnovat® med chionoform utilgængeligt for børn.

6. Yderligere information:

Aflever altid medicinrester på apoteket.

Betnovat® indeholder:

- Det virksomme indholdsstof i Betnovat® med chionoform er betamethason 1 mg/g. og clioquinol 30 mg/g
- De øvrige indholdsstoffer er: Chlorocresol, cetomacrogol 1000, cetostearylalkohol, hvid vaselin, paraffinolie, natriumdi-hydrophosphat, phosphorsyre eller natriumhydroxid og rensset vand.

Pakningsstørrelser:

Betnovat med chionoform creme 25 g
Betnovat med chionoform creme 50 g

Markedføring i Danmark:

EuroPharmaDK, 6715 Esbjerg N.

Import og ompakning:

EuroPharmaDK, 6715 Esbjerg N.

Betnovat® er et registreret varemærke, der tilhører Schering-Plough Koncernen.