

## INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

### Diproderm® 0,05%, creme/salve

Betamethason

**Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge medicinen.**

- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
- Lægen har ordineret Diproderm® creme/salve til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

#### **Oversigt over indlægssedlen:**

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Diproderm® creme/salve
3. Sådan skal De bruge Diproderm® creme/salve
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

#### **1. VIRKNING OG ANVENDELSE**

Diproderm® indeholder et stærkt binyrebarkhormon. Diproderm® dæmper hævelse og irritation ved betændelse, der ikke skyldes bakterier, virus eller svampe. Derved mindskes udbredelsen af udslæt, eksem eller psoriasis.

De kan bruge Diproderm® til behandling af forskellige former for eksem og psoriasis.

Lægen kan have givet Dem Diproderm® for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

#### **2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT BRUGE DIPRODERM® CREME/SALVE**

**Brug ikke Diproderm® creme/salve hvis:**

- De er overfølsom (allergisk) over for betamethason eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- De har betændelse i huden som skyldes svampe eller bakterier, med mindre betændelsen bliver behandlet samtidig.

**Brug ikke Diproderm® mod:**

- En betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet, som viser sig ved røde, især på næsen, på kinderne og i panden (rosacea).
- Betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit).
- Bumser eller på områder med bumser.
- Sygdomme på huden, der skyldes virus (forkølelsessår, skoldkopper og helvedesild).
- Hudlidelser hos børn under 1 år, f.eks. eksem eller bleeksem.

#### **Særlige forholdsregler**

- Behandlingen bør ikke vare længere end højst nødvendigt og ikke mere end fire uger, uden at Deres læge igen har set på Deres hudsygdom.
- De bør ikke bruge hormoncreme eller -salve længere end aftalt med lægen. Det gælder især ved behandling af den sarte hud i ansigt, armhuler, lyske, ved endetarmsåbning og på kønsdele.

- De bør især undgå at bruge binyrebarkhormon til børn længere end aftalt med lægen. Børn har større risiko for bivirkninger.
- Langvarig brug gør huden tynd og skrøbelig, især i ansigtet, på kønsdelene og på indersiden af arme og ben.
- Hvis huden bliver mere irriteret, betændt, rød, eller klør og svier, bør De tale med Deres læge. Der kan være kommet betændelse eller allergi.
- De bør ikke bruge tætsluttende og lufttæt forbindelse eller plaster, hvis der er betændelse i huden.
- De bør ikke bruge Diproderm® rundt om øjnene.
- Undgå at få Diproderm® i øjnene.
- Hvis De har brugt Diproderm® i lang tid, må De ikke stoppe behandlingen pludseligt, da det kan forværre Deres hudsygdom. Tal med lægen om langsom aftrapning af behandlingen.
- Deres binyrers dannelse af hormoner kan blive nedsat, når De bruger Diproderm® i længere tid. Fortæl derfor lægen, at De bruger Diproderm® creme/salve, hvis De er kommet alvorligt til skade, har en svær betændelse (f.eks. lungebetændelse) eller skal opereres.
- Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at De er i behandling med Diproderm® creme/salve.

#### **Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Diproderm® creme:**

Diproderm® creme indeholder chlorresol, der kan give allergiske reaktioner.

Diproderm® creme indeholder cetostearylalkohol, der kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem).

#### **Graviditet og amning:**

Åt vejledning hos lægen eller på apoteket før De bruger nogen form for medicin.

#### **Graviditet:**

De må kun bruge Diproderm® creme/salve efter lægens anvisning.

#### **Amning:**

De kan bruge Diproderm® i korte perioder, selv om De ammer. Spørg lægen.

De bør ikke bruge Diproderm® creme/salve på brystet mens De ammer.

#### **Trafik- og arbejdsikkerhed**

Diproderm® påvirker ikke arbejdsikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

#### **Brug af anden medicin:**

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

De kan bruge Diproderm® sammen med anden medicin.

#### **3. SÅDAN SKAL DE BRUGE DIPRODERM® CREME/SALVE**

Brug altid Diproderm® creme/salve nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

## Den sædvanlige dosis er:

### Voksne:

Påsmør Diproderm® creme/salve i et tyndt lag 1-2 gange daglig (morgen og aften).

### Børn:

De må kun bruge Diproderm® creme/salve til børn under 12 år efter aftale med lægen. De bør i så fald kun smøre Diproderm® creme/salve på små hudområder og behandlingen må højst vare 1 uge.

Vask hænder efter brug, med mindre hænderne behandles.

### Har De brugt for meget Diproderm® creme/salve?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har brugt mere af Diproderm® creme/salve, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas.

I sjældne tilfælde med langvarig og overdreven brug kan De få rødt, rundt måneansigt, mindre muskler, uønsket behåring, blålige striber i huden, øgede fedtdepoter på maven og i nakken samt andre bivirkninger, som står i bivirkningsafsnittet.

### Har De glemt at bruge Diproderm® creme/salve?

Smør et tyndt lag Diproderm® creme/salve på, så snart De kommer i tanke om det, og fortsæt derefter som lægen har anvist.

## 4. BIVIRKNINGER

Diproderm® creme/salve kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkninger forekommer især ved langvarig og overdreven brug, samt ved brug af lufttæt forbindelse.

### Alvorlige bivirkninger ved brug af Diproderm® creme/salve

*Sjældne bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):*

- Rødt, rundt måneansigt, sukkersyge, for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken. Kontakt lægen.
- Risiko for alvorlig shocktilstand ved tilskadekomst, operation eller svær betændelse (f.eks. lungebetændelse).
- Børn kan vokse mindre og tage mindre på i vægt. Kontakt lægen.
- Børn kan få vedvarende hovedpine på grund af forhøjet tryk i hjernen. Kontakt lægen.

### Hyppeghed er ikke kendt:

- Psoriasis med pusfyldte knopper på hænder og fødder eller over hele kroppen. Kontakt læge eller skadestue.

### Ikke alvorlige bivirkninger ved brug af Diproderm® creme/salve

*Almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):*

- Ny betændelse kan opstå i hud, som er under behandling med Diproderm®.
- Betændelse i hårsække.
- Brændende fornemmelse, kløe, irritation, tør hud.
- Kontakteksem.
- Uønsket hårvækst.
- Betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme og evt. små knopper eller bumser.

- Udslæt med små væskefyldte blærer.
- Hvide pletter på huden.
- Tynd hud, der let går i stykker, strækmærker, laset og opblødt hud.

*Ikke almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):*

- Overfølsomhed.
- Små punktformede eller større blødninger i huden.

### Hyppeghed er ikke kendt:

- Forværring af betændelse i huden, sløring af betændelse i huden.
- Udvidelse af de små blodkar i huden.
- Forværring af eksem ved ophør af behandlingen.

Der kan i sjældne eller meget sjældne tilfælde optræde andre ikke alvorlige bivirkninger. Ønsker De information om disse bivirkninger, så spørg lægen eller apoteket.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. De eller Deres pårørende kan selv indberette bivirkninger, direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted [www.meldenbivirkning.dk](http://www.meldenbivirkning.dk)

## 5. OPBEVARING

Opbevar Diproderm® utilgængeligt for børn.

Brug ikke Diproderm® efter den udløbsdato, der står på pakningen.

## 6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

### – Diproderm® creme og salve indeholder:

- Det virksomme indholdsstof i Diproderm® er betamethasondipropionat svarende til betamethason 0,5 mg/g.
- De øvrige indholdsstoffer i Diproderm® creme er: Natriumdihydrogenphosphat monohydrat, cetomacrogol 1000, cetostearylalkohol, paraffinolie, hvid, blød paraffin, chlorocresol, koncentreret phosphorsyre og rensset vand.
- De øvrige indholdsstoffer i i Diproderm® salve er: Paraffinolie og hvid, blød paraffin.

### Pakningsstørrelser:

Creme: 30 g, 60 g og 90 (3x30)g

Salve: 30 g, 60 g og 90 (3x30)g

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

### Indehaver af markedsføringstilladelsen:

EuroPharmaDK, Tarp Byvej 81-83, 6715 Esbjerg N.

### Ompakket og frigivet af:

EuroPharmaDK, Tarp Byvej 81-83, 6715 Esbjerg N.

Diproderm® er et registreret varemærke, der tilhører Schering-Plough Koncernen.