

Elocom[®] 0,1% creme

Momethasonfuroat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge medicinen

- Gem indlægssedlen, De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
- Lægen har ordineret Elocom[®] til Dem personligt. Lad derfor være med at give Elocom[®] til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger som ikke er nævnt her.

Overblik over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Elocom[®]
3. Sådan skal De bruge Elocom[®]
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

- Elocom[®] creme indeholder et stærkt binyrebarkhormon.
- Elocom[®] dæmper hævelse og irritation ved betændelse, der ikke skyldes bakterier, virus eller svampe. Derved mindskes udbredelsen af udslæt, eksem eller psoriasis.
- De kan bruge Elocom[®] til behandling af forskellige former for eksem og psoriasis.
- Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Elocom[®]

Brug ikke Elocom[®]

- De er overfølsom over for det aktive stof eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Elocom[®] creme.
- De har betændelse i huden, som skyldes bakterier eller svampe, med mindre betændelsen bliver behandlet samtidig.

Brug ikke Elocom[®] mod:

- En betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet, som viser sig ved rødme, især på næse, kinder, hage og pande (rosacea).
- Betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit).
- Bumser eller på områder med bumser.
- Sygdomme på huden, der skyldes virus (forkølelssesår, skoldkopper og helvedesild).
- Hudlidelser hos børn under 1 år, f.eks. eksem eller bleeksem.

Særlige forholdsregler:

- Behandlingen bør ikke vare længere end højst nødvendigt og ikke mere end fire uger, uden at Deres læge igen har set på Deres hudsygdom.
- De bør ikke bruge binyrebarkhormon længere end aftalt med lægen. Det gælder især ved behandling af den sarte hud i ansigt, armhuler, lyske, ved endetarmsåbning og på kønsdele.
- De bør især undgå at bruge binyrebarkhormon til børn længere end aftalt med lægen. Børn har større risiko for bivirkninger.

- Langvarig brug gør huden tynd og skrøbelig, især i ansigtet, på kønsdelene og på indersiden af arme og ben.
- Hvis huden bliver mere irriteret, betændt, rød, eller klør og svier, bør De tale med Deres læge. Der kan være kommet betændelse eller allergi.
- De bør ikke bruge tætsluttende og lufttæt forbindelse eller plaster, hvis der er betændelse i huden.
- De bør ikke bruge Elocom[®] rundt om øjnene.
- Undgå at få Elocom[®] i øjnene.
- Hvis De har brugt Elocom[®] i lang tid, må De ikke stoppe behandlingen pludseligt, da det kan forværre Deres hudsygdom. Tal med lægen om langsom aftrapning af behandlingen.
- Deres binyrers dannelse af hormoner kan blive nedsat, når De bruger Elocom[®] i længere tid. Fortæl derfor lægen, at De bruger Elocom[®] creme, hvis De er kommet alvorligt til skade, har en svær betændelse (f.eks. lungebetændelse) eller skal opereres.
- Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at De er i behandling med Elocom[®] creme.

Brug af anden medicin:

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

De kan bruge Elocom[®] sammen med anden medicin.

Graviditet og amning:

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før De bruger nogen form for medicin.

Graviditet:

De må kun bruge Elocom[®] creme efter lægens anvisning.

Amning:

De kan bruge Elocom[®] creme i korte perioder, selv om De ammer. Spørg lægen. De bør ikke bruge Elocom[®] creme på brystet mens De ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Elocom[®] påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af hjælpestofferne i Elocom[®]:

Elocom[®] creme indeholder propylenglycolmonopalmitostearat, der kan give irritation af huden.

Elocom[®] creme indeholder Cetostearylalkohol, der kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem).

3. Sådan skal De bruge Elocom[®]

Brug altid Elocom[®] efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller apoteket.

Dosering:

Voksne:

Påsmør et tyndt lag 1 gang daglig.

Cremen bruges på meget tør, skællt og sprukket hud.

Børn: De må kun bruge Elocom[®] til børn efter lægens anvisning.

Når De har fået den ønskede virkning af Elocom[®] creme, bør De gradvist trappe ud af behandlingen efter vejledning fra Deres læge.

Vask hænder efter påsmøring, med mindre De skal behandle hænderne. De kan eventuelt bruge handsker til påsmøring.

Undgå at få Elocom[®] i øjnene.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Hvis De har brugt for meget Elocom[®]:

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har brugt mere af Elocom[®] creme, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas.

I sjældne tilfælde efter langvarig og overdreven brug kan De få rødt, rundt måneansigt, mindre muskler, uønsket behåring, blålige striber i huden, øgede fedtdepoter på maven og i nakken samt andre bivirkninger, som står i bivirkningsafsnittet.

Hvis De har glemt at bruge Elocom[®]:

Smør et tyndt lag Elocom[®] creme på, så snart De kommer i tanke om det, og fortsæt derefter som lægen har anvist.

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om eller føler Dem usikker på.

4. Bivirkninger

Elocom[®] creme kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkninger kommer især hvis De bruger lufttæt forbindelse og ved lang tids behandling.

Alvorlige bivirkninger:

Hyppighed er ikke kendt:

- Rødt, rundt måneansigt, sukkersyge, for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken. Kontakt lægen.
- Risiko for alvorlig shocktilstand ved tilskadekomst, operation eller svær betændelse (f.eks. lungebetændelse).
- Børn kan vokse mindre og tage mindre på i vægt. Kontakt lægen.
- Børn kan få vedvarende hovedpine på grund af forhøjet tryk i hjernen. Kontakt lægen.
- Psoriasis med pusfyldte knopper på hænder og fødder eller over hele kroppen. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

- Betændelse i det behandlede område.
- Tynd hud, der let går i stykker, strækmærker.
- Betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme på næse, kinder, pande og hage (steroid-rosacea).
- Små punktformede eller større blødninger i huden.

Sjældne til meget sjældne bivirkninger (det forekommer hos færre end 1 ud af 1000 behandlede):

- Uønsket hårvækst, overfølsomhed over for det aktive stof i Elocom[®].

Meget sjældne bivirkninger (det forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

- Priken/svien, kløe.

Hyppighed er ikke kendt:

- Sløring af betændelse i huden, forværring af betændelse i huden.
- Udvidelse af de små blodkar i huden.
- Rødme.
- Udslet med bumser.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre eller de får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger kan dermed blive indberettet til lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

De finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted:

<http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Elocom[®] efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Spørg på apoteket, hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Elocom[®] indeholder:

- Aktivt stof: momethasonfuroat 1 mg/g.
- De øvrige indholdsstoffer: Hexylenglycol, Propylenglycolmonostearat, cetostearylalkohol, titandioxid (E 171), Aluminiumstivelseoctenylsuccin, hvid voks, hvid vaselin, koncentreret phosphorsyre, og rensset vand.

Pakningsstørrelser:

Elocom[®] creme 30 g
Elocom[®] creme 60 g
Elocom[®] creme 90 g

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Elocom[®] svarer til Elocon[®]

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

EuroPharmaDK, 6715 Esbjerg N.

Ompakket og frigivet af:

EuroPharmaDK, 6715 Esbjerg N

Elocom[®] er et registreret varemærke, der tilhører Schering-Plough.