

Isoptin® Retard 120 mg depottabletter

Verapamil hydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apoteket, hvis der er mere De vil vide.
- Lægen har ordineret Vastarel® til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal De vide, før De begynder at tage Isoptin® Retard
3. Sådan skal De tage Isoptin® Retard
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse.

Isoptin® Retard er en hvis rund depottablet. På den ene side er der trykt 120 SR og på den anden KNOLL.

Isoptin® Retard kan anvendes til forebyggelse mod hjertekrampe (angina pectoris), forebyggelse og behandling af unormal hjerterytme, behandling af forhøjet blodtryk og forebyggelse efter blodprop i hjertet.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Isoptin® Retard.

Tag ikke Isoptin® Retard hvis:

- De er overfølsom over for verapamil hydrochlorid eller over for et eller flere af hjælpestofferne
- De lider af alvorlige sygdomme i hjerte eller kredsløb
- De har meget lavt blodtryk
- De har fået for meget hjertemedicin (digoxin). Kan bl.a. vise sig ved kvalme
- Det er mindre end en uge siden, De har haft en blodprop i hjertet
- De er overfølsom overfor anden medicin, der ligesom Isoptin® Retard tilhører gruppen af såkaldte calciumantagonister.

Vær ekstra forsigtig med at tage Isoptin® Retard hvis:

- De har meget langsom puls
- De har dårlig lever
- De er hjertesyg

Fortæl altid lægen at De tager Isoptin® Retard, hvis De skal bedøves.

Deres hjertekurve (EKG) og Deres blodtryk skal kontrolleres både før og under behandling med Isoptin® Retard.

De bør ikke drikke grapefrugtjuice eller spise grapefrugt under behandlingen.

De skal være opmærksom på, at Isoptin® Retard kan øge virkningen af alkohol.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at De er i behandling med Isoptin® Retard.

Brug af anden medicin:

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Tal med lægen hvis De tager:

- Hjertemedicin (digoxin og digitoxin)
- Medicin mod uregelmæssig puls (hjerterytme)
- Medicin mod astma (teofyllin)
- Epilepsimedicin (carbamazepin og phenobarbital)
- Depressionsmidler (imipramin)
- Medicin mod diabetes (glibenclamid)
- Medicin mod infektion (erythromycin, rifampin og telithromycin)

- Midler mod cancer (doxorubicin)
- Medicin mod angst og uro (buspiron og midazolam)
- Anden medicin mod højt blodtryk (betablokkere, metoprolol og propranolol)
- Mavesårsmedicin (cimetidin)
- Immunologiske lægemidler (cyclosporin, sirolimus og tacrolimus)
- Kolesterolsenkende medicin (atorvastatin, simvastatin og lovastatin)
- Medicin mod migræne (almotriptan)
- Medicin mod urinsyreigt (sulfipyrazon)
- Naturmedicin mod depression (perikum)
- Medicin mod mani (lithium)
- Samtidig behandling med acetylsalicylsyre kan øge blødningsrisiko
- Vanddrivende medicin
- Medicin som udvider blodårerne (prazosin og terazosin)

Graviditet og amning:

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De tager nogen form for medicin.

Graviditet:

De må kun bruge Isoptin® Retard efter lægens anvisning.

Amning:

Hvis De ammer, må De ikke bruge Isoptin® Retard, da verapamil hydrochlorid bliver udskilt i modermælken.

Trafik og arbejdssikkerhed:

Isoptin® Retard kan især i starten af behandlingen og ved øgning af dosis give blodtryksfald, som kan medføre svimmelhed, hvilket påvirker evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner i mindre eller moderat grad.

3. Sådan skal De tage Isoptin® Retard:

Dosering:

Depottabletterne må ikke knuses eller tygges.

Voksne:

240 mg 1-2 gange daglig

Børn:

Må ikke anvendes til børn.

Ældre:

Det er her nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning.

Nedsat nyre- og leverfunktion:

Det er her nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisning.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Har De taget for meget Isoptin® Retard?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget flere Isoptin® Retard, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet (og føler Dem utilpas). Symptomer på overdosering kan være: Døsigthed, forvirring, kramper, kvalme, opkastning, feberdøs, for lavt blodtryk og alvorlig ændring af hjertes funktion med langsom hjerterytme.

Har De glemt at tage Isoptin® Retard?

Glemmer De at tage en dosis, fortsættes med almindelig dosering. De må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

4. Bivirkninger.

Isoptin® Retard kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

Meget almindelige til almindelige bivirkninger (*forekommer hos mindre end 1 ud af 100 patienter*):

- Hjertesvigt med trykken i brystet og åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112

Almindelige bivirkninger (*forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter*):

- Alvorlige forstyrrelser i hjerterytmen med hurtig eller langsom, evt. uregelmæssig puls
- Kan føre til hjertestop og besvimelse
- Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke almindelige bivirkninger (*forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter*):

- Tarmslyng med voldsomme mavesmerter. Kontakt straks læge eller skadestue
- Forhøjede leverenzzymer

Sjældne bivirkninger (*forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter*):

- Meget hyppig uregelmæssig sammentrækning af hjertet, kredsløbskollaps og hjertestop
- Åndedrætsbesvær, kramper i bronkierne med øget slimsekretion (astmaanfald). Kontakt lægen
- Alvorlig hudreaktion med rund og rød udslet eller blæret udslet, betændelse og feber. Kontakt straks læge eller skadestue

Sjældne til meget sjældne bivirkninger (*forekommer hos færre end 1 ud af 1.000 patienter*):

- Besvimelse eller bevidstløshed på grund af dårlig hjertefunktion. Ring 112

Meget sjældne bivirkninger (*forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter*):

- Kramper i svælget med vejrtrækningsbesvær. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring 112
- Hævelse af tunge, læber og ansigt. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112
- Solfremkaldt betændelse i huden med blæredannelse
- Skældannende hudlidelse
- Rystelammelse (Parkinsons sygdom)

Ikke alvorlige bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger (*forekommer hos flere end 1 ud af 100 patienter*):

- Forstoppelse, fordøjelsesbesvær og kvalme

Meget almindelige til almindelige bivirkninger (*forekommer hos mindre end 1 ud af 100 patienter*):

- Kløe, eksem, nældefeber og hårtab
- Impotens, uregelmæssig menstruation og brystspændinger
- Hævede ankler
- Lavt blodtryk
- Langsom puls
- Svimmelhed, sløvhed, træthed og hovedpine

Almindelige bivirkninger (*forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter*):

- Søvnforstyrrelser og livlige drømme
- Ansigtsrødme
- Varmefølelse

Ikke almindelige bivirkninger (*forekommer hos 1 og 10 ud af 1000 patienter*):

- Overfølsomhed
- Forvirring, depression, mareridt og appetitmangel
- Øresusen
- Myrekryben, brænden, prikken og sovende fornemmelser i huden
- Rødfarvning af fødder og evt. hænder med brændende smerter
- Synsforstyrrelser
- Rysten
- Svimmelhed, forstyrrelse af balancesansen
- Brystsmerter og hjertebanken
- Smerter i benene ved gang (Claudicatio intermittens)
- Mundtørhed, diaré, mavesmerter og opkastning
- Muskelkramper
- Hyppige små vandladninger
- Udskillelse af mælk fra brystkirtlerne og øget behøring

Sjældne bivirkninger (*forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter*):

- Forstørrelse af mænds brystkirtler (gynækomasti)
- Mælkesekretion hos kvinder (galaktorré)
- Sveden

Sjældne til meget sjældne bivirkninger (*forekommer hos færre end 1 ud af 1.000 patienter*):

- Små runde blodudstrækninger i huden
- Muskel- og ledsmerter
- Mindre blødninger i hud og slimhinder
- Tandkød udvækst

Meget sjældne bivirkninger (*forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter*):

- Blå mærker

Der kan i sjældne tilfælde eller meget sjældne tilfælde optræde andre ikke alvorlige bivirkninger. Ønsker de information om disse bivirkninger, så spørg lægen eller apoteket.

Fortæl læge eller apotek, hvis De får andre bivirkninger end dem, der står her i informationen, således at bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive suppleret.

Fortæl læge eller apotek, hvis De får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: <http://www.laegemiddelstyrelsen.dk>

5. Opbevaring.

Opbevar Isoptin® Retard utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares over 25° C.

Brug ikke Isoptin® Retard efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger.

Isoptin® Retard indeholder:

Aktivt stof: Verapamil hydrochlorid 120 mg

Øvrige indholdsstoffer: Magnesiumstearat, hydroxymethylpropylcellulose, mikrokrystallinsk cellulose, montanglycol voks, natriumalginat, macrogol 400, macrogol 6000, rensset vand, povidon, talkum, titandioxid.

Pakningsstørrelser:

Isoptin® Retard 120 mg, 40 depottabletter

Isoptin® Retard 120 mg, 100 depottabletter

Alle pakningsstørrelser er nødvendigvis ikke markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

EuroPharmaDK, 6715 Esbjerg N.

Ompakket og frigivet af:

EuroPharmaDK, 6715 Esbjerg N.

Fremstiller:

Abbott GmbH & Co. KG, 67061 Ludwigshafen, Tyskland.

Isoptin® Retard er et registreret varemærke, der tilhører Abbott.