

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Tamsukon, 0,4 mg, hårde depotkapsler

Tamsulosinhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Tamsukon til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Tamsukons virkning og hvad De/du skal bruge det til
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Tamsukon
3. Sådan skal du tage Tamsukon
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer du Tamsukon
6. Yderligere oplysninger

1. TAMSUKONS VIRKNING OG HVAD DE/DU SKAL BRUGE DET TIL

I perioden inden operation bruges Tamsukon til behandling af symptomer, der er opstået som følge af godartet forstørrelse af blærehalskirtlen (benign prostatahyperplasi).

Ved brug af Tamsukon kan tidspunktet for operation udskydes væsentligt.

Lægen kan have givet dig Tamsukon til anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE TAMSUKON

Tag ikke Tamsukon

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for {det/de aktive stof(fer)} eller et af de øvrige indholdsstoffer

Vær ekstra forsigtig med at tage Tamsukon

- hvis du lider af abnormt lavt blodtryk ved skift fra liggende stilling, kan det medføre besvimelse. Hvis du føler dig svimmel eller svag, når du rejser dig op fra liggende stilling, skal du sætte eller lægge dig igen, og blive siddende/liggende, indtil symptomerne er forsvundet.
- hvis du har svært nedsat nyrefunktion.
- hvis du har svært nedsat leverfunktion.
- hvis du har grå stær. Hvis du skal opereres for grå stær, skal du i samråd med din læge stoppe behandlingen med Tamsukon 1-2 uger før planlagt operation.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, natur lsamt stvitaminer og mineraler.

Følgende lægemidler kan påvirke eller blive påvirket af brugen af Tamsukon:

- Andre alfa-1-receptorblokkere. Samtidig brug kan medføre lavt blodtryk (hyposensitive reaktioner).
- Phosphodiesterase-5-hæmmere (sildenafil, tadalafil, vardenafil). Kontakt lægen. Samtidig brug kan medføre lavr blodtryk og det er eventuelt nødvendigt at nedsætte dosis af af phosphodiesterase-5-hæmmere.

- Diclofenac og warfarin. Øger udskillelsen af tamsulosin.
- Cimetidin. Øger mængden af tamsulosin i blodet. Dosisændring er dog ikke nødvendig.
- Furosemid. Reducerer mængden af tamsulosin i blodet. Dosisændring er dog ikke nødvendig.

Brug af Tamsukon sammen med mad og drikke

Du skal tage Tamsukon efter morgenmaden eller efter dagens første måltid.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Tamsukon kan hos enkelte give bivirkninger (svimmelhed), som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Tamsukon

Tamsukon indeholder saccharose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGETAMSUKON

Tag altid Tamsukon nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller **på** apoteket.> Den sædvanlige dosis er 1 depotkapsel (0,4 mg) daglig indtaget efter morgen maden eller efter dagens første måltid.

Depotkaplen skal synkes hel og bør ikke tygges

Ældre

Det er ikke nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Nedsat nyrefunktion

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis ved alvorlig nedsat nyrefunktion. Følg lægens anvisninger.

Nedsat leverfunktion

Det er normalt ikke nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange Tamsukon, hårde depotkapsler

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Tamsukon depotkapsler, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Hvis du har glemt at tage Tamsukon

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du har glemt at tage en Tamsukon efter dagens første måltid, kan du stadig tage kapslen senere samme dag.

Hvis du har sprunget en dag over, skal du blot fortsætte med en kapsel dagligt, som ordineret.

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget du er i tvivl om eller føler dig usikker på.

4. BIVIRKNINGER

Tamsukon kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Den mest almindelige bivirkning er svimmelhed, der optræder hos 1-2 % af patienterne.

Ikke alvorlige bivirkninger

- *Almindelige bivirkninger* (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): Svimmelhed.

- *Ikke almindelige bivirkninger* (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter): Hovedpine, hjertebanken, abnormt lavt blodtryk ved skift fra liggende til stående stilling, snue (rhinitis), forstoppelse, diarré, kvalme, opkastning, udslæt, kløe, nældefeber, abnormal sæduttømmelse, træthed.
- *Sjældne bivirkninger* (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): Besvimelseanfald, angioødem (ødemdannelse i slemhinder).
- *Meget sjældne bivirkninger* (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): Vedvarende, ofte smertefulde, rejsninger af penis (priapisme).

Der er under operation for grå stær set tilfælde af lille pupil syndrom, som menes at være forbundet med tamsulosinbehandling (se Vær ekstra forsigtig med at tage Tamsukon).

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Nye bivirkninger bør inberettes i Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted:

<http://www.laegemiddelsyrelsen.dk/>.

5. SÅDAN OPBEVARER DU TAMSUKON

Opbevares utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Tamsukon ved almindelig temperatur. Brug ikke Tamsukon efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Tamsukon, hårde depotkapsler indeholder:

- Aktivt stof: Tamsulosinhydrochlorid 0,4 mg pr. depotkapsel
- Øvrige indholdsstoffer: Saccharosekugler, majsstivelse, hypromellose, talcum, propylenglycol, polysorbat 80, kolloid silica, ethylcellulose, methacrylsyre-ethylacrylat copolymer (1:1), triethylcitrat, gelatine, natriumlaurilsulfat, farvestoffer E 110, E 122, E 131, titandioxid E 171.

Udseende og pakningstørrelse

Tamsukon findes i blisterkort á 10 kapsler i 10, 14, 15, 20, 21, 25, 28, 30, 40, 50, 60, 90, 100 og 5 x 20 stk. pakninger.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

BMM Pharma AB, Blasiegatan 2, 111 48 Stockholm, Sverige

Dansk repræsentant:

BioPhausia A/S, Gydevang 39-41, 3450 Allerød

Fremstiller

Basic Pharma Manufacturing B.V. , Burgemeester Lemmensstraat 352, 6163 JT Geleen, Nederlandene

Denne indlægsseddel blev senest revideret oktober 2007

Du kan finde produktresuméet for Tamsukon på www.produktresume.dk.