

Canesten® 100 mg og 500 mg vaginaltabletter

Læs denne information godt igennem før du begynder at bruge medicinen.

- Du kan få denne medicin uden recept.
- For at få den bedste virkning, skal du altid følge vejledningerne i denne information.
- Gem informationen, du får måske brug for at læse den igen.
- Ønsker du mere information, så kontakt læge eller apotek.
- Hvis du ikke har fået det bedre inden 3 dage, eller hvis du har fået det værre, skal du kontakte lægen.

1. Virkning og anvendelse

Virkemåde

Til behandling af svampeinfektioner i skeden (vagina). Infektionerne skyldes hovedsagligt gærsvampe (Candida albicans).

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Vigtig information, som du skal læse, før du bruger Canesten®

Brug ikke Canesten® hvis

Du er overfølsom over for clotrimazol eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Canesten®.

Særlige forholdsregler

- Bør ikke anvendes til unge kvinder under 15 år, og kvinder i og efter overgangsalderen, uden forudgående kontakt med lægen, for at udelukke sygdomme som klamydia og kræft.
- I tilfælde af hyppigt gentagne infektioner over en længere periode, bør lægen kontaktes, for at udelukke eventuelle sygdomme der øger risikoen for svampeinfektion, f.eks. sukkersyge.
- Bør ikke anvendes samtidig med brug af kondom eller pessar, idet visse indholdsstoffer i Canesten® kan nedsætte sikkerheden af disse typer prævention.
- Hvis symptomerne forværres, eller ikke er bedre efter 3 dage, bør lægen kontaktes.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Canesten®

Ingen relevante informationer.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du tager nogen form for medicin.

Graviditet:

- Du kan bruge Canesten® under graviditet.
- Hvis Canesten® anvendes under graviditet, bør man undgå at anvende applikator.

Amning:

- Du kan amme selv om du bruger Canesten®.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Canesten® påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Brug af anden medicin

Ingen kendte problemer.

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

3. Sådan skal du bruge Canesten®

Dosering

Bør ikke anvendes under menstruation.

Ved samtidig infektion på skamlæberne, anbefales behandling kombineret med Canesten® 1 % creme eller 1 % vaginalcreme.

Smør cremen på det angrebne område 2-3 gange daglig i 1-2 uger og indtil 3 dage efter symptomerne er væk.

Voksne (fra 15 år og derover):

6 dages behandling:

1 vaginaltablet (100 mg) indføres dybt i skeden ved sengetid i 6 dage.

1 dages behandling:

1 vaginaltablet (500 mg) indføres dybt i skeden ved sengetid som engangsdosis.

Din seksualpartner bør kun behandles ved symptomer (f.eks. kløe og rødme) og efter samråd med lægen.

Smør Canesten® creme eller 1 % vaginalcreme på det angrebne område 2-3 gange daglig i 1-2 uger, indtil symptomerne er væk.

Vaginaltabletterne indføres ved at anvende applikatoren i pakningen.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændringer eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Under graviditet bør vaginaltabletterne indføres med fingrene uden brug af applikatoren for at undgå beskadigelse af livmoderhalsen.

Brugsanvisning

Indføring af vaginaltablet med brug af applikator (indføringshylster):

1. Åbningen i applikatoren klemmes let sammen, så der dannes en oval åbning. Placer vaginaltabletten i applikatoren med spidsen udad.



2. Før forsigtigt applikatoren så langt op i skeden som muligt (dette gøres nemmest liggende på ryggen med let bøjede ben).



3. Tryk derefter stemplet ind, hvorved vaginaltabletten placeres i skeden. Applikatoren fjernes.

Kun vaginaltabletter 100 mg:

4. Træk stemplet ud af applikatoren efter brug og vask delene i varmt (ikke kogende) sæbevand. Skyl i rindende vand og tør omhyggeligt.



**Indføring af
vaginaltablet uden
brug af applikator
(indføringshylster):**

Vaginaltabletten
indføres dybt i
skeden.



Har du brugt for mange Canesten®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt flere Canesten®, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet.

Har du glemt at bruge Canesten®

Glemmer du at bruge en dosis, fortsættes med almindelig dosering.
Brug aldrig dobbelt dosis.

4. Bivirkninger

Canesten® kan som al anden medicin give bivirkninger.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Kløe, hududslæt, en brændende fornemmelse og rødmen.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Allergiske reaktioner.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her i informationen, således at bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive suppleret.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted:

<http://www.laegemiddelstyrelsen.dk>

5. Opbevaring

- Opbevar Canesten® utilgængeligt for børn.
- Anvend ikke Canesten® efter den udløbsdato, der er anført på pakningen.
- Canesten® 500 mg bør ikke opbevares over 30° C.

6. Yderligere information

Aflever altid eventuelle medicinrester på apoteket.

Canesten® indeholder

Det virksomme indholdsstof i Canesten® 100 mg er:

Clotrimazol 100 mg.

De øvrige indholdsstoffer er:

Calciumlactatpentahydrat, majsstivelse, crospovidon, vandfri kolloid silica, mælkesyre, lactosemonohydrat, magnesiumstearat, hypromellose og mikrokrySTALLinsk cellulose.

Det virksomme indholdsstof i Canesten® 500 mg er:

Clotrimazol 500 mg.

De øvrige indholdsstoffer er:

Vandfrit lactose, mikrokrySTALLinsk cellulose, mælkesyre, majsstivelse, povidon, calciumlactat, magnesiumstearat, silica og hypromellose.

Pakningsstørrelser:

Canesten® 100 mg, 6 vaginaltabletter

Canesten® 500 mg, 1 vaginaltablet

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Udseende:

Canesten® 100 mg, hvid vaginaltablet mærket Bayer på den ene side og AD på den anden side.

Canesten® 500 mg, hvid vaginaltablet mærket Bayer på den ene side og MU på den anden side.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

EuroPharmaDK, 6715 Esbjerg N.

Canesten® er et registreret varemærke, der tilhører Bayer.