

Mycostatin® 100.000 IE/ml oral suspension

Nystatin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge medicinen

- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
- Lægen har ordineret Mycostatin® til Dem personligt. Lad derfor være med at give Mycostatin® til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Mycostatin®
3. Sådan skal De bruge Mycostatin®
4. Bivirkninger
5. Opbevaringer
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Mycostatin® er en gul svampedræbende opslæmning.

De kan bruge Mycostatin® til behandling af svamp i mund, svælg, mave og tarm.

Det virksomme indholdsstof nystatin, optages ikke i kroppen. Det virker kun på slimhinder i mundhulen og i mavetarmkanalen.

Lægen kan have givet Dem Mycostatin for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT BRUGE MYCOSTATIN®

Brug ikke Mycostatin®

- hvis De er overfølsom (allergisk) over for nystatin eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Mycostatin®

Brug kun Mycostatin® til behandling af svamp i mund, svælg og tarm.

Ved irritation og overfølsomhed skal De standse behandlingen med Mycostatin®. Tal med lægen.

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Brug af Mycostatin® sammen med mad og drikke

Det er bedst at bruge Mycostatin® efter et måltid.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før De bruger nogen form for medicin.

Graviditet

De kan bruge Mycostatin® under graviditet.

Amning

De kan amme, selv om De bruger Mycostatin®.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Mycostatin® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Mycostatin®

Indeholder saccharose. Kontakt lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter.

Mycostatin® indeholder en mindre mængde alkohol, mindre end 100 mg pr. dosis.

Derudover indeholder Mycostatin® methylparahydroxybenzoat (E 218) og propylparahydroxybenzoat (E 216), der kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen).

3. SÅDAN SKAL DE TAGE MYCOSTATIN®

Brug altid Mycostatin® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Husk at ryste flasken grundigt inden brug.

Den sædvanlige dosis er

Svampeinfektion i munden

Voksne, børn og spædbørn: 1 ml 4 gange daglig.

Den normale behandlingstid ved svamp i mundhulen er 4-6 uger.

Lægen kan anbefale større dosis.

Det er bedst, at De tager Mycostatin® efter et måltid. Hold suspensionen i munden så længe som muligt, før De synker den.

Hos spædbørn kan De give suspensionen dråbevis eller fortynde den med vand og smøre den på det angrebne område.

Svampeinfektion i mave og tarm:

Voksne: 5 ml 3 gange daglig.

Lægen kan anbefale større dosis.

Børn og spædbørn:

1 ml 4 gange daglig.

Slug suspensionen med det samme.

For at undgå at svampeinfektionen kommer igen, skal De fortsætte med behandlingen 2-3 dage efter at symptomerne er væk.

Hvis De har brugt for meget Mycostatin®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Mycostatin® end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas.

Symptomer på overdosering er kvalme, opkastninger og diaré.

Hvis De har glemt at bruge Mycostatin®

Indtag den glemte dosis så snart De kommer i tanke om det. De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

4. BIVIRKNINGER

Mycostatin® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne – meget sjældne bivirkninger:

Forekommer hos færre end 1-10 ud af 10.000 patienter.

Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos 1-10 ud af 1000 patienter.

Kvalme, opkastning, sure opstød, diaré, udslæt og nældefeber.

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter. Overfølsomhed.

Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. De eller Deres pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Mycostatin® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester til apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Mycostatin® oral suspension indeholder:

- Aktivt stof: Nystatin 100.000 IE/ml.
- Øvrige indholdsstoffer: Saccharose 500 mg/ml; saccharinnatrium 0,8 mg/ml; ethanol 0,01 ml/ml; glycerol; carboxymethylcellulosenatrium; dinatriumhydrogenfosfat; methylparahydroxybenzoat (E218); propylparahydroxybenzoat (E216); kirsebæraroma; pebermynteessens; kanelaldehyd og rensed vand.

Pakningsstørrelser

Mycostatin® fås i pakninger med 60 ml, 2x60 ml og 100 ml.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

EuroPharmaDK
Tarp Byvej 81-83
6715 Esbjerg N.

Ompakket og frigivet af

EuroPharmaDK
Tarp Byvej 81-83
6715 Esbjerg N.

Mycostatin® er et registreret varemærke, der tilhører E.R. Squibb & Sons, L.L.C.