

Atacand® 32 mg tabletter

Candesartan cilexetil

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
- Lægen har ordineret Atacand til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Atacands virkning og hvad De skal bruge det til
2. Det skal De vide, før De begynder at tage Atacand
3. Sådan skal De tage Atacand
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer De Atacand
6. Yderligere oplysninger

1. Atacands virkning og hvad De skal bruge det til

Atacand tilhører gruppen af medicin, som kaldes for angiotensin II antagonister. Det sætter blodtrykket ned.

De kan bruge Atacand:

- ved behandling af for højt blodtryk.
- ved hjertesvigt.
- sammen med anden hjertemedicin (ACE-hæmmere) eller
- hvis De ikke tåler anden hjertemedicin (ACE-hæmmere).

Lægen kan have givet Dem Atacand til anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Atacand

Tag ikke Atacand, hvis:

- De er overfølsom over for det aktive stof candesartan cilexetil eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- De er gravid eller planlægger at blive det.
- De ammer.
- De har nedsat leverfunktion.
- De har sygdom i galdevejene med gulsot.

Vær ekstra forsigtig med at tage Atacand

Tal med lægen, inden De tager Atacand, hvis De:

- har dårlige nyrer.
- for nylig har fået en nyretransplantation.
- har dårligt hjerte (forsnævring af hjertets klapper, hovedpulsåren, eller alvorligt hjertesvigt).
- er over 75 år.
- er i dialysebehandling.
- har meget lavt blodtryk.
- har overproduktion af hormoner i binyrerne (primær hyperaldosteronisme).

Hvis De skal opereres, er det vigtigt, at De fortæller lægen eller tandlægen, at De tager Atacand.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at De er i behandling med Atacand. Det kan have betydning for prøveresultaterne.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Tal med Deres læge, hvis De tager:

- anden blodtrykssænkende medicin.

- vanddrivende medicin, som indeholder kalium, kaliumtilskud eller kaliumholdig salterstatning.
- anden medicin, som kan give forhøjet kaliumindhold i blodet.
- medicin mod mani og depression (lithium).
- medicin mod gigt (selektive COX-2 hæmmere f.eks. celecoxib).
- medicin mod smerter og infektion (acetylsalicylsyre, NSAID f.eks. ibuprofen).

Brug af Atacand sammen med mad og drikke

De kan tage Atacand i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. De skal tage Atacand med mindst ½ glas vand.

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apoteket, før De tager nogen form for medicin.

Graviditet:

De må ikke tage Atacand, hvis De er gravid, eller planlægger at blive det. Atacand kan skade fostret.

Amning:

De må ikke tage Atacand, hvis De ammer, da Atacand kan skade barnet. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Atacand kan give bivirkninger (svimmelhed, træthed), der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Atacand

Atacand indeholder lactose. Kontakt lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal De tage Atacand

Tag altid Atacand nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

De skal helst tage Atacand på samme tid hver dag, f.eks. om morgenen.

Vær opmærksom på, at De ikke kan bruge Atacand 32 mg til alle de anførte doseringer eller anvendelsesområder

Den sædvanlige dosis er

Forhøjet blodtryk:

Startdosis og sædvanlig vedligeholdelsesdosis er 8 mg 1 gang daglig. Lægen kan øge dosis til ½ tablet 1 gang daglig. De må højst tage 1 tablet 1 gang daglig. Lægen vil ordinere den dosis, der er nødvendig for Dem. Følg lægens anvisning.

Ældre:

Det er ikke nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Nedsat nyrefunktion:

Hvis De har let eller moderat nedsat nyrefunktion er startdosis 4 mg.

De må kun tage Atacand efter aftale med lægen, hvis De har alvorlig nedsat nyrefunktion. Følg lægens anvisninger.

Nedsat leverfunktion:

Hvis De har let eller moderat nedsat leverfunktion er startdosis 2 mg.

De må kun tage Atacand efter aftale med lægen, hvis De har alvorlig nedsat leverfunktion. Følg lægens anvisninger.

Patienter med sort hudfarve:

Hvis De har sort hudfarve, kan virkningen af Atacand på blodtrykket være mindre. De skal måske have en større dosis af Atacand eller have anden medicin samtidigt. Tal med lægen.

Hjertesvigt:

Startdosis er 4 mg 1 gang daglig. Lægen vil ordinere den dosis, der er nødvendig for Dem. De må højst tage 1 tablet. Følg lægens anvisning.

Ældre:

Det er ikke nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Børn og unge:

De må kun bruge Atacand til børn eller unge under 18 år efter aftale med lægen.

Nedsat nyrefunktion:

Det er ikke nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Nedsat leverfunktion:

Det er ikke nødvendigt at nedsætte dosis, hvis De har let til moderat nedsat leverfunktion. De må kun tage Atacand efter aftale med lægen, hvis De har alvorlig nedsat leverfunktion. Følg lægens anvisninger.

Hvis De har taget for mange Atacand

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget flere Atacand, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet. Tag pakningen med. De kan få lavt blodtryk og svimmelhed.

Hvis De har glemt at tage Atacand

Tag aldrig dobbelt dosis, hvis De har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Hvis De holder op med at tage Atacand

Kontakt lægen, hvis De ønsker at afbryde eller stoppe med behandlingen med Atacand. Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om eller føler Dem usikker på.

4. Bivirkninger

Atacand kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

- Hævelse af ansigt, læber og tunge; det kan medføre at luftvejene blokeres. Ring 112.
- Almen sløvhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt straks læge.
- Leverbetændelse med gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
- Nedsat nyrefunktion, nyresvigt med kvalme, opkastninger, almen sløvhed, aftagende urindannelse hos særlig udsatte patienter. Kontakt straks læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

- For højt kalium i blodet, som kan vise sig ved muskelsvaghed og forvirring, evt. talebesvær og lammelser. Kan blive alvorligt (risiko for hjertestop). Kontakt læge eller skadestue.
- Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og -kramper, forvirring, koma pga. for lavt natrium i blodet. Kan blive alvorligt. Kontakt læge eller skadestue.
- Luftvejsinfektion (forkølelseslignende symptomer, bronchitis, lungebetændelse).
- Svimmelhed evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
- Nedsat nyrefunktion.
- Hovedpine.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

- Rygsmerter, smerter i leddene, muskelsmerter.
- Udslæt, nældefeber, kløe.
- Kvalme.

Atacand kan herudover give bivirkninger, som De normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, som forhøjede levertal (leverprøver).

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Nye bivirkninger bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden kan blive bedre. De eller Deres pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

De finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: <http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>.

5. Sådan opbevarer De Atacand

Opbevar Atacand utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Atacand ved temperaturer over 30° C.

Tag ikke Atacand efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Atacand 32 mg tabletter indeholder:

Aktivt stof: candesartan cilexetil.

De øvrige indholdsstoffer: calcium carboxymethylcellulose, hydroxy-propylcellulose, lactosemonohydrat, magnesiumstearat, majsstivelse, macrogol og jernoxid rød (E 172).

Atacands udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Atacand 32 mg er runde, lyserøde tabletter med delekærv og mærket A_{CL} på den ene side og 032 på den anden side.

Pakningsstørrelser

Atacand 32 mg findes i pakningsstørrelserne 28 stk. og 98 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

Indehaver af markedsføringstilladelsen

SinGad Pharma ApS.

Vibe Allé 5, blok 2B

2980 Kokkedal.

Fremstiller

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A., Spanien

Atacand® er et registreret varemærke, som tilhører AstraZeneca koncernen

Denne indlægsseddel blev sidst revideret november 2007.