

Indlægsseddel: information til brugeren

Atacand® Plus 16 mg/12,5 mg tabletter

Candesartan cilexetil/hydrochlorthiazid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen

- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
- Lægen har ordineret Atacand Plus til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkningen af Atacand Plus og hvad De skal bruge det til
2. Det skal De vide, før De begynder at tage Atacand Plus
3. Sådan skal De tage Atacand Plus
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer De Atacand Plus
6. Yderligere oplysninger

1. Virkningen af Atacand Plus og hvad De skal bruge det til
Atacand Plus er sammensat af to slags medicin, en angiotensin II antagonist (candesartan cilexetil) og vanddrivende medicin (hydrochlorthiazid). Det nedsætter blodtrykket.

De kan tage Atacand Plus ved for højt blodtryk, hvis behandling med én slags medicin ikke er nok.

Lægen kan have givet Dem Atacand Plus til anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Atacand Plus Tag ikke Atacand Plus, hvis

- De er overfølsom over for candesartan cilexetil eller hydrochlorthiazid eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- De er overfølsom over for antibiotika (sulfonamider).
- De er gravid eller ammer.
- De har dårlig lever eller sygdom i galdevejene.
- De har unormalt lave værdier af kalium eller høje værdier af calcium i blodet, og årsagen ikke er kendt.
- De har eller har haft urinsur gigt.

Vær ekstra forsigtig med at tage Atacand Plus

Kontakt læge, hvis De får udslæt i ansigt, nyrebetændelse, feber, led- og muskelsmerter på grund af bindevævssygdom (SLE, systemisk lupus erythematosus).

Tal med lægen inden De tager Atacand Plus, hvis De:

- har dårlig nyrer.
- for nylig har fået en nyretransplantation.
- har dårlig lever.
- har dårligt hjerte (forsnævring af hjertets klapper, hovedpulsåren eller alvorlig hjertesvigt).
- har overproduktion af hormoner i binyrerne (primær hyperaldosteronisme) har allergi eller astma, da De kan være overfølsom over for hydrochlorthiazid.
- har diabetes. De skal måske have ændret dosis.
- er i behandling med vanddrivende medicin, får kaliumtilskud eller kaliumholdig salterstatning.
- får anden medicin, som kan give forhøjet kalium i blodet (f.eks. heparin).

Atacand Plus kan give:

- problemer med salt- og væskebalancen, det kan derfor være nødvendigt at lægen tager blodprøver.
- lavt blodtryk med svimmelhed og evt. besvimelse, hvis De har salt- og væskemangel.
- uregelmæssig puls pga. for lavt magnesium i blodet. Kan blive alvorligt (risiko for hjertestop). Tal med lægen.

Atacand Plus kan fremkalde anfald af urinsur gigt, hvis De har tilbøjelighed til det.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at De er i behandling Atacand Plus. Det kan have betydning for prøveresultaterne.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Tal med Deres læge, hvis De er i behandling med:

- anden medicin mod for højt blodtryk.
- vanddrivende medicin der indeholder kalium.
- kaliumtilskud eller kaliumholdig salterstatning.
- anden medicin, som kan give for højt kalium i blodet (f.eks. heparin).
- afføringsmidler.
- svampemiddel (amfotericin).
- medicin mod for meget mavesyre (carbenoxolon).
- antibiotika (G-penicillinnatrium).
- hjertemedicin (f.eks. digoxin).
- medicin mod for højt blodtryk (f.eks. betablokkere).
- medicin mod mani og depression (lithium).
- visse smertestillende medicin og medicin mod urinsur gigt (NSAID, acetylsalicylsyre).
- kolesterolsænkende medicin (colestipol eller cholestyramin).
- tilskud af calcium eller vitamin D.
- stoffer der påvirker nervesystemet (f.eks. atropin eller biperiden).
- medicin mod Parkinsons sygdom (amantadin).
- medicin der hæmmer immunforsvaret (f.eks. cyclofosamid og methotrexat).
- steroider eller visse hormoner (ACTH).
- insulin eller tabletter mod diabetes.

Hvis De skal scannes eller have en røntgenundersøgelse, skal De fortælle lægen, at De tager Atacand Plus.

Tager De Atacand Plus sammen med alkohol, kan De blive svimmel eventuelt besvime, hvis De skifter fra liggende til siddende eller fra siddende til stående stilling.

Hvis De skal opereres, er det vigtigt, at De fortæller lægen eller tandlægen, at De tager Atacand Plus.

Brug af Atacand Plus sammen med mad og drikke

De kan tage Atacand Plus i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. De skal tage Atacand Plus med et glas vand.

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De tager nogen form for medicin.

Graviditet:

De må ikke tage Atacand Plus, hvis De er gravid. Det kan skade fostret.

Amning:

De må ikke tage Atacand Plus, hvis De ammer. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Atacand Plus kan hos enkelte give bivirkninger (svimmelhed, træthed), som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Atacand Plus

Atacand Plus indeholder lactose. Kontakt lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal De tage Atacand Plus

Tag altid Atacand Plus nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

De kan tage Atacand Plus i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Atacand Plus virker normalt bedst muligt efter 4 uger.

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 1 tablet 1 gang daglig.

Ældre: Det er ikke nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Ved væske- og/eller saltmangel: Det er her nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning.

Nedsat nyre- og leverfunktion:

Har De let til moderat nedsat nyre- eller leverfunktion, er det nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning.

De må ikke tage Atacand Plus, hvis De har alvorligt nedsat nyre- eller leverfunktion.

Børn: De må kun bruge Atacand Plus til børn efter aftale med lægen.

Hvis De har taget for mange Atacand Plus

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget flere Atacand Plus, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering er svimmelhed, for lavt blodtryk, tørst, hurtig puls, uregelmæssige puls, sløvhed/nedsat bevidsthed, muskelkrampe.

Hvis De har glemt at tage Atacand Plus

Har De glemt at tage en dosis, skal De fortsætte med Deres sædvanlige dosis. Tag ikke dobbelt dosis.

Hvis De holder op med at tage Atacand Plus

Kontakt lægen, hvis De ønsker at holde pause med eller stoppe behandlingen med Atacand Plus. Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om eller føler Dem usikker på.

4. Bivirkninger

Atacand Plus kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Svimmelhed.

Atacand indeholder to stoffer, candesartan cilexetil og hydrochlorthiazid. Nedenfor anføres bivirkningerne for de to stoffer hver for sig.

Candesartan cilexetil:

Alvorlige bivirkninger

Hypigheden er ikke kendt (sandsynligvis sjælden):

- Almen sløvhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt læge.
- Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
- Nedsat nyrefunktion med aftagende eller ophørt urinproduktion, nyresvigt. Kontakt snarest læge.

Ikke alvorlige bivirkninger

Hypigheden er ikke kendt (sandsynligvis sjælden):

- Nædefeber med hævelse. I alvorlige tilfælde med hævelse af ansigt, læber og tunge. Det kan medføre, at luftvejene blokeres. I alvorlige tilfælde ring 112.
- Muskelsvaghed, forvirring, talebesvær, lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme pga. for højt kalium i blodet. Kan blive alvorligt (risiko for hjertestop). Tal med lægen.
- Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og krampes, forvirring, koma pga. for lavt natrium i blodet. Kan blive alvorligt. Tal med lægen.
- Hovedpine, kvalme.
- Hududslæt, kløe.
- Rygsmerter, muskelsmerter, ledsmerter.

Candesartan cilexetil kan herudover give bivirkninger, som De normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. forhøjede levertal (leverprøver) og unormal leverfunktion.

Hydrochlorthiazid:

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Nedsat nyrefunktion med aftagende eller ophørt urinproduktion og nyresvigt på grund af nyrebetændelse. Kontakt snarest læge.

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Åndenød, hoste, smerter eller ubehag i brystet på grund af vand i lungerne. Ring 112.
- Pludselige overfølsomhedsreaktioner (inden for minutter til timer), f.eks. hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
- Uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Betændelse i bugspytkirtlen med voldsomme mavesmerter og feber. Kontakt straks læge eller skadestue.
- Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt straks læge eller skadestue.
- Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt straks læge.
- Almen sløvhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer og blodplader). Kontakt straks læge.
- Svær blodmangel med træthed og bleghed, evt. tendens til halsbetændelse og blødninger i huden. Kontakt læge.
- Udslæt i ansigt, nyrebetændelse, feber, led- og muskelsmerter (lupus erythematosus). Kontakt læge.
- Opblussen af hudsygdommen lupus erythematosus. Kontakt læge.
- Lungebetændelse. Kontakt læge.
- Gulsot med hudkløe. Kontakt læge.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker (blodglukose). Kan være alvorligt. Tal med lægen.
- Svaghed og nedsat kraft i musklerne, lammelser, forstyrrelser i hjertets rytme pga. for lavt kalium i blodet. Kan være alvorligt (risiko for hjertestop). Tal med lægen.
- Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og krampes, forvirring, koma pga. for lavt natrium i blodet. Kan være alvorligt. Tal med lægen.
- Omtågethed, svimmelhed.
- Svaghed.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter):

- Svimmelhed evt. besvimelse ved skift fra liggende eller siddende eller fra siddende til stående stilling pga. lavt blodtryk.
- Appetitløshed.
- Maveirritation, diaré, forstoppelse.
- Hududslæt, nædefeber.
- Øget følsomhed af huden for lys.

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Feber, træthed, sløvhed pga. bindevævssygdom med betændelse i blodkar. Kan være alvorlig. Kontakt læge.
- Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
- Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.
- Synsforstyrrelser, som forsvinder igen efter De er stoppet med behandlingen.
- Stive, rykvisse bevægelser.
- Søvnforstyrrelser, rastløshed.
- Feber.

Hydrochlorthiazid kan herudover give bivirkninger, som De normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. forhøjet urinsyre, urinstof og kreatinin i blodet, øget risiko for åreforkalkning pga. forhøjet fedt (triglycerider og kolesterol) i blodet.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Nye bivirkninger bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. De eller Deres pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted: <http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>

5. Sådan opbevarer De Atacand Plus

Opbevar Atacand Plus utilgængeligt for børn.

De kan opbevare Atacand Plus ved almindelig temperatur.

Tag ikke Atacand Plus efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Atacand Plus 16 mg/12,5 mg tabletter indeholder

Aktive stoffer: candesartan cilexetil 16 mg og hydrochlorthiazid 12,5 mg. Øvrige indholdsstoffer: carmellosecalcium, hydroxypropylcellulose, lactosemonohydrat, magnesiumstearat, majsstivelse, macrogol 8000 og jernoxid rød-brun (E 172), jernoxid gul (E 172).

Udseende af Atacand Plus og pakningsstørrelse:

Udseende

Atacand Plus er en ferskenfarvet, oval tablet med delekærv på begge sider og mærket A/CS.

Pakningsstørrelse

Blisterpakninger med 28 og 98 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

SinGad Pharma ApS, Vibe Allé 5, blok 2B, 2980 Kokkedal.

Fremstiller

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

Atacand® er et registreret varemærke, som tilhører AstraZeneca koncernen.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret januar 2008