

Fucicort®

Creme 20 mg/g + 1 mg/g fusidinsyre/betamethason

- Læs denne information godt igennem, før De begynder at tage medicinen.
- Gem denne information, De får måske brug for at læse den igen.
- Ønsker De mere information, så kontakt læge eller apotek.

Indholdsfortegnelse:

1. Virkning og anvendelse.
2. Vigtig information som De skal læse, før De bruger Fucicort®.
3. Sådan skal De bruge Fucicort®.
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring.
6. Yderligere information.

1. Virkning og anvendelse

Fucicort® creme er et kombinationspræparat, som indeholder et antibiotikum (fusidinsyre) og et stærkt binyrebarkhormon (betamethasonvalerat). Fusidinsyre virker ved at hæmme bakteriers vækst, og betamethason virker ved at hæmme betændelse og dæmpe kløe.

De kan bruge Fucicort® mod hudsygdomme med betændelse.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Vigtig information som De skal læse, før De bruger Fucicort®.

Brug ikke Fucicort® hvis:

- De er overfølsom over for fusidinsyre, betamethason eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer.

Brug ikke Fucicort® mod:

- en betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme, især på næsen, på kinderne og i panden (rosacea).
- betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatitis).
- bumser eller på områder med bumser.
- hudsygdomme som kun skyldes svamp, bakterier eller virus (f.eks. herpes, helvedesild eller skoldkopper).

Særlige forholdsregler

- Brug kun Fucicort® i nøje samråd med Deres læge ved behandling af børn, ansigt, store hudområder, under tætsluttende bandager eller på hudfolder.
- Brug ikke Fucicort® længere end højst nødvendigt og ikke mere end fire uger uden aftale med lægen.
- Undgå at få Fucicort® i øjnene, i åbne sår eller på slimhinder.
- Undgå påsmøring på beskadiget hud, tynd og skør hud eller bumser.
- Brug kun Fucicort® kortvarigt (mod kløe) omkring endetarm eller kønsorganer.
- Fucicort® kan sløre en betændelse og forsinke helingen af en betændelse.

- Kontakt lægen, hvis der kommer overfølsomhed (irritation, rødme, kløe og svien).
- Deres binyrers dannelse af hormoner kan blive nedsat, når De bruger Fucicort® i længere tid. Fortæl derfor lægen, at De bruger Fucicort®, hvis De er kommet alvorligt til skade, har en svær betændelse (f.eks. lungebetændelse) eller skal opereres.
- Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at De er i behandling med Fucicort®.

Ved ophør efter lang tids behandling, skal De nedtrappe behandlingen langsomt for at forhindre opblussen af sygdommen med rødme, svien og brænden i huden. Hvis De har psoriasis kan pludselig ophør af behandlingen give forværring af Deres psoriasis.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Fucicort®:

Fucicort® creme indeholder:

- Chlorcresol, der kan give allergiske reaktioner.
- Cetostearylalkohol, der kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem).

Graviditet og amning:

Få vejledning hos lægen eller apoteket før De tager nogen form for medicin.

Graviditet

De må kun bruge Fucicort® creme efter lægens anvisning.

Amning

De kan bruge Fucicort® i korte perioder, selv om De ammer. Spørg lægen. De må ikke smøre Fucicort® creme på brystet når De ammer.

Trafik og arbejdssikkerhed

Fucicort® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig, det gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin som er købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

De kan bruge Fucicort® sammen med anden medicin.

3. Sådan skal De bruge Fucicort®

Dosering

Voksne og børn:

Påsmør et tyndt lag 2-3 gange daglig.

Brugervejledning

De må kun bruge Fucicort® på betændt hud. De skal vaske hænder, hver gang De har påsmurt cremen, med mindre De skal behandle hænderne.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Har De brugt for meget Fucicort®?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har brugt mere af Fucicort®, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas.

I sjældne tilfælde med langvarig og overdreven brug af binyrebarkhormon, kan De få rødt, rundt måneansigt, mindre muskler, uønsket behåring, blålige striber i huden, øgede fedtdepoter på maven og i nakken samt en række af de bivirkninger, som står i bivirkningsafsnittet.

Har De glemt at bruge Fucicort®?

Har De glemt at påsmøre Fucicort® creme, skal De blot fortsætte behandlingen som hidtil.

4. Bivirkninger

Fucicort® creme kan som al anden medicin give bivirkninger.

Bivirkninger kommer især hvis De bruger lufttæt forbinding og ved lang tids overdreven behandling.

Alvorlige bivirkninger

Hyppighed er ikke kendt:

- Risiko for alvorlig shocktilstand ved tilskadekomst, operation eller svær betændelse (f.eks. lungebetændelse).
- Øget fedt på maven og i nakken, kuglerundt, rødt ansigt, sukkersyge, for højt blodtryk, nedsat muskelmasse. Kontakt lægen.
- Børn kan vokse mindre og tage mindre på i vægt end normalt. Kontakt lægen.
- Børn kan få vedvarende hovedpine eller ondt i øjnene på grund af forhøjet tryk i hjernen. Kontakt lægen.
- Psoriasis med pusfyldte knopper på hænder og fødder eller over hele kroppen. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (ses hos mellem 1 og 10 ud af 1000 behandlede):

- Udslæt, forværring af eksem ved ophør af behandlingen, hudirritation, kløe, brændende eller stikkende fornemmelse i huden.

Hyppighed er ikke kendt:

Overfølsomhed, nældefeber, kontakteksem, rødme i huden, tør hud. Især ved langvarig brug kan huden blive tynd, og de små kar i huden kan udvide sig eller briste og huden kan få lyse striber (strækmærker) på grund af salvens steroidindhold.

Desuden kan der optræde betændelse i hårsække, bumser (steroidakne), uønsket hårvækst, eksem rundt om munden (perioral dermatitis), affarvning af huden, punktformede blødninger i huden, ny betændelse i huden eller sløring af betændelse i huden, betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme på næse, kinder og pande (rosacea), udslæt med små blærer, ødelagt laset hud.

Fortæl læge eller apotek hvis De får andre bivirkninger end dem, der står her, således at bivirkninger kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl læge eller apotek, hvis De får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: <http://www.laegemiddelstyrelsen.dk>.

5. Opbevaring

Opbevar Fucicort® utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Fucicort® ved over 25 °C.

Brug ikke Fucicort® efter den udløbsdato, der står på pakningen.

6. Yderligere information

Afllever altid medicinrester på apoteket.

Fucicort® indeholder:

De aktive indholdsstoffer i Fucicort® er: Fusidinsyre 20 mg/g og Betamethason 1 mg/g.

De øvrige indholdsstoffer er: Cetomacrogol 1000, cetostearylalkohol, chlorocresol, natriumdihydrogen-phosphatdihydrat, paraffinolie, hvid vaselin, natriumhydroxid, renset vand.

Pakningsstørrelser:

Fucicort® creme findes i pakninger med 15 g creme.

Markedsføring i Danmark

Singad Pharma ApS

Vibe Allé 5, blok 2B

2980 Kokkedal

Fucicort® er et registreret varemærke, som tilhører LEO Pharma A/S.

Revideret november 2006.