

Minurin®

Tabletter 0,2 mg

Læs denne information godt igennem før De begynder at bruge medicinen

- Gem denne information, De får måske brug for at læse den igen.
- Ønsker De mere information, så kontakt læge eller apotek.
- Lægen har ordineret Minurin® til Dem personligt. Giv derfor ikke medicinen til andre.

Indholdsfortegnelse:

1. Virkning og anvendelse
2. Vigtig information som skal læses før De bruger Minurin®
3. Sådan skal De bruge Minurin®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere information

1. Virkning og anvendelse

- Minurin® er en hvid tablet med delekærv.
- Minurin® virker ved at nedsætte produktionen af urin.
- Minurin® anvendes til ufrivillig natlig vandladning hos børn (enuresis nocturna) og hos voksne til behandling af nocturi (når man vågner om natten med behov for at tisse). Minurin® anvendes også til diabetes insipidus, som er en kronisk sygdom, hvor der udskilles en meget stor mængde tynd urin uden sukkerindhold.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Vigtig information som skal læses før De bruger Minurin®.

Brug ikke Minurin® hvis:

- De er overfølsom over for desmopressin eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Minurin®.
- De af vane eller psykisk betinget har trang til at drikke meget.
- De har hjertesygdomme eller andre tilstande hvor De bliver behandlet med vanddrivende midler.
- De har for lavt natriumindhold i blodet.
- De har utilstrækkelig nyrefunktion i moderat til alvorlig grad.
- De lider af SIADH, en tilstand med uhensigtsmæssigt høj ADH produktion

Særlige forholdsregler

Ved behandling af ufrivillig vandladning skal væskeindtaget begrænses til mindst muligt i perioden 1 time før til næste morgen (mindst 8 timer) efter indtagelse af Minurin®. Hvis der er tegn på væskeophobning i kroppen, skal behandlingen afbrydes og lægen kontaktes. Symptomerne på for meget væske i kroppen er hovedpine, kvalme, opkastning, vægtøgning og i alvorlige tilfælde krampes.

Minurin® skal anvendes med forsigtighed

- Hos ældre og patienter med lavt serumnatrium.
- Hos patienter der er i behandling med lægemidler der ligesom Minurin® kan give en væskeophobning i kroppen, se "Brug af anden medicin".

- Hos patienter med ændret blærefunktion eller afløbshindring fra blæren.

Brug af Minurin® sammen med mad og drikkevarer

Ved behandling af (ufrivillig) natlig vandladning skal væskeindtaget begrænses til mindst muligt i perioden 1 time før til næste morgen (mindst 8 timer) efter indtagelse af Minurin®. Samtidig indtagelse af mad kan nedsætte effekten af lave doser Minurin®.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Minurin®

Minurin® indeholder lactose. Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke kan tåle visse sukkerarter.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før De bruger nogen form for medicin.

Graviditet

De må kun tage Minurin® efter lægens anvisning.

Amning

De kan amme, selvom De bruger Minurin®.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Minurin® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Visse lægemidler kan ligesom Minurin® give en væskeophobning i kroppen. Sammen med Minurin® kan disse lægemidler føre til forstærket effekt. Kombinationen bør derfor undgås. Eksempler på sådanne lægemidler er: loperamid, klorpromazin, carbamazepin, tricykliske antidepressiva og visse andre antidepressiva (SSRI'er).

Lægemidler mod smerter, f.eks. ibuprofen og acetylsalicylsyre (NSAID'er) kan øge effekten, men ikke varigheden af Minurin® virkningen.

3. Sådan skal De bruge Minurin®

Tabletterne kan knuses, men må ikke opslømmes i vand.

Dosering

Opvågning om natten med behov for at lade vandet (Nocturi):

Voksne

Individuelt. Startdosis er sædvanligvis 0,1 mg ved sengetid. Hvis der ikke mærkes nogen virkning, kan dosis øges ugentlig til 0,2 mg og herefter evt. til 0,4 mg. Væskeindtaget skal kontrolleres.

Ufrivillig natlig vandladning (Enuresis nocturna):

Børn over 5 år

Individuelt. Startdosis er sædvanligvis 0,2 mg ved sengetid. Hvis denne dosis ikke er tilstrækkelig effektiv, kan dosis øges op til 0,4 mg.

Ved længere tids behandling indskydes hver 3. måned en behandlingsfri periode af ca. en uges varighed, udelukkende for at se om spontan helbredelse er indtruffet.

Diabetis insipidus:

Voksne og børn:

Individuelt. Startdosis er sædvanligvis 0,1 mg 3 gange daglig.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.

Ændring eller stop i behandling bør kun ske i samråd med lægen.

Har De taget for meget Minurin®?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Minurin®, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas.

Symptomer på overdosering er kramper og bevidstløshed.

Overdosering med Minurin® kan give forlænget virkning, væskeophobning i kroppen, samt et lavt natriumindhold i blodet.

Har de glemt at tage Minurin®?

Glemmer De en dosis, fortsættes med almindelig dosering. Tag aldrig dobbelt dosis.

4. Bivirkninger

Minurin® kan som al anden medicin give bivirkninger.

Bivirkninger ved behandling af ufrivillig natlig vandladning og diabetes insipidus

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede)
Hovedpine, mavesmerter og kvalme.

Meget sjældne bivirkninger (Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede)

Allergiske reaktioner. For lavt natriumindhold i blodet. Humørsvingninger. Allergiske hudreaktioner.

Bivirkninger ved nocturi

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (Forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede)
Hovedpine

Almindelige bivirkninger (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede)

For lavt natriumindhold i blodet. Svimmelhed. Væskeophobninger i kroppen. Kvalme. Mavesmerter. Mundtørhed.

Ved langtidsbehandling ses: Hovedpine, vægtstigning, hyppig vandladning.

Fortæl læge eller apotek hvis De får andre bivirkninger end dem, der står her, således at bivirkninger kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl læge eller apotek, hvis De får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted:
<http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>.

5. Opbevaring

Opbevares i original emballage, tæt tillukket, da lægemidlet er følsomt overfor fugt. Tørre kapslen bør ikke fjernes.

Opbevar Minurin® utilgængeligt for børn.

Anvend ikke Minurin® efter den udløbsdato, der står på pakningen.

6. Yderligere information

Afløber altid eventuelle medicinrester på apoteket.

Minurin® indeholder

Det virksomme indholdsstof i Minurin® er desmopressinacetat.

De øvrige indholdsstoffer er: lactosemonohydrat, magnesiumstearat, kartoffelstivelse og povidon.

Pakningsstørrelse

Minurin® tabletter findes i pakninger á 30 og 90 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Markedsføring i Danmark

SinGad Pharma ApS.

Vibe Allé 5, blok 2B

2980 Kokkedal.

Producent

FERRING AB

Revideret 10/2006