

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

CAPTOPRIL MYLAN 12,5 mg, 25 mg og 50 mg tabletter
captopril

**Læs denne indlægsseddel grundigt,
inden De begynder at tage medicinen.**

- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
- Lægen har ordineret Captopril Mylan til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse.
2. Det skal De vide, før De begynder at tage Captopril Mylan
3. Sådan skal De tage Captopril Mylan
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Deres tabletter indeholder captopril, som tilhører en medicingruppe, der kaldes angiotensinkonverterende enzym (ACE) hæmmere.

Captopril Mylan medvirker til at sænke mængden af stoffet angiotensin, der findes naturligt i kroppen. Angiotensin kan få blodkarrene til at trække sig sammen og derved forhøje blodtrykket, lige som det kan medføre kraftig væskeophobning. Captopril Mylan kan forhindre dannelsen af angiotensin, så blodkarrene udvides og blodtrykket falder.

Det kan også behandle væskeophobningen, som opstår i forbindelse med nedsat hjertefunktion.

Lægen kan ordinere Captopril Mylan til Dem, hvis De har for højt blodtryk, nedsat hjertefunktion eller hvis De for nylig har haft en blodprop i hjertet. Captopril Mylan sænker blodtrykket og hjælper hjertet med at arbejde mere effektivt. Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget De er i tvivl om.

2. VIGTIG INFORMATION, SOM DE SKAL LÆSE, FØR DE TAGER CAPTOPRIL MYLAN

Tag ikke Captopril Mylan:

- hvis De er overfølsom (allergisk) over for det aktive stof eller et af de øvrige indholdsstoffer, især lactose eller mikrokrySTALLinsk cellulose (se afsnit 6. Yderligere oplysninger).
- hvis De er længere end i 3. måned af Deres graviditet (det er også bedre at undlade at tage Captopril Mylan tidligt i graviditet - se graviditetsafsnittet).

Vær ekstra forsigtig med at tage Captopril Mylan

Fortæl det til lægen, inden De tager denne medicin:

- hvis De er gravid, planlægger at blive gravid eller hvis De ammer
- hvis De tidligere har taget medicin, der indeholder captopril eller en anden ACE-hæmmer og De fik en usædvanlig eller allergisk reaktion.
- hvis De tidligere har haft problemer, der påvirker Deres nyre eller lever.
- hvis De er i hæmodialyse-behandling med high-flux dialysefiltre.

- hvis lægen har fortalt Dem, at De har en forsnævring i aortaklappen (forkalkning i aortaklappen)
- hvis De allerede tager medicin mod forhøjet blodtryk som f.eks. clonidin
- hvis De har en bindevævssygdom, som påvirker blodkarrene
- hvis De tager medicin mod depression eller psykiske sygdomme, f.eks. lithium
- hvis De tager allopurinol eller probenecid mod gigt
- hvis De skal bedøves, fordi De skal opereres

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept eller følgende medicin:

- vanddrivende medicin som f.eks. furosemid, amilorid, triamteren eller spironolacton
- kaliumtilskud eller salterstatning
- non-steroid antiinflammatorisk medicin såsom indomethacin (mod ledegigt eller betændelse)
- anden medicin, der udvider blodkarrene som f.eks. minoxidil

- medicin der nedsætter immunforsvaret som f.eks. azathioprin eller cyclophosphamid (forebygger frastødelse af transplanterede organer).

Brug af Captopril Mylan sammen med mad og drikke

De kan tage Captopril Mylan før, under eller efter måltider.

Graviditet og amning

Graviditet

De skal fortælle Deres læge, hvis De tror, De er gravid (eller måske vil blive det). Deres læge vil normalt råde Dem til at stoppe med at tage Captopril Mylan og tage en anden

medicin i stedet for, før De bliver gravid, eller så snart De finder ud af, at De er gravid. De bør ikke tage Captopril Mylan tidligt i graviditeten, og De må ikke tage det, hvis De er mere end 3 måneder henne i graviditeten, da det kan give Deres barn alvorlige skader.

Amning

De skal fortælle Deres læge, hvis De ammer eller skal til at amme. Det frarådes at amme nyfødte børn (de første uger efter fødslen) og især for tidligt fødte børn, mens De tager Captopril Mylan.

Hvis Deres baby ikke længere er nyfødt, vil lægen fortælle

Dem om fordele og ulemper ved behandlingen med
Captopril Mylan sammenlignet med andre behandlinger.
Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De tager nogen
form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

De må ikke køre eller betjene maskiner, hvis De er svimmel
eller træt, mens De tager denne medicin.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Captopril Mylan

Dette lægemiddel indeholder lactose. Kontakt lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DE TAGE CAPTOPRIL MYLAN

Tag altid Captopril Mylan nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

De vil sandsynligvis skulle tage Captopril Mylan i længere tid. De skal fortsætte med at tage tabletterne så længe som lægen

har anvist det, selvom De har det godt. Inden De begynder behandlingen og under behandlingen med captopril vil lægen med jævne mellemrum muligvis tage blodprøver og kontrollere Deres nyrefunktion. Hvis De har nyreproblemer, vil De sandsynligvis få kontrolleret Deres nyrefunktion hver måned i starten af behandlingen.

Hvis De skal have foretaget en urin- eller blodprøve, skal De fortælle lægen, at De tager Captopril Mylan.

Lægen vil muligvis råde Dem til at ændre Deres kost eller tage anden medicin samtidig med Captopril Mylan. De må ikke ændre Deres kost eller medicinske behandling uden

først at tale med lægen.

Voksne

Den dosis Captopril Mylan, som lægen har ordineret til Dem, vil blive justeret, så den passer lige til Deres behov. Hvis De har forhøjet blodtryk, er den anbefalede startdosis 12,5 mg captopril to gange dagligt.

Hvis De har nedsat hjertefunktion, vil De sandsynligvis få en lavere dosis på 6,25 mg eller 12,5 mg captopril. Lægen vil måske øge dosis efter 2-4 uger afhængig af, hvordan De reagerer på medicinen, indtil den korrekte dosis er nået. Den maksimale daglige dosis er 150 mg fordelt på flere doser.

Deres dosis kan være anderledes, hvis De også tager anden medicin som f.eks. vanddrivende medicin.

Hvis De får Captopril Mylan efter en blodprop i hjertet, er den sædvanlige startdosis 6,25 mg captopril. Lægen vil øge og justere dosis over flere uger op til en maksimal daglig dosis på 150 mg captopril fordelt på flere doser.

Ældre patienter eller patienter med nedsat nyrefunktion kan have brug for en lavere dosis eller for længere mellemrum mellem hver dosis.

Børn

Hvis Captopril Mylan anvendes til børn eller spædbørn, er den anbefalede startdosis 0,3 mg/kg legemsvægt fordelt på 2 eller 3 doser. Dosis vil blive beregnet på baggrund af barnets vægt og vil blive justeret i forhold til, hvordan barnet reagerer på medicinen.

Hvis De har taget for mange Captopril Mylan tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget flere Captopril Mylan tabletter, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet.

Hvis De har glemt at tage Captopril Mylan

De skal tage den glemte dosis, så snart De kommer i tanke om det, medmindre det snart er tid til den næste dosis. I så fald skal De blot tage den næste dosis som planlagt.

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis De holder op med at tage Captopril Mylan

De må ikke holde op med at tage medicinen uden først at tale med lægen. Hvis De holder op med at tage medicinen, vil Deres symptomer vende tilbage.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Captopril Mylan tabletter kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Kontakt straks lægen, hvis De får en infektion som f.eks. halsbetændelse eller feber eller hvis De får en allergisk reaktion, hvor tungen eller svælget hæver.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- svimmelhed
- mundtørhed med sår i munden eller forkølelsessår, ændret smagsopfattelse, dårlig mave eller opkastning som kan medføre vægttab
- hudreaktion som f.eks. udslæt eller kløe
- hoste
- søvnforstyrrelser

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- hævelse af hænder, fødder, ansigt, mund, tunge eller svælg, rødmen eller stødpletter på huden eller ondt i halsen
- svaghedsfølelse eller hjertebanken, især i starten af behandlingen eller når dosis øges

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- prikkende eller snurrende følelse i hænderne
- forværring af nyreproblemer
- hovedpine, træthed og søvnliggende sløvhedstilstand

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- vejrtrækningsbesvær
- mavesmerter
- gulfarvning af huden og det hvide i øjnene
- hudreaktion som f.eks. kløe med feber eller at huden bliver mere følsom over for sollys
- hævede kirtler
- påvirkning af visse typer blodprøver (positiv ANA)
- påvirkning af visse typer urinprøver (protein i urinen)

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

De finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted www.laegemiddelstyrelsen.dk.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares ved over 25° C.

Opbevar Captopril Mylan tabletter i original emballage.

Brug ikke Captopril Mylan efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan De skal aflevere medicinrester.

Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Captopril Mylan tabletter indeholder:

- Aktiv stof: captopril.
Hver tablet indeholder 12,5 mg, 25 mg eller 50 mg captopril.
- Øvrige indholdsstoffer: lactose, mikrokrySTALLinsk cellulose, majsstivelse, stearinsyre, natriumstivelsesglycollat.

Udseende og pakningsstørrelser

Captopril Mylan er en tablet.

Tabletterne er præget med "12,5", "25" eller "50" afhængig af styrken af den pågældende tablet.

Captopril Mylan fås i pakninger med 28, 30, 56, 60, 84 og 100 tabletter i alle styrker.* Apoteket vil give Dem det antal tabletter, som Deres læge har ordineret.

**ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.*

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Mylan AB, Ynglingagatan 14, 10435 Stockholm, Sverige

Repræsentant i Danmark

Mylan ApS, Sluseholmen 2-4, 2450 København SV

Fremstiller

Gerard Laboratories, Baldoyle Industrial Estate,
Dublin 13, Irland

**Denne indlægsseddel blev senest revideret
september 2010**

