

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

OFTAGEL 2,5 mg/g, øjengel

Carbomer

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

De kan få Oftagel uden recept. For at opnå den bedste behandling skal De være omhyggelig med at følge anvisningerne for Oftagel.

- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
- Kontakt lægen, hvis De får det værre, eller hvis De ikke får det bedre.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Oftagel
3. Sådan skal De bruge Oftagel
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

De skal bruge Oftagel ved nedsat tåreproduktion (tørhed i øjnene) og tør øjenbetændelse.

Det virker ved at fugte og smøre Deres øjne og lindre irritation.

Hvis Deres læge har sagt, at De skal bruge Oftagel for noget andet, skal De altid følge lægens anvisning.

2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT BRUGE OFTAGEL

Brug ikke Oftagel

- hvis De er overfølsom (allergisk) over for et af indholdsstofferne.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Hvis De bruger et andet øjenpræparat (fx ved behandling af grøn stær (glaukom)), skal De altid bruge Oftagel til sidst og tidligst 15 minutter efter de øvrige præparater.

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis De er gravid, skal De **henvende Dem** til Deres **læge** for at få vejledning, **før** De begynder at bruge Oftagel. Han/hun vil beslutte, om De kan bruge Oftagel.

Amning

Hvis De ammer, skal De **henvende Dem** til Deres **læge** for at få vejledning, **før** De begynder at bruge Oftagel. Han/hun vil beslutte, om De kan bruge Oftagel.

Børn

Oftagel anbefales ikke til børn. Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere De vil vide.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Oftagel kan give sløret syn lige efter drypning. Vent med at køre bil eller andet køretøj samt betjene maskiner, indtil Deres syn er klart igen.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Oftagel

Indholdet af konserveringsmidlet benzalkoniumchlorid kan give irritation af øjnene og misfarve bløde kontaktlinser. Undgå kontakt med bløde kontaktlinser.

Kontaktlinser

Hvis De bruger bløde eller hårde kontaktlinser, tag kontaktlinserne ud, inden De drypper øjnene, og vent mindst 15 minutter, før de sættes i igen.

3. SÅDAN SKAL DE BRUGE OFTAGEL

Hvis Deres læge har sagt, at De skal tage en anden dosis, skal De altid følge lægens anvisning.

Den sædvanlige dosis er

Voksne

1 dråbe 1 – 4 gange dagligt efter behov.


Instruktioner vedr. håndtering og indtagelsesmåde

Vask hænder, inden flasken åbnes.

1. Bøj hovedet bagud, før forsigtigt det nedre øjenlåg på det øje, som skal behandles, ned, indtil der er en lille lomme.
2. Vend flasken med bunden opad. Klem på den for at dryppe 1 dråbe ned i ”lommen”.



3. Slip det nedre øjenlåg, og blink nogle gange.



Gentag trin 1-3 med det andet øje, hvis det også skal behandles.

Undgå at røre øjet eller øjenlåget med flasken.

Luk flasken godt til efter drypning.

Flasken opbevares med **bunden opad**, da det hjælper med at danne dråber til næste gang, De skal bruge Oftagel.

Hvis De har brugt for meget Oftagel

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har brugt mere Oftagel, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og De af den grund føler Dem utilpas. Tag pakningen med.

Hvis De har glemt at bruge Oftagel

Hvis De har glemt at dryppe øjnene, så dryp dem så snart De kommer i tanker om det. Brug aldrig dobbelt dosis.

Hvis De holder op med at bruge Oftagel

Hvis De holder op med at bruge Oftagel, kan symptomerne med tørhed i øjnene vende tilbage.

4. BIVIRKNINGER

Oftagel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.

- Let forbigående irritation i øjet, klistrede øjenlåg og sløret syn efter drypning

Rødme i øjet, hævelse af øjet eller øjelåg, kløe i øjet og smerter i øjet er også mulige.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. De eller Deres pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

- Opbevar Oftagel utilgængeligt for børn.
- Opbevar ikke Oftagel ved temperaturer over 25 °C.
- Opbevar Oftagel i originalpakningen for at beskytte mod lys.
- Flasken skal stå med bunden opad for at lette drypning.
- Brug Oftagel senest 4 uger efter åbning.
- Brug ikke Oftagel efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Oftagel 2,5 mg/g øjengel indeholder

- Aktivt stof: Carbomer.
- Øvrige indholdsstoffer: Sorbitol, polyvinylalkohol, lysin monohydrat, natriumacetat trihydrat, vand til injektionsvæsker og konserveringsmiddel: benzalkoniumchlorid 0,06 mg/g.

Udseende og pakningsstørrelse

Pakningsstørrelse

10 g og 3 x 10 g. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller
Santen Oy, Niittyhaankatu 20, FI-33720 Tampere, Finland

Repræsentant i Danmark
Santen Danmark, Kongeledet 1, 2920 Charlottenlund

Denne indlægsseddel blev senest revideret i januar 2012.