

Information om Metosyn, salve 0,05 %

Læs denne information godt igennem, før De begynder at bruge medicinen

- Gem denne information, De får måske brug for at læse den igen.
- Kontakt læge eller apotek, hvis De har spørgsmål til behandlingen.
- Lægen har ordineret Metosyn salve til Dem personligt. Lad derfor være med at give den til andre.

Indholdsfortegnelse:

1. Virkning og anvendelse.
2. Vigtig information som De skal læse, før De bruger Metosyn salve.
3. Sådan skal De bruge Metosyn salve.
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring.
6. Yderligere information.

1. Virkning og anvendelse

- Metosyn salve indeholder et stærkt binyrebarkhormon (kortikosteroid).
 - Metosyn dæmper hævelse og irritation ved betændelse, der ikke skyldes bakterier, virus eller svampe. Derved mindskes udbredelsen af udslæt, eksem eller psoriasis.
 - De kan bruge Metosyn til behandling af forskellige former for eksem og psoriasis.
- Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Vigtig information, som De skal læse, før De bruger Metosyn salve

• Brug ikke Metosyn hvis:

- De er overfølsom over for fluocinonid eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Metosyn salve.
- De har betændelse i huden, der skyldes svampe eller bakterier, med mindre betændelsen bliver behandlet.

• Brug ikke Metosyn mod:

- En betændelsesagtig hudsygdom med synlige blodkar på næse, kinder, pande og hage (rosacea).
- Bumser eller på områder med bumser.
- Betændelse med røde knopper omkring mund og næse (perioral dermatit).
- Sygdomme på huden, der skyldes virus (forkølelssår, skoldkopper eller helvedesild).
- Hudlidelser hos børn under 1 år, f.eks. eksem eller bleeksem.

• Særlige forholdsregler

De bør ikke bruge Metosyn længere end aftalt med lægen. Dette gælder især hos børn.

Børn må ikke bruge lufttæt forbindelse på det behandlede område. Behandling af børn må normalt ikke vare længere end 5 dage.

Hvis De undtagelsesvis bruger Metosyn i ansigtet, skal De undgå at få det i øjnene, eller at smøre det rundt om øjnene.

De bør undgå lang tids brug på store hudområder og på den sarte hud i ansigt, armhuler, lysken, ved endetarmsåbning og på kønsdele.

- De må ikke pludseligt stoppe med at bruge Metosyn, da det kan forværre Deres hudsygdom. Tal med lægen om langsom aftrapning af behandlingen.
- Tal med Deres læge hvis:
- De får irritation eller øget følsomhed af huden efter brug af Metosyn salve.
- Der kommer betændelse i huden.
- Barnet får fedme på kroppen, kuglerundt, rødt ansigt, striber på huden, især på maven.
- Barnet ikke vokser eller tager normalt på i vægt.
- Barnet får vedvarende hovedpine.

Deres binyrers dannelse af hormoner kan blive nedsat, når De bruger Metosyn i længere tid. Fortæl derfor lægen, at De

bruger Metosyn, hvis De er kommet alvorligt til skade, har en svær betændelse (f.eks. lungebetændelse) eller skal opereres.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at De er i behandling med Metosyn.

• Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Metosyn salve

Metosyn salve indeholder stearylalkohol, som kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem).

Metosyn salve indeholder propylenglycol, der kan give irritation af huden.

• Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket, før De bruger nogen form for medicin.

Graviditet:

De må kun bruge Metosyn salve efter lægens anvisning.

Amning:

De kan bruge Metosyn i korte perioder, selvom De ammer. Spørg lægen. De må dog ikke bruge Metosyn på og omkring brystvorterne.

• Trafik- og arbejdssikkerhed

Metosyn salve påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

• Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

De kan bruge Metosyn sammen med anden medicin.

3. Sådan skal De bruge Metosyn salve

Dosering

Voksne: Påsmør et tyndt lag 1-3 gange daglig. Gnid salven forsigtigt, men grundigt ind i huden.

Hvis De skal bruge en forbindelse, er det særlig vigtigt, at De renser huden omhyggeligt før påsmøring af salven.

Børn: De må kun bruge Metosyn til børn efter lægens anvisning. Børn må normalt ikke bruge Metosyn længere end 5 dage, og børn må ikke bruge lufttæt forbindelse.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.
Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

• Har De brugt for meget Metosyn salve?

I sjældne tilfælde efter overdreven eller langvarig brug kan De få fedme af kroppen, kuglerundt, rødt ansigt, træthed, vægttab, farveforandringer af huden. Kontakt Deres læge.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har brugt mere Metosyn, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas.

• Har De glemt at bruge Metosyn salve?

Hvis De har glemt en dosis, påsmør den, så snart De kommer i tanke om det.

4. Bivirkninger

Metosyn salve kan som al anden medicin give bivirkninger.

Bivirkninger kommer især, hvis De bruger lufttæt forbindelse og ved lang tids behandling.

Alvorlige bivirkninger:

• Hyppighed ikke kendt:

- Risiko for alvorlig shocktilstand ved tilskadekomst, operation eller svær betændelse (f.eks. lungebetændelse).
- Øget fedt på maven og i nakken, kuglerundt, rødt ansigt, striber på huden, især på maven, tørst pga. sukkersyge, for højt blodtryk, nedsat muskelmasse. Kontakt lægen.
- Børn kan vokse mindre og tage mindre på i vægt. Kontakt lægen.
- Børn kan få vedvarende hovedpine på grund af forhøjet tryk i hjernen. Kontakt lægen.
- Psoriasis med pusfyldte knopper på hænder og fødder eller over hele kroppen. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger:

- **Ikke almindelige bivirkninger** (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede): Tynd hud, som let går i stykker, udvidelse af de små blodkar i huden.

- **Hyppighed ikke kendt:** Irritation af huden, små blødninger under huden, lyse eller brune pletter på huden, bumser, sløring af betændelse i huden, kontaktseksem.

Der kan også komme brændende fornemmelse i huden, kløe, irritation, tørhed, betændelse i hårrødderne, uønsket hårvækst, betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit), opblødt og laset hud, Ny betændelse kan opstå på den behandlede hud, udslett med små væskefyldte blærer, forværring af eksem ved ophør af behandlingen.

Fortæl læge eller apotek, hvis De får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl læge eller apotek, hvis De får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

De finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: <http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>.

5. Opbevaring

- Opbevar Metosyn utilgængeligt for børn.
- Brug ikke Metosyn efter den udløbsdato, der står på pakningen.

6. Yderligere information

Afliver altid medicinrester på apoteket.

Metosyn 0,05% salve indeholder:

- Det aktive stof i Metosyn salve er fluocinonid (0,5 mg/g).
- De øvrige indholdsstoffer er citronsyre, monohydrat; Macrogol; 1, 2, 6-hexantriol; stearylalkohol; propylenglycol.

Produkts udseende

- Metosyn 0,05% salve er en glat, offwhite, halvgennemsigelig salve.
- Metosyn 0,05% salve fås i en aluminiumstube.

Pakningsstørrelser

50 g (aluminiumtub).

Markedsføring i Danmark:

Bioglan Pharma AB
Box 50577
202 15 Malmö
Sverige

Fremstiller:

Bioglan AB
Box 50310
20213 Malmö
Sverige

Revideret november 2006