

Information om Microcid, creme 1%

Læs denne information godt igennem, før De begynder at bruge medicinen

- De kan få denne medicin uden recept. For at opnå den bedste virkning skal De altid følge vejledningerne i denne information.
- Gem informationen. De får måske brug for at læse den igen.
- Ønsker De mere information, så kontakt læge eller apotek.

I denne information er der oplysninger om:

1. Virkning og anvendelse.
2. Vigtig information som De skal læse, før De bruger Microcid creme.
3. Sådan skal De bruge Microcid creme.
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring.
6. Yderligere information.

1. Virkning og anvendelse

- Microcid creme er desinficerende.
- Microcid creme virker ved at frigøre ilt.
- Du kan bruge Microcid creme mod betændelse i huden, der skyldes bakterier.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Vigtig information som De skal læse, før De bruger Microcid creme

• Brug ikke Microcid creme hvis:

De er overfølsom over for hydrogenperoxid eller et eller flere af de øvrige hjælpestoffer i Microcid creme.

De bruger andre midler til huden (f.eks. anden medicin eller desinfektionsmidler).

• Særlige forholdsregler

Undgå at få Microcid creme i øjnene.

• Vigtig information om nogle af hjælpestofferne i Microcid creme

Microcid creme indeholder propylenglycol, der kan give irritation af huden.

• Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket, før De bruger nogen form for medicin.

Graviditet:

De kan bruge Microcid creme under graviditet.

Amning:

De kan amme, selv om De bruger Microcid creme. Hvis De bruger Microcid creme på brystvorterne, bør De skylle det af før amning.

• Brug af anden medicin

Fortæl altid apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin der er købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

De må ikke bruge Microcid creme sammen med anden medicin til huden.

De må ikke bruge Microcid creme til sår, som har fået behandling med kaliumpermanganat.

3. Sådan skal De bruge Microcid creme

Dosering

Voksne: Smør Microcid creme på den angrebne hud i et tyndt lag 2-3 gange daglig i højst 1-2 uger.

Børn: De bør ikke bruge Microcid creme til børn (under 2 år) uden lægens anvisning.

- **Har De brugt for meget Microcid creme?**

Det er usandsynligt, at De bruger for meget Microcid creme.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De ved et uheld er kommet til at spise Microcid creme.

- **Har De glemt at bruge Microcid creme?**

Smør Microcid creme på, når De kommer i tanke om det.

4. Bivirkninger

Microcid creme kan som al anden medicin give bivirkninger.

- **Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede).**

Forbigående brændende fornemmelse i huden.

- **Hyppigheden er ikke kendt.**

Kontakteksem.

Fortæl læge eller apotek, hvis De får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl læge eller apotek, hvis De får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

De finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted:

<http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>.

5. Opbevaring

- Opbevar Microcid creme utilgængeligt for børn.
- Opbevar ikke Microcid creme over 25° C.
- Brug ikke Microcid creme efter den udløbsdato, der står på pakningen.

6. Yderligere information

Aflever altid medicinrester på apoteket.

Microcid creme 1% indeholder:

- Det aktive indholdsstof i Microcid creme er hydrogenperoxid 1% som hydrogenperoxid-diluendum 30%.
- Desuden indeholder Microcid creme hjælpestofferne: vandfri citronsyre, glycerolmonolaurat, glycerolmonomyristat, dinatriumedetat dihydrat, natriumhydroxid, tetranatriumoxalat, natriumpyrophosphat, natriumstannat, polyoxyethylen(100)stearat, propylenglycol, salicylsyre, svovlsyre og rensat vand.

Markedsføring i Danmark: Bioglan Pharma AB, Box 50577, 202 15 Malmö, Sverige

Fremstiller: Bioglan AB, Box 50310, 20213 Malmö, Sverige

Revideret september 2006