

# Information om Synalar® creme 0,25 mg/g

## Læs denne information godt igennem, før De begynder at bruge medicinen

- Gem denne information, De får måske brug for at læse den igen.
- Ønsker De mere information, så kontakt læge eller apotek.
- Lægen har ordineret Synalar creme til Dem personligt. Giv derfor ikke medicinen til andre.

## I denne information er der oplysninger om:

1. Virkning og anvendelse.
2. Vigtig information som De skal læse, før De bruger Synalar creme.
3. Sådan skal De bruge Synalar creme.
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring.
6. Yderligere information.

## 1. Virkning og anvendelse

- Synalar creme indeholder et stærkt binyrebarkhormon (kortikosteroid).
- Synalar dæmper hævelse og irritation ved betændelse, der ikke skyldes bakterier, virus eller svampe. Derved mindskes udbredelsen af udslet, eksem eller psoriasis.
- De kan bruge Synalar til behandling af forskellige former for eksem og psoriasis.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

## 2. Vigtig information, som De skal læse, før De bruger Synalar creme

### Brug ikke Synalar hvis:

- De er overfølsom over for fluocinolonacetomid eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Synalar creme.
- De har betændelse i huden, som skyldes svampe eller bakterier, med mindre betændelsen bliver behandlet samtidig.

### Brug ikke Synalar mod:

- En betændelsesagtig hudsygdom med synlige blodkar på næse, kinder, pande og hage (rosacea).
- Bumser eller på områder med bumser.
- Betændelse med røde knopper omkring mund og næse (perioral dermatit).
- Sygdomme på huden, der skyldes virus (forkølelsessår, skoldkopper eller helvedesild).
- Hudsygdomme hos børn under 1 år, f.eks. eksem eller bleksem.

### • Særlige forholdsregler

De bør ikke bruge Synalar længere end aftalt med lægen. Dette gælder især hos børn.

De bør undgå længerevarende brug på store hudområder og på den sarte hud i ansigt, armhuler, lysken, ved endetarmsåbning og på kønsdele.

Børn bør ikke bruge forbindelse på det behandlede område.

De må ikke pludselig stoppe med at bruge Synalar, da det kan forværre Deres hudsygdom. Tal med lægen om langsom aftrapning af behandlingen.

Hvis De undtagelsesvis bruger Synalar i ansigtet, skal De undgå at få det i øjnene eller at smøre det rundt om øjnene.

Kontakt lægen hvis:

- De har været i behandling i 4 uger. De bør ikke fortsætte behandlingen uden at lægen igen har set på Deres hudsygdom.
- De får irritation eller øget følsomhed af huden.
- Der er kommet betændelse i huden.
- Barnet får fedme på kroppen, rødt, kuglerundt ansigt, striber på huden især på maven.
- Barnet ikke vokser eller tager normalt på i vægt.
- Barnet får vedvarende hovedpine.

Deres binyrers dannelse af hormoner kan blive nedsat, når De bruger Synalar i længere tid. Fortæl derfor lægen, at De bruger Synalar, hvis De er kommet alvorligt til skade, har en svær betændelse (f.eks. lungebetændelse) eller skal opereres.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at De er i behandling med Synalar.

Det er vigtigt, at De kun bruger Synalar til den hudsygdom, som lægen har ordineret den til. Synalar creme må kun bruges af én person.

### • Vigtig information om nogle af de øvrige hjælpestoffer i Synalar creme

Indeholder propylenglycol, som kan give irritation af huden. Indeholder cetyl- og stearylalkohol, som kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem).

### • Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket, før De bruger nogen form for medicin.

### Graviditet:

De må kun bruge Synalar efter lægens anvisning.

### Amning:

De kan bruge Synalar i korte perioder, selvom De ammer. Spørg lægen. De må dog ikke bruge Synalar på og omkring brystvorterne.

### • Trafik- og arbejdssikkerhed

Synalar påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

### • Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

De kan bruge Synalar sammen med anden medicin.

### 3. Sådan skal De bruge Synalar creme

#### Dosering

Voksne: Påsmør et tyndt lag 1-3 gange daglig. Gnid cremen forsigtigt, men grundigt ind i huden. Dæk herefter området med en forbinding. Hvis De skal bruge en forbinding er det især vigtigt at De renser huden omhyggeligt før påsmøring af cremen. Kassér cremen når behandlingen er overstået.

Børn: De må kun bruge Synalar til børn efter lægens anvisning.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.  
Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

#### • Har De brugt for meget Synalar?

Ved overdreven eller langvarig brug kan De få fedme på kroppen, oppustet, kuglerundt, rødt ansigt, træthed, vægttab, farveforandringer af huden. Kontakt Deres læge.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har brugt mere Synalar, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas.

#### • Har De glemt at bruge Synalar?

Hvis De har glemt en dosis, påsmør den, så snart De kommer i tanke om det.

### 4. Bivirkninger

Synalar creme kan som al anden medicin give bivirkninger.

Bivirkninger kommer især hvis De bruger lufttæt forbinding og ved lang tids behandling.

Alvorlige bivirkninger:

#### • Hyppighed ikke kendt:

- Risiko for alvorlig shocktilstand ved tilskadekomst, operation eller svær betændelse (f.eks. lungebetændelse).
- Øget fedt på maven og i nakken, oppustet, kuglerundt, rødt ansigt, tørst pga. sukkersyge, for højt blodtryk, nedsat muskelmasse. Kontakt lægen.
- Børn kan vokse mindre og tage mindre på i vægt. Kontakt lægen.
- Børn kan få vedvarende hovedpine på grund af forhøjet tryk i hjernen. Kontakt lægen.
- Psoriasis med pusfyldte knopper på hænder og fødder eller over hele kroppen. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke Alvorlige bivirkninger:

- **Ikke almindelige bivirkninger** (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):
  - Ny betændelse i det behandlede område, tynd hud, som let går i stykker, Udvidelse af de små blodkar i huden, striber på huden (strækmærker), betændelsesagtig hudsygdom med synlige blodkar på næse, kinder, pande og hage (rosacea).
- **Sjældne bivirkninger** (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):
  - Uønsket hårvækst.

#### • Hyppighed ikke kendt:

- Sløring og forværring af betændelse i huden, lyse eller brune pletter på huden, kontakteksem, bumser.

Desuden kan der komme betændelse i hårrødderne, opblødt og laset hud, mindre blødninger i huden, betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit), forværring af eksem ved ophør af behandlingen.

Fortæl læge eller apotek, hvis De får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl læge eller apotek, hvis De får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

De finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted:  
<http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>.

### 5. Opbevaring

- Opbevar Synalar utilgængeligt for børn.
- Brug ikke Synalar efter den udløbsdato, der står på pakningen.

### 6. Yderligere information

Aflever altid medicinrester på apoteket.

Synalar creme 0,25mg/g indeholder:

- Det aktive indholdsstof i Synalar er fluocinolonacetonid.
- Desuden indeholder Synalar creme hjælpestofferne: propylenglycol, sorbitanmonostearat, polysorbat, cetyl- og stearylalkohol, paraffinolie, benzylalkohol, vandfri citronsyre og rensat vand.

#### Produktets udseende

- Synalar creme er en hvid til off-white creme.
- Synalar creme fås i en aluminiumstube.

#### Pakningsstørrelser

30 g (aluminiumtub)

100 g (aluminiumtub)

#### Markedsføring i Danmark:

Bioglan Pharma AB

Box 50577

202 15 Malmö

Sverige

#### Fremstiller:

Bioglan AB

Box 50310

20213 Malmö

Sverige

Revideret november 2006